

# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою  
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

Код ID							


Прізвище							

Варіант \_\_\_\_\_

**Збірник тестових завдань для складання  
ліцензійного іспиту**

**Крок Б**

**СЕСТРИНСЬКА СПРАВА**



# ІНСТРУКЦІЯ

**Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.**

ББК 54.1я73  
УДК 61

**Автори тестових завдань:** Білик О.Б., Бутєва Л.В., Буткова Л.О., Бялий А.О., Весклярова У.П., Вибіцька О.В., Виноград Л.В., Волкова О.А., Волощук В.І., Гайдуков В.А., Гантімурова Г.Т., Гладченко М.М., Гончарова Н.М., Гужва В.Й., Гузенко Б.В., Діхтяренко А.М., Дуб Н.Є., Єфременко Л.М., Журомський В.С., Зайцева В.П., Ігнатенко Г.А., Калініченко О.В., Калініченко О.І., Карпінська Т.Г., Кияшко Г.П., Клішевич І.Б., Компанієць К.М., Корнюшкін С.В., Коробчанська В.Д., Кривущев Б.І., Кулага Н.К., Лесик-Лісна О.А., Макарова О.В., Москаленко Л.М., Мухіна К.Ш., Мухіна Т.С., Нефедова Г.А., Ніколаєнко В.В., Новицька Л.А., Новіцкий О.М., Опаріна Т.Н., Осадча О.Д., Панфілова О.О., Патока Н.Г., Подносова Л.М., Попова Л.В., Приліпська Н.І., Пурій Г.І., Ратушна С.В., Резниченко Л.І., Ржевська О.О., Росток В.М., Сабковська Х.О., Савонік Л.В., Сіногіна В.О., Слабодчикова С.Ю., Сливка Н.О., Сокол К.М., Соколова Н.С., Степанець О.В., Сухінський Р.К., Тараненко О.І., Титаренко Г.Г., Ткаченко К.К., Третьякевич З.М., Устименко В.А., Хіміч Т.Ю., Хома С.М., Шабаліна Л.І., Шведа Ю.І., Шевченко Л.І., Шевченко Н.С., Шейко І.А., Шинкарьова С.К., Шихальова З.М., Юхименко І.І., Якуб'як Т.І. та Комітети фахової експертизи.

**Рецензенти. Експерти:** Борейко Л.Д., Вовк В.Т., Грицишук П.М., Дуб Н.Є., Журомський В.С., Карпінська Т.Г., Макарова О.В., Макєєва Н.І., Мельничук К.І., Мухіна Т.С., Навчук І.В., Новицька Л.А., Орібко С.Д., Рега Н.І., Хіміч Т.Ю., Шайданюк О.І., Шегедин М.Б., Шульгай О.М.

**Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок Б. Сестринська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.**

**Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку медичних сестер.**

**Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів.**

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І  
“ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

**1.** Хворий 24-х років внаслідок автодорожньої аварії отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість. При обстеженні хворого на місці аварії шкіра бліда, з ціанотичним відтінком, пульс - 140/хв., дихальні рухи грудної клітки відсутні, реакція зіниць на світло збережена. Визначити обсяг первинної допомоги:

- A.** Усунення западання язика, надання лежачого положення на правому боці, при необхідності - штучна вентиляція легень
- B.** Термінова госпіталізація до стаціонару
- C.** Штучна вентиляція легень потерпілому
- D.** Масаж грудної клітки
- E.** Надання хворому напівсидячого положення

**2.** Хлопчик 9-ти років скаржиться на часте сечовипускання, болі в животі, нудоту, одноразове блювання, підвищення температури тіла до  $37,7^{\circ}\text{C}$ . Хворіє 3 дні. При огляді шкірні покриви бліді, АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця звучні, діяльність ритмічна, Ps- 100/хв., ЧД- 26/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. У сечі: питома вага - 1012, білок - 0,16 г/л, лейкоцити - 30-50 в п/з, еритроцити - 3-4 в п/з, бактерії - велика кількість. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Пієлонефрит
- B.** Цистит
- C.** Сечокам'яна хвороба
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Сечокислий інфаркт нирок

**3.** Населення міста А має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста:

- A.** Прогресивний
- B.** Стабільний
- C.** Регресивний
- D.** Динамічний
- E.** Змішаний

**4.** При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою:  $((\text{число мертвороджених} + \text{число дітей, які померли в постнатальний період}) * 1000) / (\text{число дітей, які народилися живими і мертвими})$ . Як називається розрахований показник?

- A.** Перинатальна смертність
- B.** Малюкова смертність
- C.** Акушерська смертність
- D.** Питома вага дітей, які померли в постнатальний період
- E.** Мертвонароджуваність

**5.** Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

- A.** Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів
- B.** Собівартість медичних послуг і загальні доходи
- C.** Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- D.** Ціна та собівартість медичних послуг
- E.** Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

**6.** Жінка 36-ти років народила 1 годину тому. Кровотрата у пологах склала 1 літр. З'явилися шум у голові, потемніння в очах, короткочасна втрата свідомості. Діагностовано гостру судинну недостатність. Що з нижчеперерахованого є характерним для колапсу?

- A.** Блідість шкіри
- B.** Глибоке, шумне дихання
- C.** Високий систолічний тиск
- D.** Уповільнення пульсу
- E.** Дифузний ціаноз

**7.** Хворий скаржиться на стискаючі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку, які виникають при фізичному навантаженні, купіруються нітрогліцерином протягом 1 хвилини. Об'єктивно: наявних набряків немає. Ps- 72/хв., ритмічний. АТ- 135/90 мм рт.ст. Про яку патологію йдеться?

- A.** Стенокардія напруження
- B.** Міжреберна невралгія
- C.** Дрібновогнищевий (не Q) інфаркт міокарда
- D.** Крупновогнищевий (Q) інфаркт міокарда
- E.** Стенокардія спокою

**8.** Чисельність дитячого населення на педіатричних дільницях дитячої поліклініки становить: дільниця №1 - 800 дітей; дільниця №2 - 590 дітей; дільниця №3 - 650 дітей; дільниця №4 - 700 дітей; дільниця №5 - 950 дітей. На якій із зазначених педіатричних дільниць кількість дитячого населення відповідає встановленому нормативу?

- A. №1
- B. №2
- C. №3
- D. №4
- E. №5

9. Робітник ливарного цеху заводу 46-ти років скаржитися на задишку, яка з'являється при незначному фізичному навантаженні, біль в грудній клітці, кашель з невеликою кількістю слизового харкотиння. Об'єктивно: шкіра бліда, ціаноз губ. Перкуторно - "мозаїчність" звуку. Аускультативно дихання жорстке, над ділянками емфіземи - послаблене. Тони серця приглушені. Яка рентгенологічна картина характерна для цієї стадії захворювання:

- A. "Снігова хуртовина"
- B. Вузликіві тіні діаметром до 1 мм
- C. Злиття вузликівих тіней в конгломерати
- D. Бронхоектази
- E. Підвищення прозорості легень

10. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидко втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок"; кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість:

- A. Палестезіометрія
- B. Капіляроскопія
- C. Проба на реактивну гіперемію
- D. Холодова проба
- E. Алгезиметрія

11. Робітник 42-х років, що працює на коксохімічному комбінаті, порушив техніку безпеки, ввійшов до замкненого приміщення для зберігання бензолу. Після виходу з приміщення відчув себе погано: з'явилося почуття оп'яніння, сонливість, головний біль, нудота, блювання, слабкість у м'язах, порушення ходи. В медпункті знепритомнів. При проведенні обстеження пацієнта медсестра повинна звернути увагу на шкіру, яка набуває кольору:

- A. Сіро-синього
- B. Землисто-блідого
- C. Алебастрового
- D. Жовтяничного
- E. Червоного

12. Хворий 45-ти років, працівник по виготовленню електричного кабелю, потрапив у приймальне відділення зі скаргами на солодкий присмак у роті, блювання, пронос, раптове виникнення колики, пітливість. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла -  $38,9^{\circ}\text{C}$ , виражена брадикардія, підвищене потовиділення, АТ- 180/90 мм рт.ст. В крові - гіпохромна анемія. Наявність якого основного діагностичного симптому повинна виявити медсестра при проведенні обстеження пацієнта:

- A. "Свинцевий колорит"
- B. "Брудних ліктів"
- C. "Шкіра леопарда"
- D. "Свинцевий поліневрит"
- E. "Снігова хуртовина"

13. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "І-ХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів застосуєте для корекції гемодинаміки?

- A. Дофамін
- B. Корглюкон
- C. Ефедрин
- D. Строфантин
- E. Атропін

14. При обстеженні дитини 4-х років, виявлені наступні проблеми: біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Хворіє другий день. Захворювання почалась гостро з підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ . Об'єктивно: гіперемія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках, носогубний трикутник блідий. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. Скарлатина
- B. Вітряна віспа
- C. Краснуха
- D. Кір
- E. Менінгококова інфекція

15. До дитячого відділення постувила дитина 20-ти днів. При проведенні медсестринської оцінки стану пацієнта виявлені проблеми: повторне блювання, частий рідкий стілець, підвищення температури тіла до  $39,3^{\circ}\text{C}$ . Стан дитини важкий, вона млява, шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком, еластичність шкіри знижена, слизові оболонки сухі, велике тім'ячко

запале. З очей та правого слухового ходу відмічаються гнійні виділення, з пупкової ранки - серозно-геморагічні виділення. Про що можна подумати?

- A.** Сепсис новонародженого
- B.** Омфаліт
- C.** Ентероколіт
- D.** Отит
- E.** Кон'юнктивіт

**16.** В інфекційному відділенні лікарні старша медична сестра має освітній рівень молодшого спеціаліста, а чергова медсестра - бакалавра. Чергова медсестра прямолінійно заявляє, що на посаді старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращі знання та вміння організувати роботу у відділенні. Назрів конфлікт. Який спосіб його розв'язання є у цьому випадку оптимальним?

- A.** Співпраця
- B.** Компроміс
- C.** Пристосування
- D.** Уникнення
- E.** Поступка

**17.** Медсестри кардіологічного відділення А. та М., сестра-господиня С. мають спільне захоплення - вишивання. Старша медична сестра відділення разом з головною медичною сестрою лікарні організували виставку робіт майстринь у холі відділення в день народження Т.Г. Шевченка. Це елемент культури організації. Про який рівень культури йдеться?

- A.** Рівень світоприйнятних цінностей
- B.** Смысловий рівень "цінність"
- C.** Рівень поверхневої культури
- D.** Філософія організації
- E.** Дух організації

**18.** За результатами акредитації районної лікарні присвоєно першу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

- A.** 81-91
- B.** 92-100
- C.** 75-80
- D.** 74-70
- E.** 69-50

**19.** З метою покращення обслуговування пацієнтів, вчасного виявлення незадоволених потреб у хірургічному відділенні провели опитування хворих у вигляді анкетування. Що це означає в процесі маркетингового дослідження ринку медичних послуг?

- A.** Збір первинної інформації
- B.** Кабінетні дослідження
- C.** Аналіз отриманої інформації
- D.** Постановка мети
- E.** Висновки

**20.** До медичного коледжу надійшла гуманітарна допомога з американського госпіталю. Частина обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районній лікарні, певним чином оцінивши. Як називається цей вид ціни?

- A.** Бюджетна оцінка
- B.** Вільна ціна
- C.** Договірна ціна
- D.** Тарифи з медичного страхування
- E.** Прейскурантна ціна

**21.** В хірургічне відділення поступив хворий 51-го року із скаргами на біль у правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Флебіт
- B.** Флеботромбоз
- C.** Артеріїт
- D.** Тромбофлебіт
- E.** Ліфмангоїт

**22.** Пацієнт госпіталізований з приводу пневмонії. Лікар призначив антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, утруднення дихання, став блідим, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Анафілактичний шок
- B.** Набряк Квінке
- C.** Кропив'янка
- D.** Набряк легень
- E.** Серцева астма

**23.** Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ-170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A.** Аналіз сечі за Нечипоренком
- B.** Аналіз сечі на глюкозу
- C.** Аналіз сечі за Зимницьким
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** Аналіз сечі на діастазу

**24.** Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль у колінних та ліктьових суглобах "летючого характеру", який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до  $37,5^{\circ}\text{C}$  ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A.** Ревматичний артрит
- B.** Туберкульозний артрит
- C.** Ревматоїдний артрит
- D.** Гонорейний артрит
- E.** Деформуючий остеоартроз

**25.** Хворий скаржиться на напад ядухи з утрудненим видихом, незначну кількість харкотиння, відчуття стиснення в грудях, сухі свистячі хрипи, які чути на відстані. Захворів раптово після вдихання запаху фарби у приміщенні. Об'єктивно: шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Грудна клітка у стані глибокого вдиху. В легенях при аускультатії на тлі жорсткого дихання сухі свистячі хрипи, ЧД- 29/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Бронхіальна астма
- B.** Бронхоектатична хвороба
- C.** Пневмонія
- D.** Сухий плеврит
- E.** Гострий трахеобронхіт

**26.** Хлопчик 14-ти років страдає на цукровий діабет. Після ін'єкції інсуліну в нього різко погіршився стан. Шкіра бліда, пітливість, мідріаз, підвищення м'язового тону, підвищення сухожильних рефлексів, загальний тремор, судоми, зниження артеріального тиску, тахікардія, розлад психіки, рівень глюкози в крові  $1,4$  ммоль/л. Визначте захворювання:

- A.** Гіпоглікемічна кома
- B.** Гіперглікемічна кома
- C.** Печінкова кома
- D.** Уремічна кома
- E.** Колапс

**27.** Вкажіть термін першого прикладання новонародженої здорової дитини до грудей матері в пологовому будинку:

- A.** В перші 30 хвилин після народження
- B.** Через 2 години після народження
- C.** Через 3 години після народження
- D.** Через 6 годин після народження
- E.** Через 1 добу після народження

**28.** Хвора 62-х років скаржиться на пітливість, серцебиття, тремор, почуття голоду. Хворіє на цукровий діабет впродовж 4-х років, приймає 20 ОД інсуліну. Яке додаткове обстеження треба прове-

сти першочергово?

- A.** Аналіз крові на глюкозу
- B.** Аналіз сечі на діастазу
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Аналіз крові на амілазу
- E.** Аналіз крові на білірубін

**29.** Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- A.** Попередній
- B.** Направляючий
- C.** Фільтруючий
- D.** Заключний
- E.** Поточний

**30.** Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігаються у разі кашлюку?

- A.** Лімфоцитоз
- B.** Анемія
- C.** Нейтрофіліоз
- D.** Еозинофілія
- E.** Тромбоцитопенія

**31.** При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- A.** Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад
- B.** Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- C.** Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- D.** Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- E.** Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

**32.** Медсестра оглядового кабінету поліклініки разом з лікарем-онкологом бере участь в огляді пацієнтки 49-ти років. При пальпації лівої молочної залози у верхньозовнішньому квадранті виявили щільне, горбисте утворення, спаяне зі шкірою. Про яке захворювання можна подумати?

- A.** Рак молочної залози
- B.** Фібroadенома
- C.** Ліпома
- D.** Аденома
- E.** Кіста молочної залози

**33.** Яка система охорони здоров'я повинна бути в сучасній Україні, згідно з концепцією МОЗ України?

- А. Змішана
- В. Державне управління охороною здоров'я
- С. Приватна медицина
- Д. Медичне страхування
- Е. Централізоване планування

34. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- А. УЗД органів черевної порожнини
- В. Загальний аналіз крові
- С. Загальний аналіз сечі
- Д. Кров на діастазу
- Е. Кров на визначення рівня холестерину

35. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- А. Анафілактична реакція
- В. Септичний шок
- С. Пірогенна реакція
- Д. Гемолітична реакція
- Е. Цитратний шок

36. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксант короткої дії - дитилін. Чим можна усунути залишкову дію цього препарату?

- А. Прозерин
- В. Налоксон
- С. Мезатон
- Д. Адреналін
- Е. Атропін

37. В центральній районній лікарні підраховували показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу кожного класу захворювань. Які графіки можна застосувати для даних показників?

- А. Секторні, лінійні
- В. Стовпчикові, лінійні
- С. Об'ємні, картограма
- Д. Радіальні, фігурні
- Е. Картограма, радіальні

38. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосовування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

ктерна дана картина?

- А. Виразкова хвороба шлунка
- В. Жовчнокам'яна хвороба
- С. Гастрит
- Д. Езофагіт
- Е. Дискінезія жовчовивідних шляхів

39. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- А. Загальний аналіз сечі
- В. Проба за Зимницьким
- С. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- Д. Визначення креатиніну
- Е. Визначення протеїнурії

40. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- А. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька
- В. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- С. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- Д. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- Е. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

41. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

- А. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська
- В. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- С. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- Д. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- Е. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

42. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія".  $t^{\circ}$  -  $38,5^{\circ}C$ . Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- A.** Після нормалізації температури тіла
- B.** Після одужання від пневмонії
- C.** Одразу
- D.** Немає обмежень в часі
- E.** Натщесерце

**43.** Через 10-ти днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулась до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді,  $t^{\circ}$ -37,4°C, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

- A.** Нефрологічне
- B.** Терапевтичне
- C.** Урологічне
- D.** Кардіологічне
- E.** Інфекційне

**44.** Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- A.** Кордіамін
- B.** Еуфілін
- C.** Мезатон
- D.** Фенобарбітал
- E.** Адреналін

**45.** Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим зняти даний стан у пацієнта?

- A.** Інгаляція кисню
- B.** Зігрівання хворого
- C.** Протисудомні засоби
- D.** Заспокійливі засоби
- E.** Протиаритмічні засоби

**46.** Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

- A.** Показник загальної захворюваності
- B.** Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
- C.** Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню
- D.** Дані про профілактичний огляд
- E.** Дані перепису населення

**47.** При розробці тарифів цін нового

приватного медичного закладу підприємці стараються забезпечити високий рівень медичної допомоги населенню і перспективність діяльності. Керуючись загальними принципами економіки при розробці ціни послуги економіст закладу враховує:

- A.** Собівартість, якість і прибуток послуги та податок держави
- B.** Незалежну вільну ціну
- C.** Податок держави
- D.** Ціни на медичні послуги передових країн
- E.** Ціни споживчого ринку

**48.** Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A.** Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B.** Регламенту
- C.** Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- D.** Нової теми досліджень
- E.** Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

**49.** У хлопчика 4-х років погане самопочуття: виражена слабкість, знижена рухова активність, блідість шкірних покривів. На шкірі та слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

- A.** Зниження рівня тромбоцитів
- B.** Зниження рівня гемоглобіну
- C.** Запалення дрібних судин
- D.** Дефіцит IX фактора
- E.** Підвищена швидкість осідання еритроцитів

**50.** При активному патронажі медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

- A.** Постійна крововтрата
- B.** Аутоімунні захворювання крові
- C.** Хронічний гепатит
- D.** Вплив іонізуючого опромінення
- E.** Резекція тонкої кишки

**51.** Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику.



З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

- A.** Профілактика розвитку ателектазів
- B.** Усунення бронхоспазмів
- C.** Зменшення хвилювання
- D.** Усунення виділень з дихальних шляхів
- E.** Профілактика дихальної недостатності

**52.** У перші місяці життя малюк, народжений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

- A.** До 18 місяців
- B.** До 12 місяців
- C.** До 6 місяців
- D.** До 3 місяців
- E.** До 24 місяців

**53.** На другу добу після лапаротомії, яка проводилася у пацієнта 31-го року під ендотрахеальним наркозом, лікар призначив йому перевертатися з боку на бік, проводити дихальну гімнастику, лужні інгаляції. Для запобігання якого ускладнення це потрібно виконувати?

- A.** Бронхіт
- B.** Парез кишечнику
- C.** Тромбоз
- D.** Емболія
- E.** Утруднення виділення з дренажу

**54.** При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A.** Вартість медичних послуг
- B.** Співвідношення збуту й цін
- C.** Загальні та відносні витрати
- D.** Імовірні стратегії конкурентів
- E.** Показники повторних купівель

**55.** Які моделі системи охорони здоров'я виділяються на основі класифікації за маркетинговими відносинами суб'єктів даної системи?

- A.** Ринкова, неринкова, натуральна, модель змішаного типу
- B.** Класична, плюралістична, страхова, національна, соціалістична
- C.** Утилітарна, комунотарна, ліберальна
- D.** Приватна, державна
- E.** Класична ринкова, страхова утилітарна, національно-ліберальна

**56.** Медсестра проводить клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Який з симптомів буде характерним для II періоду даного захворю-

вання?

- A.** Гостра ниркова недостатність
- B.** Нормалізація функції нирок
- C.** Локальні зміни в ушкоджених тканинах
- D.** Бактеріальні ускладнення
- E.** Ендогенна інтоксикація

**57.** З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- A.** Спеціальне вибіркове дослідження
- B.** Медичний огляд окремих груп
- C.** Профілактичний
- D.** Загальний
- E.** Поточний

**58.** Дев'ятимісячній дитині лікар-педіатр проводить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

- A.** 2000 - 5000 МО
- B.** 500 - 1000 МО
- C.** 250 - 500 МО
- D.** 1000 - 2000 МО
- E.** 5000 - 10000 МО

**59.** Медсестра інфекційної лікарні приготувала все необхідне для взяття мазку із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження якого захворювання проводиться дана процедура?

- A.** Кашлюк
- B.** Дифтерія
- C.** Скарлатина
- D.** Кір
- E.** Червона висипка

**60.** Якщо планування - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття управлінських рішень, то першим його етапом є:

- A.** Визначення та аналіз проблеми
- B.** Визначення цілей програми та головних дій щодо її реалізації
- C.** Вибір правильного рішення
- D.** Визначення технічних методів виконання
- E.** Визначення альтернативних варіантів

**61.** До Вас звернувся пацієнт з проблемами: біль у ділянці серця після фізичного навантаження з іррадіацією у ліву руку, тривалістю 3 хвилини, серцебиття. Який препарат доцільно використати?

- A.** Нітрогліцерин
- B.** Вольтарен
- C.** Анальгін
- D.** Корвалол
- E.** Кетанов

**62.** Пацієнт хворіє на пневмонію, лікується антибіотиками. На 4-ту добу лікування з'явилися шкірний свербіж, пухирцевий висип на шкірі, слабкість, головний біль, температура -  $37,2^{\circ}\text{C}$ , зниження апетиту. Яка проблема пацієнта буде пріоритетною?

- A.** Свербіж шкіри
- B.** Слабкість
- C.** Головний біль
- D.** Субфебрильна температура тіла
- E.** Зниження апетиту

**63.** У дівчинки 4-х років  $t^{\circ} - 37,4^{\circ}\text{C}$ , утруднене носове дихання, слизово-серозні виділення з носа, осиплість голосу, глибокий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

- A.** Гострий ларингіт
- B.** Гострий фарингіт
- C.** Гострий трахеїт
- D.** Гострий бронхіт
- E.** Обструктивний бронхіт

**64.** Медсестра здійснює догляд за дитиною 10-ти років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

- A.** Еритроцитурія, циліндрурія
- B.** Лейкоцитурія, бактеріурія
- C.** Підвищення цукру, циліндрурія
- D.** Лейкоцитурія, еритроцитурія
- E.** Еритроцитурія, бактеріурія

**65.** Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

- A.** Поточна
- B.** Попередня
- C.** Облікова
- D.** Одномоментна
- E.** Цільова

**66.** Ви досліджували захворюваність медичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

- A.** Резюме
- B.** Тези
- C.** Анотація
- D.** Конспект
- E.** Виписки

**67.** За класифікацією предметів навколишнього середовища щодо ризику поширення внутрішньолікарняної інфекції, предмети, що проникають в органи і порожнини тіла, мають:

- A.** Високий ризик
- B.** Середній ризик
- C.** Низький ризик
- D.** Помірний ризик
- E.** Нульовий ризик

**68.** У хворої на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

- A.** II ступінь
- B.** III ступінь
- C.** I ступінь
- D.** V ступінь
- E.** IV ступінь

**69.** У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації виявляється набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

- A.** Ревматична гарячка, поліартрит
- B.** Ревматична гарячка, ревмокардит
- C.** Ревматоїдний артрит
- D.** Деформуючий остеоартроз
- E.** Ревматична гарячка, мала хорея

**70.** У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природніх складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Везикулопустульоз
- B.** Пухирчатка новонароджених
- C.** Псевдофурункульоз
- D.** Фурункульоз
- E.** Герпес-інфекція

**71.** Хвора 30-ти років, оператор машинного доїння, кілька місяців скаржиться на болі у м'язах, суглобах. При огляді виявлено ознаки ураження плечового, ліктьового і кульшового суглобів, фіброзит. Про яке професійне захворювання йдеться?

- A.** Бруцельоз
- B.** Токсоплазмоз
- C.** Туляремія
- D.** Сап
- E.** Лімфогранулематоз

**72.** В лікувальному закладі розроблено бізнес-план, який включає оцінку очікуваних витрат і доходів. В якому із розділів бізнес-плану приводиться прогноз майбутніх доходів та витрат при наданні медичних послуг:

- A.** Фінансовий план
- B.** Характеристика галузі охорони здоров'я
- C.** Маркетинг-план
- D.** Виробничий план
- E.** Організаційний план

**73.** Зовнішнє кодування здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). При практичному використанні ТН ЗЕД кодування товарів варто здійснювати тільки:

- A.** Дев'ятизначним кодом
- B.** П'ятизначним кодом
- C.** Шестизначним кодом
- D.** Семизначним кодом
- E.** Восьмизначним кодом

**74.** У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у дозі:

- A.** 0,5% сибазон 0,8 мл
- B.** 0,5% сибазон 0,5 мл
- C.** 0,5% седуксен 0,5 мл
- D.** 0,5% діазепам 2 мл
- E.** 0,5% діазепам 0,2 мл

**75.** У дитини 4-х місяців спостерігаються зригування, часте рідке випорожнення зі слизом. Живіт здутий, гази відходять погано. Температура тіла -  $35,8^{\circ}\text{C}$ , АТ знижений. Втрата маси 500 г. Про що свідчить важкий стан дитини?

- A.** Кишковий токсикоз з ексикозом
- B.** Сепсис, септицемія
- C.** Сепсис, септикопемія
- D.** Адреногенітальний синдром, сільвтрачаюча форма
- E.** Білково-енергетична недостатність

**76.** У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу

зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- A.** Тетраду Фалло
- B.** Дефект міжпередсердної перегородки
- C.** Відкрити аортальну протоку
- D.** Фіброеластоз міокарда
- E.** Дефект міжшлуночкової перегородки

**77.** У дитини 8-ми місяців з гострою вірусною інфекцією стан погіршився: акроціаноз, задишка змішаного типу, роздування крил носа. В нижніх сегментах легенів симетричне притуплення перкуторного звуку. Діагноз буде підтверджувати аускультативна картина:

- A.** Дрібнопухирчасті вологі хрипи з обох сторін, дихання послаблене
- B.** Свистячі хрипи на видосі
- C.** Крупнопухирчасті вологі хрипи, дихання жорстке
- D.** Дихання в легенях жорстке, сухі хрипи
- E.** Крепітація та послаблене дихання з однієї сторони

**78.** Перелік досліджень та заходів щодо виявлення хворих з артеріальною гіпертензією та принципи їх ведення визначені наказом МОЗ України:

- A.** №247
- B.** №186
- C.** №205
- D.** №207
- E.** №236

**79.** Пацієнт 56-ти років скаржиться на переймоподібний біль в животі, закрепи, рідкі випорожнення з кров'ю протягом року. Схуд на 15 кг. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт м'який, у лівому підреб'ї пальпується помірно болюче, щільне утворення. У крові: ер.- 3,  $0 \cdot 10^{12}/\text{л}$ , Нб- 98 г/л. Назвіть найбільш інформативний метод діагностики:

- A.** Колоноскопія (з біопсією)
- B.** УЗД
- C.** Комп'ютерна томографія
- D.** Іригоскопія
- E.** Магніто-резонансна терапія

**80.** У пацієнтки 28-ти років, яка хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки серед повного благополуччя раптово виник сильний "кинджалоподібний" біль в пілородуоденальній ділянці. Прийом 2-х таблеток но-шпи біль не зняв. Об'єктивно: Рс- 90/хв., АТ- 125/70 мм рт.ст. Пальпація живота різко болюча в пілородуоденальній ділянці, симптоми подразнення очеревини позитивні. У крові: Нб- 124 г/л, лейкоцити -  $16,8 \cdot 10^9/\text{л}$ , ШОЕ- 12 мм/год. Ці скарги вказують на:

- A.** Перфорацію виразки
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гостру кишкову непрохідність
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Пенетрацію виразки 12-палої кишки

**81.** До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ-100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- A.** Оглядова рентгенографія
- B.** УЗД
- C.** Іригоскопія
- D.** Лапароцентез
- E.** Колоноскопія

**82.** Під час медсестринського обстеження пацієнта, який тривалий час страждає на цироз печінки, виникло блювання свіжою кров'ю. Стан пацієнта тяжкий, шкірні покрови бліді, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв., слабкого наповнення. Вкажіть імовірну причину кровотечі:

- A.** Варикозно розширені вени стравоходу
- B.** Виразкова хвороба шлунка
- C.** Перфоративна виразка шлунка
- D.** Пухлина шлунка
- E.** Виразка 12-палої кишки

**83.** В одному із фермерських господарств травмувалася молода людина. Лікар запідозрив перелом стегна. Яку шину повинна підготувати і застосувати медична сестра сімейного лікаря?

- A.** Шина Дітерікса
- B.** Шина Беллера
- C.** Шина Фільберга
- D.** Шина Крамера
- E.** Шина Дельбе

**84.** Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервоній слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовтобілого кольору обмежені нашарування. Перераховані симптоми вказують на:

- A.** Лакунарна ангіна
- B.** Фолікулярна ангіна
- C.** Катаральна ангіна
- D.** Гостра респіраторна вірусна інфекція
- E.** Дифтерія зівя

**85.** До лікаря звернулася пацієнтка 44-х років, масажистка за фахом. Скаржиться на біль і відчуття поколювання в руках під час роботи і після її припинення. Особливо біль непокоїть вночі. Об'єктивно: пасивні рухи в кінцівках вільні, безболісні. При активних рухах виникає різкий біль в руках. Пальпаторно м'язи рук ущільнені, пальпуються болючі вузлики діаметром до 1 см. Це характерно для:

- A.** Міозиту
- B.** Міалгії
- C.** Артрозу
- D.** Дискінезії
- E.** Бурситу

**86.** Соціальна медицина, як наука, володіє різноманітними методами дослідження. Як називається статистичне дослідження, яке охоплює облік усіх одиниць спостереження?

- A.** Суцільне дослідження
- B.** Монографічне дослідження
- C.** Дослідження основного масиву
- D.** Вибіркове дослідження
- E.** Несуцільне дослідження

**87.** Диспансерні контингенти населення підлягають періодичним профілактичним оглядам, програми яких передбачають такі дослідження: аналіз крові, аналіз сечі на глюкозу, аналіз сечі на білок, флюорографію. Назвіть віковий термін проведення даної програми?

- A.** З 12 років 1 раз на 2 роки
- B.** З 7 років 1 раз на 2 роки
- C.** З 12 років 1 раз на 1 рік
- D.** З 14 років 1 раз на 2 роки
- E.** З 14 років 2 рази на 1 рік

**88.** На прийомі мати 5-ти місячної дитини скаржиться на те, що маля неспокійне, погано спить, пітніє, з'явилось облісіння потилиці. При обстеженні: краї переднього тім'ячка розм'якшені, краніотабес. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Рахіт
- B.** Кефалогематома
- C.** Астено-невротичний синдром
- D.** Алергічний діатез
- E.** Нервово-артритичний діатез

**89.** Вас викликали до дитини 10-ти років, мати якої скаржиться на появу ціанозу,

задишку. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. На момент огляду дихання утруднене, кашель, ціаноз шкіри. Якої допомоги потребує дитина?

- A.** Прийом Геймліха
- B.** Прийом Леопольда
- C.** Відсмоктування слизу з рота та носа
- D.** Термінова інтубація трахеї
- E.** Протишокові заходи

**90.** При складанні звіту за рік за формою №24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту", було зареєстровано 102 проведених бесіди з населенням. На основі якої облікової медичної документації заповнюється ця частина звіту?

- A.** Журнал обліку з гігієнічного виховання населення
- B.** Журнал реєстрації листків непрацездатності
- C.** Журнал реєстрації амбулаторних хворих
- D.** Журнал обліку інфекційних захворювань
- E.** Журнал обліку процедур

**91.** Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечопуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Сечокислий інфаркт нирок
- B.** Статевий криз
- C.** Пієлонефрит
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Вульвовагініт

**92.** У дитини 4-х років із сім'ї хворих на туберкульоз декілька днів тому з'явилися головний біль, блювання, підвищення температури тіла, погіршення апетиту. Об'єктивно: дитина млява, апатична, температура тіла - 38,6°C, ЧСС- 100/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст., мова тиха, невиразна, виражена ригідність м'язів потилиці, позитивні симптоми Керніга, Брудзінського. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A.** Туберкульозний менінгіт
- B.** Менінгококовий менінгіт
- C.** Гостра респіраторна вірусна інфекція
- D.** Вірусний енцефаліт
- E.** Епідемічний паротит

**93.** Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верх-

ній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий гематогенний остеомієліт
- B.** Флегмона правої гомілки
- C.** Вивих правого колінного суглоба
- D.** Перелом правого колінного суглоба
- E.** Гострий артрит колінного суглоба

**94.** На шляху до роботи чоловіка збила автомашина. Об'єктивно: свідомість відсутня, зіниці на світло не реагують, шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс слабкий, частий, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Із рота, носа і вух кров'яні виділення. Який імовірний діагноз?

- A.** Перелом основи черепа
- B.** Струс мозку
- C.** Перелом склепіння черепа
- D.** Крововилив у мозок
- E.** Перелом кісток черепа обличчя

**95.** У приймальне відділення доставлено хворого 56-ти років. Стан пацієнта важкий, шкіра бліда, Рс- 132/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт м'який, болючий. Позитивні симптоми Валя, шум плеску. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини - наявність чаш Клойбера. Про яке захворювання свідчать вище вказані ознаки?

- A.** Кишкова непрохідність
- B.** Гострий апендицит
- C.** Асцит
- D.** Перитоніт
- E.** Гострий панкреатит

**96.** Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри на лівій гомілці. Хворіє 2 дні. Температура тіла - 39,5°C. Об'єктивно: в ділянці середньої третини лівої гомілки відмічаються набряк, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями, місцями пухирі різних розмірів, заповнені серозно-геморагічним ексудатом. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- A.** Бешиха
- B.** Фурункульоз
- C.** Гострий тромбофлебіт
- D.** Флегмона
- E.** Лімфангоїт

**97.** В хірургічне відділення госпіталізований хворий, який скаржиться на біль і випинання в правій пахвинній ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій

паховий ділянці невправиме напружене болісне випинання. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- A. Защемлена пахвинна грижа
- B. Абсцес правої пахвинної ділянки
- C. Ліпома правої пахвинної ділянки
- D. Туберкульоз лімфатичних вузлів
- E. Гострий лімфаденіт

98. В приймальне відділення доставлений хворий, який після травми відмічає біль і неможливість рухів у правому плечовому суглобі. При огляді правий плечовий суглоб деформований, рухи в суглобі різко обмежені, пружні. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- A. Вивих плеча
- B. Розрив м'язів плеча
- C. Перелом передпліччя
- D. Перелом ключиці
- E. Перелом плечової кістки

99. Пацієнтка 48-ми років прооперована з приводу перфоративної виразки шлунка. З метою профілактики кровотечі на ділянку післяопераційної рани медична сестра поклала міхур з льодом. Вкажіть максимальний час, протягом якого можна тримати накладений міхур із льодом не знімаючи:

- A. 2-3 години
- B. 1-2 години
- C. 3-4 години
- D. 4-5 годин
- E. 5-6 годин

100. Медична сестра стала свідком травми чоловіка, який пірнав у воду з висоти 2 м. Об'єктивно: при пальпації визначається болісність у ділянці 5-го шийного хребця, крепітація остистого відростка. Вкажіть вид іммобілізації, який необхідно застосувати при транспортуванні пацієнта в лікарню:

- A. Комірець Шанца
- B. Шина Ентіна
- C. Шина Єланського
- D. Шина Башмакова
- E. Ватно-марлеве кільце

101. У пацієнта раптовий гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, іррадіює в стегно. Позитивний симптом Пастернацького. Для якої патології характерні дані ознаки?

- A. Ниркова колька
- B. Гострий холецистит
- C. Печінкова колька
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий апендицит

102. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

- A. Визначення амілази крові
- B. Зняття ЕКГ
- C. Загальний аналіз крові
- D. Оглядовий знімок грудної клітки
- E. Оглядовий знімок черевної порожнини

103. У пацієнта 63-х років, який протягом десяти років хворіє на хронічний лімфолейкоз, на фоні вираженого погіршення самопочуття в периферичній крові виявлено 15% лімфобластичних клітин. Як називається такий стан?

- A. Бластна криза
- B. Зсув лейкоцитарної формули вліво
- C. Зсув лейкоцитарної формули вправо
- D. Лімфоцитоз
- E. Лейкемічний провал

104. У ревматологічному відділенні на лікуванні знаходиться хвора зі скаргами на субфебрилітет, загальну слабкість, болі в суглобах, стискаючі болі в серці. Лікар діагностував ревматичну лихоманку. Вкажіть збудника, що викликає дане захворювання:

- A. Бета-гемолітичний стрептокок групи А
- B. Бета-гемолітичний стрептокок групи С
- C. Стафілокок
- D. Пневмокок
- E. Вірус Епштейн-Барра

105. Ви провізор аптеки. Як називається офіційний документ, що містить найменування та коди класифікаційних груп і/або об'єктів класифікації?

- A. Класифікатор
- B. Реєстр
- C. Каталог
- D. Кодифікатор
- E. Список

106. Бромкамфору, йод, ментол, тимол, спиртові настойки, рідкі спиртові концентрати, густі екстракти зберігають у прохолодному місці, у герметично закупореній тарі з непроникних матеріалів (скла, металу, товстостінної пластмаси) при відносній вологості повітря 50-60%. До якої групи належать вказані лікарські засоби?

- A.** Легколеткі (потребують захисту від випаровування)
- B.** Пахучі і забарвлюючі
- C.** Що потребують захисту від зниженої температури
- D.** Вибухонебезпечні
- E.** Що потребують захисту від світла

**107.** Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках)  $\times$  1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- A.** Поширеність захворювань
- B.** Первинна захворюваність
- C.** Госпітальна захворюваність
- D.** Інфекційна захворюваність
- E.** Захворюваність з тимчасовою втраченою працездатності

**108.** Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Хвороба Іценко-Кушінга
- B.** Акромегалія
- C.** Гіпертонічна хвороба
- D.** Ревматична хвороба
- E.** Гіпотиреоз

**109.** Жінка скаржиться на тупий біль у навколупупковій ділянці, здуття живота, кашкоподібні випорожнення до 4-5 разів на добу, неболючі. Відразу після акту дефекації з'являється нудота, холодний піт, тремтіння кінцівок. Хворіє 5 років. Під час пальпації - болючість у навколупупковій ділянці. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Хронічний ентерит
- B.** Хронічний панкреатит
- C.** Хронічний піелонефрит
- D.** Хронічний гастрит
- E.** Хронічний холецистит

**110.** Який вид медичної допомоги є найбільш затратний в умовах ринкової економіки?

- A.** Стаціонарна
- B.** Амбулаторно-поліклінічна
- C.** Швидка медична допомога
- D.** Санаторно-курортна
- E.** Реабілітація

**111.** Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?

- A.** Кабінет долікарського прийому
- B.** Терапевтичний кабінет
- C.** Кабінет медоглядів
- D.** Кабінет функціональної діагностики
- E.** Денний стаціонар

**112.** Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,9^{\circ}\text{C}$ , розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

- A.** Шигельоз
- B.** Сальмонельоз
- C.** Іерсиніоз
- D.** Ешеріхіоз
- E.** Ротавірусна інфекція

**113.** В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- A.** Постнеонатальна смертність
- B.** Перинатальна смертність
- C.** Неонатальна смертність
- D.** Рання неонатальна смертність
- E.** Загальний показник смертності

**114.** За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про кількість проведених хворими ліжко-днів і кількість хворих, що вибули із стаціонару протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних?

- A.** Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
- B.** Середньорічна зайнятість
- C.** Обіг ліжка
- D.** Загальна летальність
- E.** Ефективність використання ліжкового фонду

**115.** Для наочності у медичній статистиці використовуються графічні зображення. Які з перелічених діаграм використовуються для характеристики зміни явища за часом?

- A.** Лінійні
- B.** Картодіаграма
- C.** Секторні
- D.** Внутрішньостовпчикові
- E.** Картограма

**116.** В основу поділу теорії розвитку менеджменту на етапи покладено періоди створення певних наукових шкіл управління. Хто ввів термін "наукове управління"?

- A.** Ф. Тейлор
- B.** Я. Гілберт
- C.** Г. Форд
- D.** Г. Гантт
- E.** Е. Мейо

**117.** При організації свого робочого місця слід врахувати економічні, інформаційні, ергономічні та гігієнічні вимоги. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця?

- A.** Природне
- B.** Штучне
- C.** Змішане
- D.** Не має значення
- E.** Люмінісцентне

**118.** Керівнику лікувально-профілактичного закладу під час виконання службових обов'язків доводиться мати справу з різними документами. За термінами зберігання всі документи поділяються на:

- A.** Постійні, тимчасові, тривалі
- B.** Термінові, нетермінові
- C.** Сталі, змінні
- D.** Типові, трафаретні
- E.** Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні

**119.** Головний лікар ЦРЛ за важливих обставин не зміг бути присутнім на обласній конференції, але передав повноваження своєму заступнику, який взяв на себе відповідальність за виконання даної вказівки. Вкажіть законні підстави для виконання вказаної дії:

- A.** Делегування
- B.** Керування
- C.** Мотивація
- D.** Лідерство
- E.** Повноваження

**120.** Пацієнт скаржиться на появу сечі кольору "м'ясних ополосків", головний біль, набряки на обличчі. Три тижні тому хворів на ангіну. Об'єктивно: обличчя бліде, одутле, АТ- 145/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Гіпертонічна хвороба
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Хронічний пієлонефрит
- E.** Амілоїдоз нирок

**121.** Пацієнт поступив в пульмонологічне відділення зі скаргами на біль в правій половині грудної клітки, який посилюється під час кашлю і дихання, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, підвищення температури до 39,5°C, задишку. Вкажіть препарат, який застосовується з метою етіотропного лікування:

- A.** Цефтріаксон
- B.** Лазолван
- C.** Аспірин
- D.** Сульфоксамфокан
- E.** Лібексин

**122.** В маніпуляційному кабінеті після підшкірного введення ціанокобаламіну пацієнтка відчула себе зле: з'явилися шум у вухах, відчуття ядухи, запаморочення. Які дії медичної сестри стосовно місця ін'єкції будуть доцільними?

- A.** Застосувати міхур з льодом
- B.** Накласти стискаючу пов'язку
- C.** Обробити спиртом
- D.** Накласти компрес
- E.** Накласти грілку

**123.** Пацієнта турбує ранкова скутість у дрібних суглобах кистей, постійний біль у них, який посилюється при будь-яких рухах, неможливість одягатися. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Ревматоїдний артрит
- B.** Ревматичний поліартрит
- C.** Деформуючий остеоартроз
- D.** Системний червоний вовчак
- E.** Склеродермія

**124.** Під час клінічного обстеження пацієнта 33-х років виявлені скарги на біль, набряк і почервоніння шкіри. Об'єктивно: на внутрішній поверхні стегна визначається округлий інфільтрат, який дещо виступає над її поверхнею. В центрі інфільтрату є білуватий стрижень. Який діагноз можна поставити?

- A.** Фурункул
- B.** Абсцес
- C.** Флегмона
- D.** Гідраденіт
- E.** Бешиха

**125.** У працівника зерносховища після прибирання зерна, що гниє, виникли наступні симптоми: нездужання, гарячка,



сухий кашель. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A.** "Фермерська легеня"
- B.** Силікатоз
- C.** Антракоз
- D.** Сидероз
- E.** Азбестоз

**126.** Працівник, що брав участь у ліквідації пожежі в приміщенні, де зберігалось 2 кг металевої ртуті, доставлений у клініку із скаргами на емоційну нестриманість, серцебиття, пітливість, тремтіння тіла, плаксивість, біль в ділянці серця. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, у хворого стан депресії, стійкий червоний дермографізм, еретизм, нестійкий рівень АТ. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку?

- A.** Унітіол
- B.** Тетацин кальцію
- C.** Атропіну сульфат
- D.** Амільнітрит
- E.** Дипіроксим

**127.** Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- A.** 3 етапи
- B.** 2 етапи
- C.** 1 етап
- D.** 4 етапи
- E.** 5 етапів

**128.** Пацієнту, який знаходиться на амбулаторному лікуванні, з приводу тимчасової непрацездатності видається документ. Як називається документ, що дає право на одержання виплат з державного соціального страхування?

- A.** Листок непрацездатності
- B.** Студентська довідка
- C.** Статистичний талон
- D.** Довідка про непрацездатність
- E.** Консультаційне заключення

**129.** Дівчинка, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржиться на головний біль, шум та біль у вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

- A.** Симптом Мурсона
- B.** Плями Філатова-Коплика-Бельського
- C.** Енантема на твердому піднебінні
- D.** "Географічний язик"
- E.** "Малиновий язик"

**130.** Медсестра працює в перев'язуваль-

ному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною раною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

- A.** Лізис некротичних тканин
- B.** Знеболювання
- C.** Поліпшення кровообігу тканин
- D.** Утворення лінійного рубця
- E.** Зменшення температури тіла

**131.** Під час проведення проби на резус-сумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію?

- A.** Несумісна по Rh-фактору
- B.** Резус-позитивна
- C.** Сумісна по Rh-фактору
- D.** Резус-негативна
- E.** Пробу треба переробити

**132.** До медсестри звернулася сусідка, яка тиждень тому наколола ногу на горді. До лікаря не зверталась, лікувалась вдома. Скарги на сіпаючий біль у рані, напруження жувальних м'язів. Обличчя має страждальний вираз. Що з хворою?

- A.** Правець
- B.** Гнійна рана
- C.** Остеомієліт
- D.** Неврит лицьового нерва
- E.** Бешиха

**133.** Ви працюєте медсестрою в онкологічному диспансері. Вкажіть, яке із захворювань прямої кишки належить до передракових станів і потребує обов'язкового диспансерного спостереження?

- A.** Поліп прямої кишки
- B.** Тріщини прямої кишки
- C.** Запалення слизової прямої кишки
- D.** Геморой
- E.** Нориці прямої кишки

**134.** Хірург планує провести пацієнту з пневмотораксом плевральну пункцію. Вкажіть місце оброблення операційного поля для майбутньої пункції:

- A.** II міжребер'я по середньо-ключичній лінії
- B.** VII міжребер'я по задньо-пахвовій лінії
- C.** VI міжребер'я по парагрудинній лінії
- D.** VII міжребер'я по лопатковій лінії
- E.** IV міжребер'я по середньо-пахвовій лінії

**135.** Метою охорони здоров'я є зміцнен-

ня та збереження здоров'я кожної людини. Назвіть основне завдання медико-гігієнічного навчання та виховання населення:

- A.** Формування здорового способу життя
- B.** Збір статистичних даних про стан здоров'я населення
- C.** Розробку заходів по охороні навколишнього середовища
- D.** Надання медичної допомоги на засадах ПМСД
- E.** Оптимізацію управління охороною здоров'я

**136.** Існують різні форми та джерела фінансування охорони здоров'я. Назвіть основні джерела фінансування державних закладів охорони здоров'я:

- A.** Кошти державного та місцевих бюджетів
- B.** Внутрішні ресурси, які надходять у результаті господарсько-фінансової діяльності закладів охорони здоров'я
- C.** Гуманітарна допомога
- D.** Акції, облігації, кредити
- E.** Бюджетні надходження, кошти від ОМС і ДМС, власні кошти громадян

**137.** Медичне страхування виконує три основні функції. Який документ є гарантом соціального захисту громадян в галузі охорони здоров'я, та є носієм цих функцій?

- A.** Медичний поліс
- B.** Паспорт
- C.** Диплом про медичну освіту
- D.** Посвідчення почесного донора
- E.** Бізнес-план

**138.** Оплата медичних послуг - це процес фінансових розрахунків за надану допомогу. Як поділяється система оплати медичних послуг залежно від часу?

- A.** Ретроспективна та проспективна
- B.** Стратегічна та оперативна
- C.** Оперативна та проспективна
- D.** Проспективна та короткотривала
- E.** Довготривала, середньотривала та короткотривала

**139.** Ціна має багато функцій. Яка із функцій ціни мотивує підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості?

- A.** Стимулююча
- B.** Обліково-вимірювальна
- C.** Розподільча
- D.** Регулююча
- E.** Порівняльна

**140.** Пацієнт поскаржився на часті запаморочення та втрату свідомості при фізичних навантаженнях. В анамнезі - ревматична хвороба впродовж 23-х років. При об'єктивному обстеженні виявлено блідість шкірних покривів, пульсацію сонних артерій та похитування голови в такт пульсу. Для якої вади серця характерні дані симптоми?

- A.** Недостатність клапанів аорти
- B.** Тетрада Фало
- C.** Стеноз мітрального отвору
- D.** Недостатність мітрального клапану
- E.** Недостатність трьохстулкового клапану

**141.** Пацієнтка тривалий час скаржиться на нудоту, блювання, гіркоту у роті, тяжкість в правому підбер'ї, особливо після вживання жирної їжі. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий у точці жовчного міхура. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

- A.** Хронічний холецистит
- B.** Жовчнокам'яна хвороба
- C.** Виразкова хвороба
- D.** Хронічний гепатит
- E.** Хронічний панкреатит

**142.** У пацієнта два тижні тому з'явилися кашель з виділенням харкотиння з неприємним запахом, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: стан пацієнта тяжкий, ЧД- 24/хв. Рентгенологічно: в лівій легені виявлено порожнину до 3 см в діаметрі з горизонтальним рівнем рідини. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Абсцес легені
- B.** Пневмонія
- C.** Ексудативний плеврит
- D.** Інфільтративний туберкульоз
- E.** -

**143.** Проводячи "п'ятихвилинку", старша медична сестра хірургічного відділення, прагне підкорити весь колектив своїй волі, не сприймає заперечень і не прислухається до думки інших, вимагає пунктуального виконання своїх вказівок. Який тип поведінки характерний даному керівникові?

- A.** Авторитарний тип
- B.** Демократичний тип
- C.** Песимістичний тип
- D.** Ліберальний тип
- E.** Соціалістичний тип

**144.** Ви - головна медична сестра. Поясніть старшій медичній сестрі, як нази-

вається документ, який складається за вказівкою голови чи керівника колегіального органу або самостійно в межах його повноважень з оперативних питань, не потребує колегіального рішення:

- A.** Розпорядження
- B.** Рішення
- C.** Наказ
- D.** Протокол
- E.** Довідка

**145.** Існує інформація призначена для автоматизованих ідентифікацій та обліку даних про товар, закодована у вигляді цифр і штрихів. Як вона називається?

- A.** Штрихова
- B.** Символічна
- C.** Образотворча
- D.** Словесна
- E.** Кодова

**146.** У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити -  $6,0 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін - 150 г/л, лейкоцити -  $15 \cdot 10^9/л$ , нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

- A.** П'ятий день життя
- B.** Перший день життя
- C.** Десятий день життя
- D.** Двадцятий день життя
- E.** Тридцятий день життя

**147.** Дитина 5-ти років хворіє близько двох тижнів, скаржиться на гнійно-кров'янисті виділення з носа, мацерації крил носа та верхньої губи. При риноскопії на носовій перетинці білісуватосірі острівці. Слизова ротоглотки не змінена. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

- A.** Дифтерію носа
- B.** Алергічний риніт
- C.** Риновірусну інфекцію
- D.** Аденовірусну інфекцію
- E.** Фарингіт

**148.** Дитині 6 місяців, знаходиться на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Під час огляду медична сестра-бакалавр виявила у дитини гіпотрофію I ступеня. Який перший прикорм найбільш бажаний для цієї дитини?

- A.** Молочні каші
- B.** Овочеві пюре
- C.** Фруктові пюре
- D.** М'ясне пюре
- E.** Кисло-молочний сир

**149.** Медична сестра-бакалавр прийшла на патронаж до дитини першого року життя. Об'єктивно: дитина добре утримує голівку у вертикальному положенні, доторкається до предметів, посміхається, спостерігається позитивна емоційна реакція на матір. Якому віку відповідає психомоторний розвиток дитини?

- A.** 3 місяці
- B.** 1 місяць
- C.** 2 місяці
- D.** 2 тижні
- E.** 3 тижні

**150.** Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5-ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмоконіозу в нього може виникнути?

- A.** Сидероз
- B.** Азбестоз
- C.** Антракоз
- D.** Бісиноз
- E.** Бериліоз

## **НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ**

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК Б. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА.**

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.  
(Українською мовою).

Підписано до друку 28.03/№28. Формат 60x84 1/8  
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Cyr. Друк офсет.  
Ум.друк.арк. 16. Облік.вид.арк. 20.  
Тираж.(300 прим. – укр. мова).

<b>Б</b>		мерзлякуватість	зябкість	рукавичка	перчатка
бешиха	рожа	мета	цель	рідина	жидкость
блідість	бледность	мигдалик	миндалина	рух	движение
блювання	рвота	миготливий	мерцательный	рухливість	подвижность
блювотний	рвотный	міжшлуночковий	межжелудочковый	<b>С</b>	
<b>В</b>		міський	городской	самогубство	самоубийство
вагітність	беременность	міхур	пузырь	свербіж	зуд
вигодовування	вскармливание	млявий	вялый	своєчасний	своевременный
вличний	скуловой	<b>Н</b>		сеча	моча
виразка	язва	набряк	отёк	синець	синяк
виробничий	производственный	нагубання	набухание	скельце	стёклышко
виснаження	истощение	надмірний	избыточный	склад	состав
висновок	вывод	наочність	наглядность	слабодухість	слабодушие
витрати	расходи	напередодні	накануне	слинотеча	слинотечение
відраза	отвращение	напружений	напряженный	собівартість	себестоимость
відрижка	отрыжка	народжуваність	рождаемость	спадковість	наследственность
вогнищевий	очаговый	натще	натощак	споживач	потребитель
вологість	влажность	нашарування	наслоение	сполука	соединение
воротар	привратник	недостатність	недостаточность	справжній	истинный
втомлюваність	утомляемость	нежить	насморк	стать	пол
втручання	вмешательство	незбираний	цельный	стискаючий	давящий
вуглеводень	углеводород	нездужання	недомогание	струміль	струя
вуглець	углерод	необрнтований	необоснованный	суглоб	сустав
вузловий	узловой	непритомність	обморок, потеря	сумісність	совместимость
<b>Г</b>		нирка	почка	суміш	смесь
гавкаючий	лающий	нориця	свиц	сумний	грустный
галузевий	отраслевой	нудота	тошнота	супровідний	сопроводительный
годинник	часы	<b>О</b>		сутінковий	сумеречный
годування	кормление,	обличчя	лицо	схуднення	похудение
голка	иголка	облік	учёт	<b>Т</b>	
гомілка	голень	оглядовий	обзорный	терміновий	экстренный
гострик	острица	ознака	признак	тиждень	неделя
гумовий	резиновый	олія	масло	тиск	давление
густина	плотность	оперізуючий	опоясывающий	тім'ячко	родничок
<b>Д</b>		оприбуткування	оприходование	травний	пищеварительный
державний	государственный	опік	ожог	тривалий	длительный
дертя	першение	отруєння	отравление	туга	тоска
діжка	бочка	отрутохімікат	ядохімікат	тулуб	туловище
добування	добыча	оцет	уксус	<b>У</b>	
догляд	уход	очеревина	брюшина	умови	условия
доповідь	доклад	<b>П</b>		уникнення	избегание
дратівливість	раздражительность	паління	курение	уповноважений	уполномоченный
<b>Ж</b>		пальпується	пальпируется	ураження	поражение
жовтяниця	желтуха	папір	бумага	ускладнення	осложнение
<b>З</b>		пахвинний	паховый	усунення	устранение
забій	ушиб	пахвовий	подмышечный	<b>Х</b>	
загоєння	заживление	передміхуровий	предстательный	харкотиння	мокрота
залежність	зависимость	плодючість	плодовитость	харчування	питание
запаморочення	головокружение	повіки	веки	хвороба	болезнь
запобігання	предотвращение	позалікарняний	внебольничный	хиба	погрешность
затерпність	онемение	попит	спрос	хода	походка
зберігання	хранение	послуга	услуга	хребет	позвоночник
зведення	сводка	потилиця	затылок	<b>Ц</b>	
зіниця	зрачок	поточний	текущий	цівка	струйка
зіставити	сопоставить	поштовхоподібний	толчкообразный	цукор	сахар
зміст	содержание	правець	столбняк	цукровий	сахарный
знеболювання	обезболивание	прибуток	прибыль	<b>Ч</b>	
<b>І</b>		приглухуватість	тугоухость	чадний	угарный
істотно	существенно	пригнічений	угнетённый	черговий	дежурный
<b>К</b>		присмак	привкус	чергування	дежурство
каламутний	мутный	пухирець	пузырёк	черевний	брюшной
квасоля	фасоль	променевий	лучевой	черевце	брюшко
керівництво	руководство	просування	продвижение	<b>Ш</b>	
кінцівка	конечность	пухлина	опухоль	шар	слой
клекочучий	клокочущий	<b>Р</b>		шкіра	кожа
кошторис	смета	раптово	внезапно	шкірний	кожний
кукса	культя	ризик	риск	шлунок	желудок
кульгавість	хромота	рідина	жидкость	штучний	искусственный
кульшовий	тазобедренний	рідкий	жидкий	<b>Щ</b>	
кут	угол	рогівка	роговица	щелепа	челюсть
<b>Л</b>		родзинки	изюм	щеплення	прививка
литковий	икриножний	роділля	роженца	щур	крыса
лоно	лобок	розбіжність	расхождение	<b>Я</b>	
лужний	щелочной	розвантажувальний	разгрузочный	ядуха	удушьё
лусочка	чешуйка	розпал	разгар	якість	качество
<b>М</b>		розпитування	расспрос	ясна	дёсна
марення	бред	розтин	сечение		