

# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою  
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

ID студента										Прізвище									

Варіант \_\_\_\_\_

## Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

### Крок М

## ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА



# ІНСТРУКЦІЯ

**Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та заمالуйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.**

ББК 54.1я73  
УДК 61

**Автори тестових завдань:** Апшай В.Г., Беликова Н.А., Біліченко О.В., Богданова Н.І., Бойко З.М., Бондаренко О.І., Бондарева В.І., Борискін С.В., Брицька Н.А., Воронін Ю.Г., Гарко Я.О., Гнилицька О.М., Головацька Л.О., Голодняк Л.С., Голодько Л.П., Гольник В.І., Гонтірова А.М., Городецька А.В., Давиденко О.В., Джаббаров Л.М., Ефанова С.А., Жегур Ю.О., Жукович Р.В., Зайцева В.П., Захарова С.Т., Зяблова З.М., Ілясов С.В., Ілясова Ю.С., Кислюк В.П., Кіон О.І., Климовець Л.А., Ковальчук В.І., Ком'яті М.А., Коробчанська В.Д., Коротєєва І.В., Кострик С.М., Коцюра Л.В., Кравцов В.В., Крапива О.В., Краснер П.М., Кузик Ф.В., Кухарчук Н.В., Лавровська А.А., Лейзерова О.В., Летута Т.І., Липова О.О., Лиськів А.М., Лиськова С.В., Маренко В.М., Марсак І.І., Меля І.О., Москаленко Л.М., Мошківський І.В., Мурзіна О.П., Мухіна Т.С., Наказний О.В., Недільська Н.О., Нестеренко І.І., Никитенко О.А., Новицька І.О., Овчаренко О.А., Одинець М.В., Онопрієнко О.Д., Онуфрієнко О.П., Ошовська В.В., Паламарчук В.Б., Пасека Л.В., Печериця Н.О., Полторацький В.А., Попадинец І.П., Попадюк Т.М., Радик Т.О., Рапацька А.В., Распопова А.Є., Рачинська І.М., Росада Т.М., Рубежанська І.А., Савонік Л.В., Самусь С.О., Сенюк Л.В., Серєда Л.М., Сисоєнко Б.В., Скрипник Г.Ю., Соколова Н.С., Спірева В.І., Стецюра В.І., Суббочева Т.В., Тодорів М.В., Толстограєва О.Ю., Троц В.М., Тютюнник О.В., Харківська Л.П., Хвостикова І.М., Хоменко О.І., Цимбалюк М.А., Чопик О.С., Шамраєнко С.О., Шапошнікова В.М., Шевчук В.І., Шивріна Т.І., Шидловська О.С., Шостак С.І., Юрков С.І., Юхимчук В.В., Явнюк А.М., Якубів К.Ю., Ярошенко І.В. та Комітети фахової експертизи.

**Рецензенти.** Експерти: Андриєнко Н.А., Білецька А.Г., Василюк В.М., Гарасимчук Є.Б., Гарко Я.О., Горбач Л.М., Зіміна В.С., Козуб Т.О., Конькова О.М., Краснослободцева О.Н., Кульчицька О.М., Липова О.О., Луцько А.О., Міщук І.М., Мошківська С.Д., Мухіна Т.С., Неділько І.М., Новицька Л.А., Пленова Н.П., Самойленко В.Б., Сапіжак М.І., Селєзньова Н.Б., Сікержинська Л.В., Сінюгіна В.О., Скомаровська Л.І., Тютюнник О.В., Харченко Н.С.

**Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М. Лікувальна справа” та подальшого використання у навчальному процесі.**

**Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку фельдшерів.**

**Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів (листи МОЗ України від 12.07.2013 № 08.01-47/994/20707, 16.07.13 № 08.01-47/1016/21061; наказ МОЗ України від 12.12.2013 №1079).**

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. Дитина 5-ти років захворіла гостро через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

- A. Геморагічний васкуліт, шкірна форма
- B. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- C. Кір
- D. Хвороба Верльгофа
- E. Менінгококцемія

2. У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- A. Природженій ваді серця
- B. Вегетосудинній дистонії
- C. Ревматизмі
- D. Малій хорей
- E. Інфекційному міокардиті

3. Дитину 2-х років у праву долоню вкусила комаха. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширився набряк тканин. Температура тіла підвищилася до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

- A. Набряку Квінке
- B. Кропив'янки
- C. Анафілактичного шоку
- D. Сінної лихоманки
- E. Молочного струпу

4. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта?

- A. У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого набік
- B. У положенні сидячи
- C. У горизонтальному положенні лежачи на животі
- D. У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого набік
- E. У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами

5. До ФАП звернувся чоловік 44-х років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку під час незначного фізичного навантаження, підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість. Хворіє близько 10-ти років. Робота пов'язана з переохолодженнями. Палить з юнацького віку по 1-й пачці цигарок на

день. Грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно: коробковий звук. Аускультативно: середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. Хронічний обструктивний бронхіт
- B. Бронхоектатична хвороба
- C. Гострий бронхіт
- D. Бронхіальна астма
- E. Хронічний катаральний бронхіт

6. Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання "кавовою гущею"; загальна слабкість, шум у вухах, запаморочення, тахікардія, зниження АТ. Який препарат необхідно ввести першочергово?

- A. Дицинон
- B. Но-шпа
- C. Лазикс
- D. Анальгін
- E. Преднізолон

7. До фельдшера звернувся чоловік, який скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, який виник після їзди на велосипеді. Об'єктивно: склери жовтяничні. Живіт болючий у правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. Жовчнокам'яна хвороба
- B. Цироз печінки
- C. Хронічний гепатит
- D. Хронічний гастрит
- E. Виразкова хвороба

8. Фельдшера викликали до чоловіка 26-ти років, який був у непритомному стані. З дитинства хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону. Шкіра суха, холодна на дотик. Зіниці звужені. Пульс - 100/хв., ниткоподібний. Живіт здутий, черевна стінка напружена. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. Гіперглікемічна кома
- B. Гіпоглікемічна кома
- C. Печінкова кома
- D. Уремична кома
- E. Алкогольна кома

9. До ФАП звернувся чоловік зі скаргами на тяжкість у правому підребер'ї, загальну слабкість. Три роки тому хворів на вірусний гепатит В. Об'єктивно: склери та шкіра жовтяничні. "Судинні зірочки" на шкірі грудної клітки. Печінка збільшена на 3 см. У крові: підвищений рівень білірубіну і трансаміназ. Найімовірніший попередній діагноз:

- A.** Хронічний гепатит
- B.** Хронічний холецистит
- C.** Жовчнокам'яна хвороба
- D.** Хронічний панкреатит
- E.** Дискінезія жовчного міхура

**10.** Фельдшера викликали до чоловіка 47-ми років, який скаржиться на нападоподібний біль у лівій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Пацієнт постійно змінює положення тіла, але полегшення не відчуває. Найімовірніший попередній діагноз:

- A.** Лівобічна ниркова колька
- B.** Гострий пієлонефрит
- C.** Гострий гломерулонефрит
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Виразкова хвороба

**11.** До приймального відділення доставили хворого з імовірним гострим панкреатитом. Які з нижченаведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

- A.** Аналіз сечі на діастазу
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Аналіз крові на цукор
- D.** Аналіз сечі на цукор
- E.** Аналіз крові на білірубін

**12.** До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72-х років зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Протягом останніх тижнів помітив, що кал набув стрічкової форми. Яке захворювання можна припустити?

- A.** Рак прямої кишки
- B.** Тріщини відхідника
- C.** Парапроктит
- D.** Геморой
- E.** Нориці прямої кишки

**13.** В ході огляду пацієнта 47-ми років Ви встановили діагноз "проривна виразка шлунку". Вкажіть характерну симптоматику болю при цій патології:

- A.** Кинджальний біль
- B.** Оперізувальний біль
- C.** Переймоподібний біль
- D.** Тупий біль
- E.** Інтенсивний біль з іррадіацією в плече і лопатку

**14.** До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на тупий біль в правій здухвинній ділянці, підвищення температури тіла до  $37,2^{\circ}\text{C}$ , нудоту. Які першочергові дії фельдшера?

- A.** Негайно викликати чергового хірурга
- B.** Ввести знеболюючі
- C.** Ввести кровоспинні засоби
- D.** Холод на живіт
- E.** Промивання шлунку

**15.** З місця аварії доставлено хворого зі скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється під час рухів ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладно. Під час пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом "прилиплої п'яти". Визначте діагноз:

- A.** Перелом кісток таза
- B.** Перелом поперекового відділу хребта
- C.** Забій м'яких тканин
- D.** Перелом стегна
- E.** Вивих стегна

**16.** З метою профілактики СНІДу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства керується нормативним наказом за №:

- A.** 955
- B.** 38
- C.** 59
- D.** 720
- E.** 288

**17.** Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта, який скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що виникли після швидкого зниження температури тіла. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло?

- A.** Колапс
- B.** Непритомність
- C.** Шок
- D.** Кома
- E.** Марення

**18.** Для очисної клізми фельдшер ФАПУ найчастіше використовує воду, оптимальна температура якої:

- A.**  $28-32^{\circ}\text{C}$
- B.**  $10-12^{\circ}\text{C}$
- C.**  $20-22^{\circ}\text{C}$
- D.**  $16-18^{\circ}\text{C}$
- E.**  $24-26^{\circ}\text{C}$

**19.** До фельдшера ФАПУ звернувся хворий, який розповів, що 7 діб тому він наступив на цвях. До лікаря не звертався, рану обробив йодом. В даний час його турбують тягучі болі в рані, сіпання м'язів навколо рани. Що можна припустити у першу чергу?

- A.** Правець
- B.** Газова гангрена
- C.** Бешиха
- D.** Облітеруючий ендартеріт
- E.** Сказ

**20.** У хворої 30-ти років 4 години тому виник біль в епігастральній ділянці, було одноразове блювання. М'язи в правій здухвинній ділянці напружені, виражені симптоми подразнення очеревини. Ваш попередній діагноз:

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий аднексит
- D.** Правостороння ниркова колька
- E.** Печінкова колька

**21.** До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- A.** 5400
- B.** 5200
- C.** 4800
- D.** 5800
- E.** 6000

**22.** Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10-ти років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових ділянках тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A.** Менінгококова інфекція
- B.** Скарлатина
- C.** Кір
- D.** Вітряна віспа
- E.** Краснуха

**23.** Фельдшер ФАПУ оглядає дитину з метою оцінки нервово-психічного розвитку. Дитина стежить і повертає голову за руками яскравого предмету, у напрямку звуку, добре утримує голову у вертикальному положенні. Якому віку відповідають дані показники?

- A.** 3 місяці
- B.** 1 рік
- C.** 6 місяців
- D.** 1 місяць
- E.** 9 місяців

**24.** Мати дитини 6-ти місяців скаржиться фельдшеру ФАПУ, що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. В ході об'єктив-

ного обстеження: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4 см, краї його потовщені. На ребрах "чотки", виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

- A.** Рахіт
- B.** Екссудативно-катаральний діатез
- C.** Гіпотрофія
- D.** Диспепсія
- E.** Гіпокальцемічний синдром

**25.** Фельдшер прибув на виклик до дитини 2-х років, яка хворіє третій день, має хрипкий голос, "гавкаючий" кашель. Вночі з'явилася задишка, шкіра ціанотична, в акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

- A.** Стенозуючий ларинготрахеїт
- B.** Ларингоспазм
- C.** Напад бронхіальної астми
- D.** Стороннє тіло в дихальних шляхах
- E.** Ларингіт

**26.** Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: положення плода повздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання. Визначте місце найкращого вислуховування серцебиття плода:

- A.** Зліва нижче пупка
- B.** Ділянка пупка
- C.** Справа нижче пупка
- D.** Справа вище пупка
- E.** Зліва вище пупка

**27.** Фельдшера швидкої допомоги викликано до роділлі, яка скаржиться на сильні болючі перейми. При огляді неспокійна, контракційне кільце високо і косо розміщене, матка у формі піщаного годинника, зовнішні статеві органи набряклі. Яке ускладнення можна припустити?

- A.** Загроза розриву матки
- B.** Розрив матки
- C.** Розрив шийки матки
- D.** Надмірно сильна пологова діяльність
- E.** Розрив промежини

**28.** Фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства проводить бесіду з жінками. Для прикладу використав наступний випадок: у пацієнтки 32-х років при обстеженні виявлено непрохідність маткових труб. В анамнезі: 2 артіфіціальні аборти. Дітей немає. У шлюбі 3 роки, вагітностей не було, статеве життя регулярне, без контрацепції. Яке з виявлених в анамнезі захворювань може бути причиною безпліддя?

- A.** Хронічний аднексит
- B.** Ожиріння
- C.** Ерозія шийки матки
- D.** Бартолініт
- E.** Хронічний гепатит

**29.** До приймального відділення гінекологічного стаціонару бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 28-ми років зі скаргами на різкий біль внизу живота, короткочасну втрату свідомості вдома, незначні кров'яністі виділення із статевих шляхів. Затримка менструації - 7 днів. До якого додаткового методу потрібно підготувати жінку для уточнення діагнозу?

- A.** УЗД
- B.** Діагностичне вишкрібання
- C.** Мазок на ступінь чистоти
- D.** Мазок на цитологію
- E.** Кольпоскопія

**30.** До ФАП звернулася хвора зі скаргами на різкий переймоподібний біль внизу живота. При проведенні дворучного дослідження виявлена справа у малому тазі пухлина круглої форми з рівною поверхнею, рухлива, болюча при подразненні очеревини. Який попередній діагноз фельдшера?

- A.** Перекрут ніжки кісти
- B.** Апоплексія яєчника
- C.** Порушена позаматкова вагітність
- D.** Злоякісне переродження пухлини
- E.** Оофорит

**31.** До фельдшера ШМД звернулася жінка 20-ти років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короткочасна втрата свідомості. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., пульс - 91/хв., затримка менструації - 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який пріоритетний метод діагностики даної патології?

- A.** Пункція заднього склепіння
- B.** Діагностична лапароскопія
- C.** Гістеросальпінгографія
- D.** Кульдоскопія
- E.** Біопсія шийки матки

**32.** Бригада ШМД прибула до навчального закладу. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Припущено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

- A.** Застосувати прийом Геймліха
- B.** Ввести знеболювальні
- C.** Вставити товсту голку в трахею
- D.** Провести трахеостомію
- E.** Ввести спазмолітики

**33.** У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом, спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

- A.** Папаверин 2% внутрішньом'язово
- B.** Оцтові обгортання
- C.** Анальгін 50% внутрішньом'язово
- D.** Холод на проекцію великих судин
- E.** Парацетамол всередину

**34.** У дитини 1-го року, яка лікується з приводу рахіту на тлі задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. З введення якого препарату слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- A.** Сібазон
- B.** Глюконат кальцію
- C.** Сульфат магнію
- D.** Лазикс
- E.** Діазепам

**35.** Бригаду швидкої допомоги викликали до пацієнта 47-ми років, який скаржиться на інтенсивний стискальний біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Стан тяжкий, блідість шкірних покривів, акроціаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв., ЕКГ: ознаки гострого інфаркту міокарда. Який препарат слід використати фельдшеру для корекції АТ?

- A.** Допамін
- B.** Мезатон
- C.** Адреналін
- D.** Сульфокамфокаїн
- E.** Кофеїн

**36.** Ви - фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта 21-го року, який через декілька хвилин після введення гентаміцину відчув нестачу повітря, свербіння долонь, почервоніння обличчя, запаморочення в голові. АТ знизився до 75/50 мм рт.ст., ЧД- 24/хв., Рс- 105/хв. З якого препарату Ви розпочнете невідкладну допомогу?

- A.** Гідрокортизон
- B.** Кофеїн
- C.** Кордіамін
- D.** Папаверин
- E.** Гідрокарбонат натрію

**37.** Пацієнтку доставлено до фельдшера ФАПу зі скаргами на висипання на шкірі,

яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна припустити у пацієнтки?

- А. Гостра кропив'янка
- В. Рожевий лишай
- С. Алергічний дерматит
- Д. Синдром Лайєлла
- Е. Токсикодермія

38. Хвора 40-ка років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на різке почервоніння, закисання правого ока, що з'явилося сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемована, набрякла, рясні гнійні виділення. Поставте діагноз:

- А. Гострий кон'юнктивіт правого ока
- В. Гострий приступ глаукоми
- С. Хронічний дакриоцистит
- Д. Герпетичний деревовидний кератит
- Е. Міопія середнього ступеню

39. Пацієнтка 49-ти років звернулася зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів після статевих зносин. В анамнезі: вагітності - 4; пологів - 2; абортів - 2. Другі пологи ускладнилися розривами шийки матки. Останній раз була у гінеколога 6 років тому. Гінекологічний статус - вульва розвинена правильно. В дзеркала: стінки піхви чисті. Шийка у вигляді "цвітної капусти", кровить на дотик. В ході дворучного дослідження: тіло матки і придатки без особливостей, інфільтратів і пухлинних утворень у малому тазі немає. Оцініть ситуацію:

- А. Рак шийки матки
- В. Рак матки
- С. Рак піхви
- Д. Ендоцервіцит
- Е. Ендометрит

40. Пацієнтка, 45-ти років звернулася до ФАП. Скарги на кров'янисті виділення з піхви протягом 3-х тижнів, що виникли після 1,5-місячної затримки менструації. Турбують припливи жару. Менструації з 12-ти років, встановилися за 1 рік, по 4 дні, через 28 днів, помірні, безболісні. Протягом останніх 8-ми місяців спостерігалися затримки менструацій, після чого відновилися, але стали рясними й тривалими. В ході гінекологічного дослідження: змін не виявлено. Оцініть ситуацію:

- А. Клімактеричний синдром
- В. Анемічний синдром
- С. Геморагічний синдром
- Д. Аденогенітальний синдром
- Е. Гіпоталамічний синдром

41. У пологовий будинок бригадою швидкої допомоги доставлено непритомну жінку після трьох нападів судом при терміні вагітності 32 тижні. Стан тяжкий, АТ- 180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плоду глухе, 142/хв. Шийка матки відхилена дозад, щільна, канал шийки матки закритий, води не виливалися. Яка тактика ведення вагітної?

- А. Термінове розродження
- В. Розродження впродовж 24-х годин
- С. Розродження впродовж 48-ми годин
- Д. Вичікувальна тактика
- Е. Плороруйнівна операція

42. В ході профобстеження в ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- А. Диспансерний нагляд
- В. Оперативне лікування
- С. Санаторно-курортне лікування
- Д. Фізіотерапевтичні методи лікування
- Е. Медикаментозне лікування

43. Ви - фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства, до вас звернувся хворий з опіком. Вкажіть та сплануйте найефективніший елемент першої медичної допомоги на місці події при обмежених опіках 1-2-го ступеня:

- А. Охолодження протягом 8-10 хвилин під проточною водою
- В. Накладання сухої асептичної пов'язки
- С. Обробка опікової поверхні вазеліновою олією
- Д. Застосування масляно-бальзамічної емульсії за А.В. Вишневським
- Е. Накладання пов'язки з розчином антисептика

44. У хворого 67-ми років діагностовано початкову стадію старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?

- А. Медикаментозні
- В. Хірургічні
- С. Кріодеструкція
- Д. Лазеротерапія
- Е. На цій стадії хвороби лікування не проводиться

45. Дівчинка 10-ти років звернулася до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підбер'ї, поганого апетиту, ну-

доти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичного блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під реберної дуги на 2,5 см, щільна та болісна. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа в підребер'ї. Вкажіть найімовірніший діагноз:

- A.** Холецистохолангіт
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Хронічний гастрит
- D.** Виразкова хвороба
- E.** Глистна інвазія

**46.** Пацієнтка 24-х років, яка хворіє на хронічний гастрит типу "А", скаржиться на слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, ламкість нігтів і випадіння волосся, порушення смаку: їсть крейду. Шкіра бліда, суха. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Пульс - 102/хв., АТ- 90/65 мм рт.ст. Анамнез крові: ер.-  $2,7 \cdot 10^{12}/л$ , Нб- 80 г/л, КП- 0,7, ШОЕ- 18 мм/год, анізоцитоз, пойкилоцитоз. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

- A.** Залізодефіцитна анемія
- B.** Загострення хронічного гастриту
- C.** В<sub>12</sub>-фолієводефіцитна анемія
- D.** Гемолітична анемія
- E.** Гіпопластична анемія

**47.** Чоловік 25-ти років протягом 2-3-х років скаржиться на посилення головного болю, мерзлякуватість, апатію, збільшення ваги, закрепи. Хворий адинамічний, шкіра бліда, суха, холодна, волосся поріділо. Щитоподібна залоза не збільшена. Тони серця глухі, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 55/хв., температура тіла - 35,8°C. Визначте попередній діагноз:

- A.** Гіпотиреоз
- B.** Акромегалія
- C.** Гіпертиреоз
- D.** Первинний альдостеронізм
- E.** Хвороба Іценка-Кушинга

**48.** Хворий 35-ти років скаржиться на слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання вночі, свербіння шкіри, погіршення зору. Захворювання нирок спостерігається протягом 20-ти років. Шкіра сіро-бліда, язик сухий, обкладений бурим нальотом, відчувається запах аміаку з рота. Тони серця глухі, акцент II тону на аорті, пульс - 92/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст. Яке дослідження сечі необхідно призначити для визначення концентраційної функції нирок?

- A.** Проба Зимницького
- B.** Проба Аддіса-Каковського
- C.** Проба Амбурже
- D.** Проба Нечипоренка
- E.** Загальний аналіз сечі

**49.** Чоловік випадково випив 100 мл метилового спирту. Через 2 години відчув нудоту, головний біль, мерехтіння в очах, наростання спраги. Було блювання. Слизові оболонки гіперемовані, з ціанотичним відтінком, зіниці розширені. Який антидот Ви застосуєте?

- A.** Етиловий спирт
- B.** Вікасол
- C.** Магнію оксид
- D.** Атропіну сульфат
- E.** Унітіол

**50.** Пацієнт 20-ти років годину тому відчув "кинджальний" біль в животі, було одноразове блювання. Під час обстеження: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Що з пацієнтом?

- A.** Перфорація виразки
- B.** Гострий живіт (перитоніт)
- C.** Шлунково-кишкова кровотеча
- D.** Гострий гастрит
- E.** Загострення виразкової хвороби

**51.** Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, піністі, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Трихомоніаз
- B.** Хламідіоз
- C.** Гонорея
- D.** Сифіліс
- E.** Кандидоз

**52.** Фельдшер ФАПу проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Вкажіть, де він повинен прикласти стетоскоп при першій позиції, щоб найкраще вислухати серцебиття плоду:

- A.** Зліва на рівні пупка
- B.** Справа на рівні пупка
- C.** Справа нижче пупка
- D.** Зліва нижче пупка
- E.** Справа вище пупка

**53.** Дівчинка 12-ти років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у ділянці промежини, кровотечу зі статевих шляхів. З анамнезу: 12 годин тому забилася, впавши з велосипеда. Об'єктив-



но: у ділянці правої малої соромітної губи наявна рана, що слабко кровоточить, пальпаторно - до 3 мм завглибшки, 2 см завдовжки. Встановіть діагноз:

- A.** Травма зовнішніх статевих органів
- B.** Дисфункційна маткова кровотеча
- C.** Позаматкова вагітність
- D.** Метроендометрит
- E.** Передчасне статеве дозрівання

**54.** Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углиб слід натискати на грудину?

- A.** 1-1,5
- B.** 0,5-0,8
- C.** 2-3
- D.** 3-4
- E.** 4-5

**55.** До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на різке здуття живота, нестійкі випорожнення, нудоту, яка з'являється після вживання жирної та солодкої їжі. Хворіє близько року. Багато палить, зловживає спиртними напоями. Об'єктивно: шкіра жовтянично забарвлена, наявність телеангіектазій, гіперемія долонь, асцит. Пальпаторно: печінка збільшена, щільна, край загострений. Про яку найбільш імовірну патологію йде мова?

- A.** Цироз печінки
- B.** Хронічний холецистит
- C.** Виразкова хвороба шлунку
- D.** Хронічний гастрит
- E.** Рак шлунку

**56.** Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином пероксиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

- A.** Стерильний ізотонічний розчин
- B.** Дистильована вода
- C.** Розчин фурациліну 1:5000
- D.** 2% розчин натрію гідрокарбонату
- E.** 0,5% розчин нашатирного спирту

**57.** У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- A.** Міокардит
- B.** Вогнищева пневмонія
- C.** Гломерулонефрит
- D.** Сироваткова хвороба
- E.** Набута вада серця

**58.** Який максимальний об'єм лікувального засобу можна ввести підшкірно пацієнтові одноразово?

- A.** 5 мл
- B.** 1 мл
- C.** 2 мл
- D.** 10 мл
- E.** 15 мл

**59.** Фельдшер ФАПУ оглядає пацієнта, який скаржиться на біль в животі, нудоту. В ході обстеження: загальний стан тяжкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно здутий, м'язи напружені, пальпація болісна. Визначається позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A.** Гострий перитоніт
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий апендицит
- D.** Неспецифічний виразковий коліт
- E.** Хвороба Крона

**60.** Хворий 38-ми років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині грудини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** ІХС. Стенокардія, що вперше виникла
- B.** ІХС. Гострий інфаркт міокарда
- C.** ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК
- D.** ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІV ФК
- E.** Нейроциркуляторна дистонія

**61.** Мати звернулася до фельдшера з дитиною 4-х років зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, періодичні болі в животі навколо пупка. Вранці спостерігаються нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі був висип. Визначте попередній діагноз:

- A.** Аскаридоз
- B.** Ентеробіоз
- C.** Дуоденіт
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Гострий гастроентерит

**62.** Фельдшер пункту охорони здоров'я щоденно проводить дезінфекцію приміщення пункту охорони здоров'я та використаного інструментарію. Як називається такий вид дезінфекції?

- A.** Профілактична
- B.** Вогнищева поточна
- C.** Вогнищева заключна
- D.** Камерна
- E.** Санітарна

**63.** Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на остуду, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мармурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

- A.** 1% дибазолу
- B.** 2,5% аміназину
- C.** 1% димедролу
- D.** 2,4% еуфіліну
- E.** 20% глюкози

**64.** Дитина народилася недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну  $D_3$ :

- A.** З 10-14-го дня по 500-1000 МО
- B.** З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- C.** З 10-го дня по 2000 МО
- D.** На 2-му тижні по 4000 МО
- E.** На 2-му місяці життя по 500 МО

**65.** Оглядаючи вагітну 30-ти тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- A.** Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг
- B.** Внутрішньовенно гініпрал
- C.** Сублінгвально ніфедипін
- D.** Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- E.** Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

**66.** В ході огляду шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПу звернув увагу на ціанотичність шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?

- A.** Імовірна ознака вагітності
- B.** Сумнівна ознака вагітності
- C.** Достовірна ознака вагітності
- D.** Ознака порушення менструального циклу
- E.** Ознака запального захворювання

**67.** Під час патронажу новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природніх складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

- A.** Везикулопустульоз
- B.** Псевдофурункульоз
- C.** Пухирчатка новонароджених
- D.** Ексфоліативний дерматит Ріттера
- E.** Попрілості

**68.** Пацієнт 25-ти років з діагнозом "грип" перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- A.** Вогнищева поточна
- B.** Вогнищева заключна
- C.** Профілактична
- D.** Механічна
- E.** Комбінована

**69.** Фельдшера швидкої невідкладної допомоги викликано до вагітної у якої проходять пологи вдома. Потуги через 2-3 хвилини, по 45-50 сек. В ході обстеження прийомом Піскачека голівка легко досягається на відстані 2-2,5 см від статевої щілини. Яку тактику має обрати фельдшер для подальшого ведення родів?

- A.** Закінчити роди вдома з подальшою госпіталізацією
- B.** негайно госпіталізувати до пологового відділення у власному супроводі
- C.** Доставити до ФАП
- D.** Ввести промедол, анальгін, димедрол для зупинки родів
- E.** Викликати акушерку

**70.** Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків?

- A.** У 2-3 роки
- B.** В 1 рік
- C.** В 4 роки
- D.** В 5-6 років
- E.** В 6-7 років

**71.** Фельдшер прийшов на патронаж до 3-місячної дитини. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отримано результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- A.** 1000 г
- B.** 900 г
- C.** 800 г
- D.** 700 г
- E.** 600 г

**72.** До фельдшеру ФАПу звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо

пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Злоякісне новоутворення молочної залози
- B.** Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- C.** Первинний сифіліс
- D.** Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- E.** Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

**73.** Хвора жінка скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. При обстеженні звернено увагу на рівень АТ- 210/110 мм рт.ст. Який препарат треба ввести у даному випадку?

- A.** Клофелін 0,01% - 1,0 мл
- B.** Платифілін 0,2% - 1,0 внутрішньом'язево
- C.** Анальгін 50% - 2,0 внутрішньом'язево
- D.** Димедрол 1% - 1,0 внутрішньом'язево
- E.** Атропін 0,1% - 0,5 підшкірно

**74.** Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блумберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Апоплексія яєчника
- B.** Перекрут ніжки кісти яєчника
- C.** Позаматкова вагітність
- D.** Гострий апендицит
- E.** Фіброміома

**75.** У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарж хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- A.** Хронічний лімфолейкоз
- B.** Хронічний мієлолейкоз
- C.** Гострий лейкоз
- D.** Гіпопластична анемія
- E.** Лімфогранулематоз

**76.** До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- A.** До дільничного гінеколога
- B.** На УЗД
- C.** До ВПВ
- D.** До гінекологічного відділення
- E.** До терапевта

**77.** До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання; сеча каламутна, температура тіла 37,6°C. Вважає себе хворим протягом 2-х років. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- A.** Хронічний пієлонефрит
- B.** Хронічний гломерулонефрит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Гострий гломерулонефрит
- E.** Нирковокам'яна хвороба

**78.** На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- A.** Лімфаденіт
- B.** Флегмона
- C.** Бешиха
- D.** Лімфангоїт
- E.** Правець

**79.** Фельдшер ШМД оглянув пацієнта 30-ти років, який упав з висоти 2-х метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується під час навантаження за віссю хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- A.** На спині
- B.** На лівому боці
- C.** На правому боці
- D.** Напівсидячи
- E.** У положенні "жаби"

**80.** Під час дослідження мазку піхвового вмісту на визначення ступеню його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

- A.** III
- B.** I
- C.** II
- D.** IV
- E.** -

**81.** До фельдшера ФАПу звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, біль та домі-

шки крові під час акту дефекації. В ході огляду виявлено варикозні вузли в ділянці анального отвору. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Геморой
- B.** Тріщина заднього проходу
- C.** Гострий парапроктит
- D.** Рак прямої кишки
- E.** Поліпи прямої кишки

**82.** Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

- A.** Нирки
- B.** Печінка
- C.** Серце
- D.** Легені
- E.** Головний мозок

**83.** Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикулопустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

- A.** Екзема
- B.** Кропив'янка
- C.** Атопічний дерматит
- D.** Токсикодермія
- E.** Нейродерміт

**84.** Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті й епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

- A.** Промити шлунок холодною водою через зонд
- B.** Викликати блювання
- C.** Промити шлунок теплою водою
- D.** Промити шлунок розчином соди через зонд
- E.** Промити шлунок розчином перманганату калію

**85.** Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом "виразкова хвороба шлунку". Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом

до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- A.** Гіповолемічний шок
- B.** Кардіогенний шок
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Перфорація виразки шлунку
- E.** Гостре отруєння

**86.** До ФАПУ доставлено хворого зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. Встановлено діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот найдоцільніше застосувати?

- A.** Розчин атропіну сульфату 0,1%
- B.** Розчин унітіолу 5%
- C.** Розчин тіосульфату 20%
- D.** Антидот Стрижевського
- E.** Розчин натрію гідрокарбонату 3%

**87.** Вас викликали до пацієнта, який вдарився головою, був непритомний 5 хвилин, скаржиться на сильний головний біль, неодноразове блювання. На МРТ: патології не виявлено. Поставте попередній діагноз:

- A.** Струс головного мозку
- B.** Забій головного мозку
- C.** Здавлення головного мозку
- D.** Менінгіт
- E.** Енцефаліт

**88.** У хворого на середньоважку форму черевного тифу на 18-й день хвороби різко знизилася температура тіла, артеріальний тиск впав до 60/30 мм рт.ст., прискорився пульс до 120/хв., з'явилися різка слабкість, запаморочення. Який ще симптом буде свідчити про серйозне ускладнення?

- A.** Мелена
- B.** Закреп
- C.** Галюцинації
- D.** Апатія
- E.** Адинамія

**89.** У хворого на ГРВІ на 4-ту добу стан погіршився, температура підвищилася до 38°C, з'явилася задишка, досі сухий кашель став вологим, з серозно-гнійним харкотинням. В легенях - притуплення перкуторного звуку. Яке ускладнення можна припустити?

- A.** Бактеріальна пневмонія
- B.** Гострий бронхіт
- C.** Вірусна пневмонія
- D.** Ексудативний плеврит
- E.** Сухий плеврит

**90.** В ході профілактичного огляду хворого на шкірі виявлено папули і бляшки вкриті сріблястими лусочками. Феномени "стеаринова пляма", "точкова кровотеча" різко позитивні. Яке захворювання у пацієнта?

- A.** Псоріаз
- B.** Червоний плескатий лишай
- C.** Нейродерміт
- D.** Червоний вовчак
- E.** Сифіліс

**91.** До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на появу виразки на статевих органах. Об'єктивно: виразка розміром 0,5 см у діаметрі, з чіткими краєроподібними краями, вкрита нальотом у вигляді "старого сала"; не турбує хворого. Що можна припустити?

- A.** Сифіліс
- B.** Гонорея
- C.** Трихомоніаз
- D.** Хламідіоз
- E.** СНІД

**92.** Фельдшера ФАПу викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворій спостерігалася слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- A.** Транзиторна ішемічна атака
- B.** Ішемічний інсульт
- C.** Геморагічний інсульт
- D.** Субарахноїдальний інсульт
- E.** Тромбоемболія судин мозку

**93.** У новонародженої дитини спостерігається пухлина в ділянці кісток черепа. Пухлина не виходить за межі шва. Різко відмежована від нормальної кістки ущільненим і трохи піднятим над її рівнем валиком. Яку пологову травму можна припустити?

- A.** Кефалогематома
- B.** Пологова пухлина
- C.** Внутрішньочерепна пологова травма
- D.** Гіпоксично-травматична енцефалопатія
- E.** Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія

**94.** Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворій 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який

лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

- A.** Лідокаїн
- B.** Верапаміл
- C.** Еуфілін
- D.** Атропін
- E.** Анальгін

**95.** Під час внутрішньом'язевого введення ампіциліну у дитини 10-ти років з'явилися відчуття жару, нудота, блідість шкіри. Артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A.** Анафілактичний шок
- B.** набряк Квінке
- C.** Кропив'янка
- D.** Гостра судинна недостатність
- E.** Гостра серцева недостатність

**96.** Визначте, який термін гестації вагітної є періодом ризику для розвитку природженої вади серця і судин у разі дії несприятливих чинників навколишнього середовища:

- A.** 2-8 тижнів вагітності
- B.** 10-12 тижнів вагітності
- C.** 38-40 тижнів вагітності
- D.** 35-37 тижнів вагітності
- E.** 20-24 тижні вагітності

**97.** В жіночій консультації пацієнтці рекомендували обстеження. Який метод дослідження функціональної активності яєчників пацієнтка може застосувати вдома?

- A.** Вимірювання базальної температури
- B.** Кольпоцитологію
- C.** Симптом "зіниці"
- D.** Симптом "папороті"
- E.** Визначити рівень гормонів в крові

**98.** Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на роззгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потилічні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

- A.** Краснуха
- B.** Кір
- C.** Скарлатина
- D.** Менінгококцемія
- E.** Вітряна віспа

**99.** Фельдшер прибув на виклик до дитини 7-ми років зі скаргами на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 39°C, висип. В ході огляду: "па-

лаючий зів”, дрібнокрапковий висип по всьому тілі, інтенсивно виражений в природних складках та на згинальній поверхні кінцівок, блідість носогубного трикутника на тлі гіперемованої шкіри. Поставте діагноз:

- A.** Скарлатина
- B.** Кір
- C.** Краснуха
- D.** Вітряна віспа
- E.** Менінгококцемія

**100.** У дитини 13-ти років, що перебуває на амбулаторному лікуванні з діагнозом “епідемічний паротит”, на 8-й день захворювання виникли різкий біль в ділянці мошонки, гіперемія, набряк, піднялася температура до  $39^{\circ}\text{C}$ , яєчка збільшилися у розмірах. Встановіть діагноз:

- A.** Орхіт
- B.** Цистит
- C.** Перитоніт
- D.** Бешиха
- E.** Пієлонефрит

**101.** До фельдшера ФАП звернулася вагітна в терміні 36 тижнів, у якої з’явилися набряки на нижніх кінцівках. Об’єктивно: АТ- 160/100 мм рт.ст., виражені набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці, в сечі білок. Чим ускладнився перебіг даної вагітності?

- A.** Прееклампсією середнього ступеню
- B.** Набряками вагітних
- C.** Артеріальною гіпертензією вагітних
- D.** Прееклампсією легкого ступеню
- E.** Протеїнурією вагітних

**102.** Жінка 27-ми років звернулася до фельдшера ФАПу за консультацією. Скарг немає. Протягом останніх 3-х років приймала протизаплідні гормональні контрацептиви. На даний час припинила їх прийом і намагається завагітніти. Менструальний цикл 34 дні, регулярний. Який день її циклу є найсприятливішим для виникнення вагітності?

- A.** 20-й день
- B.** 14-й день
- C.** 12-й день
- D.** 13-й день
- E.** 24-й день

**103.** У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфний висип у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

- A.** Ацикловір
- B.** Брильянтовий зелений
- C.** Цефтріаксон
- D.** Фулорцин
- E.** Феністил

**104.** До фельдшера ФАПу доставлено жінку 36-ти років зі скаргами на блювання, нудоту, печію. Дані симптоми з’явилися після випадкового вживання оцтової кислоти. Назвіть, яку до лікарську допомогу повинен надати фельдшер:

- A.** Промити шлунок розчином гідрокарбонату натрію
- B.** Промити шлунок розчином перманганату калію
- C.** Забезпечити доступ свіжого повітря
- D.** Поставити очисну клізму
- E.** Дати вживати надмірну кількість рідини

**105.** До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

- A.** Дренажне
- B.** Активне
- C.** Пасивне
- D.** Вимушене
- E.** Фаулера

**106.** У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

- A.** Експіраторна задишка
- B.** Стридорозне дихання
- C.** Дихання Біота
- D.** Інспіраторна задишка
- E.** Дихання Куссмауля

**107.** Після виконання маніпуляції інструменти потрібно занурити у дезінфікуючий розчин, потім промити під проточною водою. Назвіть наступний етап у проведенні передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення?

- A.** Занурення у мийний засіб
- B.** Висушування та стерилізація в автоклаві
- C.** Промивання у дистильованій воді
- D.** Контроль якості передстерилізаційного очищення
- E.** Стерилізація

**108.** Хлопець 20-ти років під час бійки зазнав удару в обличчя. Скаржиться на виділення крові з порожнини носа у кількості до 50 мл. Загальний стан задовільний, АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку допомогу слід надати постраждалому?

- А.** Передня тампонада 3% перекисом водню, холод на ніс
- В.** Ввести амінокапронову кислоту внутрішньом'язево
- С.** Ввести вікасол 1 мл внутрішньом'язево
- Д.** Перев'язка привідних артеріальних судин
- Е.** Припікання трихлороцтовою кислотою

**109.** У дитини 4-х років з'явилися лихоманка до  $39^{\circ}\text{C}$ , пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка пальпується у вигляді тонкого тяжа. Яке захворювання можна припустити?

- А.** Дизентерія
- В.** Сальмонельоз
- С.** Ешерихіоз
- Д.** Токсична диспепсія
- Е.** Холера

**110.** В ході дослідження пульсу пацієнта з високою температурою тіла виявлено частоту серцевих скорочень 98/хв. Родичам пацієнта фельдшер повинен пояснити, що підвищення температури тіла на  $1^{\circ}\text{C}$  прискорює пульс на:

- А.** 8-10 ударів на хвилину
- В.** 5-6 ударів на хвилину
- С.** 1-2 удари на хвилину
- Д.** 3-4 удари на хвилину
- Е.** Понад 20 ударів на хвилину

**111.** Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби ці результати заносять до:

- А.** Протоколу переливання крові
- В.** Листа інтенсивного нагляду
- С.** Температурного листка
- Д.** Листка лікарняних призначень
- Е.** Амбулаторної картки

**112.** До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

- А.** Природжений вивих стегна
- В.** Травматичний вивих стегна
- С.** Застарілий вивих стегна
- Д.** Звичний вивих стегна
- Е.** Патологічний вивих стегна

**113.** Машина швидкої допомоги прибула на виклик до дитини 10-ти років, яка скаржиться на сильний біль у лівій гоміл-

ці. Захворіла гостро, 6 годин тому. Травми не було. Тиждень тому була ангіна. Під час огляду: стан дитини важкий,  $t^{\circ}$ - $38,9^{\circ}\text{C}$ , ЧДР- 30/хв., АТ- 105/80 мм рт.ст., пульс - 120/хв., ритмічний. Ліва кінцівка зігнута у колінному суглобі, рухати нею дитина відмовляється. Шкіра без змін, біль при пальпації, при навантаженні на в'єс. Ваш діагноз:

- А.** Гострий гематогенний остеомієліт
- В.** Гострий бурсит колінного суглоба
- С.** Забій м'яких тканин гомілки
- Д.** Контрактура колінного суглоба
- Е.** Гострий артрит колінного суглоба

**114.** До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- А.** Баралгін
- В.** Вікасол
- С.** Дицинон
- Д.** Алохол
- Е.** Нітрогліцерин

**115.** До фельдшера пункту охорони здоров'я металургійного підприємства звернувся працівник зі скаргами на головний біль, запаморочення, стомлюваність, солодкий присмак у роті, переймоподібні болі у животі, не пов'язані з вживанням їжі, закрепи. В ході об'єктивного обстеження: шкіра землисто-бліда, бузково-сіра смужка навколо ясен та зубів, нижній край печінки +4 см з-під краю реберної дуги, АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 98/хв. Отруєння якою токсичною речовиною ви припустите у пацієнта?

- А.** Свинцем
- В.** Фосфором
- С.** Хлором
- Д.** Алкоголем
- Е.** Миш'яком

**116.** Фельдшер ФАПу оглядає пацієнта, у якого після прийому ципрофлоксацину з'явилися висип та свербіння шкіри. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба та кінцівок рожевий уртикарний висип, Рс- 78/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Найімовірніший діагноз:

- А.** Кропив'янка
- В.** набряк Квінке
- С.** Анафілактичний шок
- Д.** Системна склеродермія
- Е.** Поліноз

**117.** Ви - фельдшер ФАП. До Вас звернувся хворий зі скаргами на наявність утворення, яке з'являється в правій пахвинній ділянці при фізичному навантаженні. Об'єктивно: утворення округлої форми діаметром біля 4-х см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції. Утворення розташоване з внутрішнього боку від сім'яного канатика. Який попередній діагноз?

- A.** Правостороння пахвинна грижа
- B.** Правостороння стегнова грижа
- C.** Ліпома правої пахвинної ділянки
- D.** Варикозне розширення вен правого стегна
- E.** Перелом діафіза бедра

**118.** У новонародженої дитини, що народилася від патологічних пологів, в ході яких було застосовано накладання щипців, спостерігається згладження складки носогубного трикутника, опущення кута рота і звуження повікової щілини зліва. Загальний стан і акт ссання не порушені. На що вказують дані симптоми?

- A.** Парез лицьового нерва
- B.** Кефалогематома
- C.** Неврит трійчастого нерва
- D.** Черепно-мозкова пологова травма
- E.** Пологова пухлина

**119.** До пологового будинку надійшла родилля з переймами по 20 секунд через 5-6 хв. Води не відходили, термін вагітності 38 тижнів. Серцебиття плоду - 130/хв. Через 2 години спостереження перейми стали коротші, по 10-15 секунд, паузи між ними по 8-10 хв. Серцебиття плоду - 180/хв. Яка аномалія пологової діяльності виникла в даному випадку і що необхідно зробити?

- A.** Вторинна слабкість пологової діяльності, дистрес плоду. Кесарів розтин
- B.** Первинна слабкість пологової діяльності. Стимуляція пологів
- C.** Дискоординована пологова діяльність. Введення спазмолітиків
- D.** Надмірна пологова діяльність. Кесарів розтин
- E.** II період пологів. Акушерські щипці

**120.** До Вас на ФАП звернулися родичі тяжкохворого з проханням оглянути його з приводу здуття живота. В ході огляду Ви з'ясували, що в пацієнта метеоризм. На яку відстань фельдшер введе газовідвідну трубку до прямої кишки?

- A.** На 20-30 см
- B.** На 20-25 см
- C.** На 35-40 см
- D.** На 40-45 см
- E.** На 45-50 см

**121.** До ФАП звернувся пацієнт із загостренням хронічного холецистити. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю?

- A.** Грілку
- B.** Міхур з льодом
- C.** Холодний компрес
- D.** Холодну примочку
- E.** Зігрівальний компрес

**122.** До ФАП звернувся хворий 68-ми років зі скаргами на різкий біль у правій стопі, набряк пальців та потемнішання шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє протягом 15-ти років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло у хворого?

- A.** Гангрена IV пальця правої стопи
- B.** Панарицій
- C.** Гематома
- D.** Перелом IV пальця правої стопи
- E.** Бешиха

**123.** На початку II періоду пологів родилля зблідла, пульс - 105/хв., слабкого наповнення, АТ- 85/50 мм рт.ст. Під час огляду: матка в гіпертонусі, різко болюча в ділянці дна матки справа, асиметрична, серцебиття плоду глухе, аритмічне. Води підтікають, забарвленні кров'ю. Про яку патологію йде мова?

- A.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- B.** Центральне передлежання плаценти
- C.** Крайове передлежання плаценти
- D.** Загроза розриву матки
- E.** Емболія навколоплідними водами

**124.** Фельдшер ФАП спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

- A.** Сидеропенічний
- B.** Анемічний
- C.** Геморагічний
- D.** Астеновегетативний
- E.** Диспептичний

**125.** У пологовій залі перебуває породилля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість



шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 96/хв., із статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- А. Гіпотонія матки
- В. Гіпоплазія матки
- С. Атонія матки
- Д. Розрив пологових шляхів
- Е. Геморагічний шок

**126.** Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте 4-денну дитину після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовто-червоні кристалики. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

- А. Сечокислий інфаркт
- В. Токсична еритема
- С. Статевий криз
- Д. Транзиторна гіпертермія
- Е. Транзиторний дизбактеріоз

**127.** Ви працюєте фельдшером ШМД. Виклик до дитини 6-ти років. Під час прийому їжі дитина раптово закашлялася, посиніла, виникло стридорозне дихання. Після відновлення прохідності дихальних шляхів Ви негайно розпочали штучну вентиляцію легень. Якою повинна бути частота вдунань?

- А. 20 за 1 хвилину
- В. 40 за 1 хвилину
- С. 10 за 1 хвилину
- Д. 18 за 1 хвилину
- Е. 30 за 1 хвилину

**128.** Хворий 36-ти років скаржиться на напади задухи з переважно утрудненим видихом, що відбуваються до 2-3 разів на день та знімаються інгаляціями  $\beta_2$ -адреноміметиків. Хворіє протягом 10-ти років. Грудна клітка розширена, над легенями коробковий перкуторний тон. Під час аускультатції: жорстке дихання з подовженим видихом. В аналізі харкотиння багато еозинофілів, кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Який попередній діагноз?

- А. Бронхіальна астма
- В. Хронічний обструктивний бронхіт
- С. Спонтанний пневмоторакс
- Д. Серцева астма
- Е. Пневмонія

**129.** До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Під час огляду: поверхневі вени розши-

рені, видно зони гіперпигментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

- А. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки
- В. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- С. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- Д. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- Е. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

**130.** У жінки 25-ти років скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Клінічна картина характерна для:

- А. Апоплексії яєчника
- В. Позаматкової вагітності
- С. Хронічного аднекситу
- Д. Апендициту
- Е. Раку яєчника

**131.** Жінка 45-ти років скаржиться на сезонний біль в епігастральній ділянці, який виникає натще, відрижку кислим, періодичне блювання на висоті болю, печію. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу захворювання?

- А. Фіброгастроскопія
- В. Рентгенографія шлунку
- С. УЗД
- Д. Дослідження калу
- Е. Загальний аналіз крові

**132.** До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

- А. 8-10 годин
- В. 40-60 хвилин
- С. 1-2 години
- Д. 2-4 години
- Е. 4-6 годин

**133.** Фельдшера ФАПу викликали до пацієнтки 40-ка років, яку під час роботи на полі вкусила бджола. Хвора знепритомніла, різка блідість шкірних покривів, набряк губ і повік, тони серця глухі, пульс ниткоподібний, АТ- 50/20 мм рт.ст., дихання поверхневе. З чого почне невідкладну допомогу фельдшер ФАПу?

- A.** Ввести адреналін
- B.** Ввести папаверин
- C.** Ввести промедол
- D.** Ввести баралгін
- E.** Ввести коргликон

**134.** До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка, яка хворіє на гіпертиреоз. Після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла, тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A.** Тиреотоксичний криз
- B.** Гіпертонічний криз
- C.** Напад стенокардії
- D.** Порушення мозкового кровообігу
- E.** Напад бронхіальної астми

**135.** Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A.** Перитоніт
- B.** Механічна кишкова непрохідність
- C.** Інфаркт міокарда
- D.** Перелом основи черепа
- E.** Тромбоз мезентеріальних судин

**136.** До гінекологічне відділення надійшла хвора 24-х років зі скаргами на болі внизу живота, кров'яністі виділення,  $t^{\circ}$ - 38, 2 $^{\circ}$ С. 4 дні тому було проведено штучне переривання вагітності при терміні в 7-8 тижнів. В ході бімануального обстеження матка збільшена та болюча. Поставте діагноз:

- A.** Ендометрит
- B.** Аднексит
- C.** Параметрит
- D.** Пельвіоперитоніт
- E.** Кольпіт

**137.** Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R – R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

- A.** Миготлива аритмія
- B.** Синусова тахікардія
- C.** Екстрасистолічна аритмія
- D.** Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- E.** Синусова аритмія

**138.** До фельдшера звернувся хворий 20-ти років зі скаргами на пігментацію шкіри, яка виникла недавно (золотисто-коричневого кольору), потемнішання волосся, відсутність апетиту, нудоту, діарею, біль у животі, схуднення. Дихання везикулярне, АТ- 100/70 мм рт.ст., Ps- 60/хв. Аускультативно: тони серця послаблені. Живіт при пальпації болісний в епігастрії. Ніктурія. Зниження функції статевих залоз. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- A.** Хвороба Аддісона
- B.** Хвороба Іценко-Кушинга
- C.** Подагра
- D.** Панкреатит
- E.** Ожиріння

**139.** Пацієнт 36-ти років після внутрішньовенного введення ліків скаржиться на біль, гіперемію і наявність ущільнення за ходом вени. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

- A.** Флебіт
- B.** Гематома
- C.** Некроз
- D.** Повітряна емболія
- E.** Сепсис

**140.** Ви - фельдшер ШМД. У дитини 2-х років гостра кишкова інфекція, яка супроводжується токсико-ексикозом II ступеню. Яку кількість рідини з розрахунку на кг маси тіла треба призначити дитині для проведення I етапу регідраційної терапії?

- A.** 60-100 мл
- B.** 30-50 мл
- C.** 110-130 мл
- D.** 140-160 мл
- E.** 170-200 мл

**141.** Ви - фельдшер ФАПу. У дитини 10-ти років після перенесених двох нападів ревматизму, сформувалася вада серця. Протягом якого терміну необхідно проводити вторинну профілактику біциліном-5?

- A.** Пожиттєво
- B.** 1 рік
- C.** 3 роки
- D.** 5 років
- E.** 10 років

**142.** До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною віком 5-ти років з таки-

ми скаргами: останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

- A.** Пробіотики
- B.** Вітаміни
- C.** Сорбенти
- D.** Антибіотики
- E.** Антигістаміни

**143.** Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації:

- A.** Пов'язка Дезо
- B.** Зворотна пов'язка
- C.** Колосоподібна пов'язка
- D.** Спіралевидна пов'язка
- E.** Восьмиподібна пов'язка

**144.** Фельдшер ФАПУ оглядає потерпілого 25-ти років який 30 хвилин тому отримав ножове поранення грудної клітки справа. При огляді стан середньої важкості, з рани виділяється піниста кров. Фельдшер припускає пневмоторакс. Який вид пов'язки він має застосувати?

- A.** Оклюзійну
- B.** Циркулярну
- C.** Гемостатичну
- D.** Колосовидну
- E.** Спіралевидну

**145.** До фельдшера пункту охорони здоров'я звернувся пацієнт зі скаргами на розпиральний біль голови, шум у вухах, стискальний біль у ділянці серця, АТ-180/110 мм рт.ст. Які медикаменти доцільно буде обрати фельдшеру для надання невідкладної допомоги?

- A.** Дибазол, клофелін, лазикс
- B.** Кокарбоксілаза, анальгін, еуфілін
- C.** Кальцію глюконат, АТФ, калію оротат
- D.** Но-шпа, анальгін, папаверин
- E.** Преднізолон, нітрогліцерин, димедрол

**146.** Фельдшер здоров'я пункту повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- A.** Постійний
- B.** Змінний
- C.** Імпульсний
- D.** Модульований
- E.** Високочастотний

**147.** Хворий 43-х років скаржиться на головний біль, що виникає періодично протягом 2-х місяців, головним чином під ранок, і супроводжується блюванням. Напади головного болю виникають також під час фізичного навантаження, залежать від положення голови. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Пухлина головного мозку
- B.** Гострий менінгіт
- C.** Невралгія трійчастого нерва
- D.** Ішемічний інсульт
- E.** Гіпертонічна хвороба

**148.** До фельдшера звернувся хворий, який скаржиться на печіння, свербіння, відчуття жару, болочість в місці дії подразника - невідомої хімічної речовини. Об'єктивно: спостерігається наявність еритеми, яка з'явилася через 20 хвилин після дії подразника. Яку хворобу можна припустити?

- A.** Простий контактний дерматит
- B.** Алергічний контактний дерматит
- C.** Стрептостафілодермія
- D.** Екзема
- E.** Токсикодермія

**149.** Фельдшеру пункту охорони здоров'я необхідно провести оцінювання фізичного розвитку учнів. Фельдшер визначив індекс Кетле. Як його підрахувати?

- A.** Ділення маси тіла в грамах на зріст у сантиметрах
- B.** Множення маси тіла на зріст у сантиметрах
- C.** Ділення зросту на масу тіла
- D.** Множення зросту на масу тіла
- E.** Сума показників зросту та маси тіла

**150.** До ФАП звернувся пацієнт, провідник потягу, на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, підвищення температури тіла. Обличчя гіперемоване, набрякле, на перехідній складці кон'юнктиви петехії. Під ключицями, на бічних поверхнях грудної клітки рясний розеолезно-петехіальний висип. Спостерігається симптом Говорова-Гюделье. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Висипний тиф
- B.** Лептоспіроз
- C.** Грип
- D.** Сказ
- E.** Черевний тиф

## **НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ**

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК М. ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА.**

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.  
(Українською мовою).

Підписано до друку 11.04./№89. Формат 60x84 1/8  
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Суг. Друк офсет.  
Ум.друк.арк.16. Облік.вид.арк. 20.  
Тираж.(4602 прим. – укр. мова).

<b>Б</b>					
багатоплідний	многоплодный	клекочучий	клокочущий	привушний	околоушный
бешиха	рожа	ковтання	глотание	променевиий	лучевой
блювання	рвота	комірцевий	воротниковый	променезопа'ястковий	лучезапястный
блювотний	рвотный	крейда	мел	пухирець	пузырёк
<b>В</b>		крижі	крестец	пухлина	опухоль
вагітність	беременность	кровотеча	кровотечение	<b>Р</b>	
вада	беременность	кроповий	укропный	раптово	внезапно
вантажівка	грузовик	купок	культя	ризик	риск
вапно	известь	кульгавість	хромота	риси	черты
вигодовування	вскармливание	куприк	копчик	рідина	жидкость
викидень	выкидыш	<b>Л</b>		рідкий	жидкий
вимушений	вынужденный	литковий	икроножный	рогівка	роговица
випинання	выпячивание	лоно	лобок	родзинки	изюм
випорожнення	испражнения	лусочка	чешуйка	роділля	роженца
виразка	язва	<b>М</b>		розпал	разгар
висип	сыпь	марення	бред	розпитування	расспрос
витрішкуватість	пучеглазие	метушитись	суетиться	розтин	сечение
вишкрібання	выскабливание	мигдалик	миндалина	рукавичка	перчатка
вівчак, вовчак	волчанка	миготливий	мерцательный	рідина	жидкость
відвар	отвар	міський	городской	<b>С</b>	
відмова	отказ	міхур	пузырь	садна	ссадины
відраза	отвращение	млявий	вялый	свербіж, сверблячка	зуд
відхідник	анус	<b>Н</b>		сеча	моча
відшарування	отслойка	набряк	отёк	сечовід	мочеточник
вічко	зев	надмірний	избыточный	сечогінний	мочегонный
вогнепальний	огнестрельный	напруга	напряжение	сир	творожистый
вогнищевий	очаговий	натискування	нажатие	сироподібний	ягодица
воротар	привратник	натще	натошак	сідниця	свод
ворушіння	шевеление	нашарування	наслоение	склепіння	висок
втомлюваність	утомляемость	негативний	отрицательный	скроня	скованность
втручання	вмешательство	нежить	насморк	скутість	сосание
вузловий	узловой	нездужання	недомогание	смоктання	сосание
<b>Г</b>		необгрунтований	необоснованный	соняшниковий	подсолнечный
гавкаючий	лающий	непритомність	потеря сознания	спадковість	наследственность
годування	кормление	нирка	почка	спарга	жажда
голка	иголка	нориця	свищ	сприяти	способствовать
гомілка	голень	нодота	тошнота	статевий	половой
горб	бугор	<b>О</b>		статура	телосложение
гумовий	резиновый	обробка	обработка	стежно	бедро
<b>Д</b>		обличчя	лицо	стиснення	сдавление
дільничий	участковый	ознака	признак	стрімкий	стремительный
довідка	справка	оксамит	бархат	струминний	струйний
дозволений	разрешённый	оперізуючий	опоясывающий	струс	сотрясение
долоня	ладонь	опік	ожог	судоми	судороги
допоміжний	вспомогательный	осередок	очаг	сумісність	совместимость
доправляти	доставлять	особистий	личный	суміш	смесь
дотримання	соблюдение	остуда	озноб	сутінковий	сумеречный
драбина	лестница	отруєння	отравление	<b>Т</b>	
<b>Ж</b>		очеревина	брюшина	терміновий	экстренный
жовтяниця	желтуха	<b>П</b>		терпність	онемение
жувальний	жевательный	паління	курение	тиск	давление
<b>З</b>		пахвинний, паховий	паховый	травний	пищеварительный
забій	ушиб	пахвовий	подмышечный	тривалий	длительный
загартовування	закаливание	пекучий	жгучий	тулуб	туловище
загосння	заживление	передміхуровий	предстательный	<b>У</b>	
задишка	одышка	переконати	убедить	усунення	устранение
закреп	запор	переймоподібний	приступообразный	<b>Х</b>	
залишковий	остаточный	переміжний	переменяющийся	харкотиння	мокрота
залоза	железа	перенісся	переносица	харчування	питание
занурювати	погружать	печіння	жжение	хода	походка
запалення	воспаление	північ	север	хребет	позвоночник
запаморочення	головокружение	півнячий	петушиный	<b>Ц</b>	
засіб	средство	підгузок	подгузник	цукровий	сахарный
затерплість	онемение	підсумковий	итоговый	<b>Ч</b>	
заходи	мероприяття	піногасники	пеногасители	чадний	угарный
зважування	взвешивание	піхва	влагалище	черговий	дежурный
звивистий	извитой	плескатий	плоский	чергування	дежурство
зволожений	увлажнённый	повідомлення	известие	черевний	брюшной
зворотній	обратный	повіка	веко	<b>Ш</b>	
здуття	вздутие	подряпина	царапина	шар	слой
здувинний	подвздошный	пологовий будинок	роддом	шкіра	кожа
зіниця	зрачок	полум'я	клубника	шлунок	желудок
знепритомніти	потерять сознание	полуниця	клубника	штучний	искусственный
зомління	обморок	поперек	поясница	<b>Щ</b>	
зріст	рост	породілля	родильница	щелепа	челюсть
<b>К</b>		посіпування	подергивание	щеплення	прививка
калітка	мошонка	потилиця	затылок	щур	крыса
кашлюк	коклюш	поточний	текущий	<b>Я</b>	
квасоля	фасоль	правець	столбняк	ядуха	удушьє
		прибирання	уборка	ясна	дёсны, десна