

Приклади тестових завдань

Крок М *ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА*



1. До фельдшера здоров'я звернувся пацієнт, який скаржиться на серцебиття та періодично виникаючий короткочасний колючий біль в ділянці серця. Які властивості пульсу визначає фельдшер?

- A. Ритм, частоту, наповнення, напруження
- B. Частоту, висоту, напруження, наповнення
- C. Ритм, швидкість, наповнення, висоту
- D. Пульсові коливання, наповнення, напруження
- E. -

2. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

- A. Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень
- B. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- C. Штучна вентиляція легень
- D. Переведення на апаратне дихання
- E. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

3. Фельдшера викликано до пацієнта з гострою затримкою сечовипускання після ниркової коліки. Є підозра на сечокам'яну хворобу. Яку першочергову долікарську допомогу повинен надати фельдшер?

- A. Сидячу теплу ванну
- B. Поставити постійний катетер
- C. Застосувати сечогінні засоби
- D. Застосувати міхур з льодом
- E. Ніжні гарячі ванни

4. При наданні невідкладної допомоги на здоров'я пацієнта з гострим харчовим отруєнням під час введення товстого шлункового зонда раптово з'явилися синюшність обличчя, кашель, втрата голосу. Що є імовірною причиною даного ускладнення?

- A. Потрапляння зонда в дихальні шляхи
- B. Невідповідність діаметру зонда для даного пацієнта
- C. Травма стравоходу
- D. Потрапляння зонда в дванадцятипалу кишку
- E. Травма шлунка

5. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- A. Гектична
- B. Неправильна
- C. Ремітуюча
- D. Хвилеподібна
- E. Інтермітуюча

6. Пацієнта 40-ка років, готують до оперативного втручання на органах черевної

порожнини. Яку клізму необхідно застосувати для підготовки пацієнта?

- A. Очисну
- B. Поживна
- C. Гіпертонічну
- D. Олію
- E. Емульсійну

7. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

- A. Стерильна вазелінова олія
- B. Гліцерин
- C. Антисептичний розчин
- D. Розчин перекису водню
- E. Розчин фурациліну

8. Перед першим введенням антибіотика фельдшер визначає пробу на індивідуальну чутливість організму до препарату. Назвіть розчинник, який підготує фельдшер для розведення антибіотика:

- A. 0,9% розчин натрію хлориду
- B. 5% розчин глюкози
- C. 1% розчин лідокаїну
- D. 0,5% розчин новокаїну
- E. 0,25% розчин новокаїну

9. Під час критичного зниження температури тіла пацієнт відчув різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

- A. Колапс
- B. Сопор
- C. Шок
- D. Кома
- E. Марення

10. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

- A. Дихання Куссмауля
- B. Тахіпноє
- C. Брадіпноє
- D. Дихання Біота
- E. Дихання Чейн-Стокса

11. Пацієнту призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Вкажіть, протягом якого часу збирається кожна порція:

- A. Через кожні 3 години
- B. Через кожні 2 години
- C. Через 6 годин
- D. Порція зібрана за 10 годин
- E. Ранкова та вечірня порції

12. Вкажіть заходи, які необхідно надати пацієнту у перший період гарячки:

- A.** Вкрити пацієнта, прикласти грілку до ніг
- B.** Давати багато прохолодного пиття
- C.** Організувати індивідуальний пост
- D.** Часто змінювати натільну і постільну білизну
- E.** Накласти холодний компрес на чоло

13. Фельдшер швидкої допомоги під час дослідження пульсу пацієнта виявив, що його частота складає 42/хв. Назвіть стан пацієнта:

- A.** Брадикардія
- B.** Екстрасистолія
- C.** Тахікардія
- D.** Аритмія
- E.** Дефіцит пульсу

14. У пацієнта який звернувся на ФАП виявили туберкульоз та транспортували до спеціалізованого закладу. Який вид дезінфекції буде проведений на ФАПі?

- A.** Вогнищева заключна
- B.** Профілактична
- C.** Поточна
- D.** Генеральне прибирання
- E.** Механічна

15. Пацієнтці призначено ввести 20 МО інсуліну, 1 мл дорівнює 100 МО. У шприці набрано 0,5 мл. Яке ускладнення може виникнути у пацієнтки?

- A.** Гіпоглікемічний стан
- B.** Гіперглікемічна кома
- C.** Колапс
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Ліподистрофія

16. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

- A.** Дренажне
- B.** Активне
- C.** Пасивне
- D.** Вимушене
- E.** Фаулера

1. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

- A. Ревматична хвороба
- B. Ревматоїдний артрит
- C. Остеоартроз
- D. Остеохондроз
- E. Подагра

2. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тині Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- A. Хронічний лімфолейкоз
- B. Хронічний мієлолейкоз
- C. Гострий лейкоз
- D. Гіпопластична анемія
- E. Лімфогранулематоз

3. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилися нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125/хв., АТ - 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

- A. Кетоацидотична кома
- B. Гіперосмолярна кома
- C. Гіперлактацидемична кома
- D. Уремична кома
- E. Печінкова кома

4. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

- A. Екзема
- B. Кропив'янка
- C. Атопічний дерматит
- D. Токсикодермія
- E. Нейродерміт

5. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В

неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіпестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Геморагічний інсульт
- C. Транзиторна ішемічна атака
- D. Епідуральна гематома
- E. Пухлина мозку

6. Хворий 36-ти років звернувся до фельдшера зі скаргами на гострі болі в животі, які виникають через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відмічає в осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відмічається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

- A. Виразкова хвороба шлунка
- B. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- C. Хронічний холецистит
- D. Хронічний панкреатит
- E. Хронічний ентерит

7. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

- A. Кандинського-Клерамбо
- B. Корсакова
- C. Маніакальний
- D. Невротичний
- E. Астенічний

8. Хворий 58-ми років, яка скаржиться на біль в ділянці серця, фельдшер ШМД провів ЕКГ-дослідження. Результати електрокардіографії: глибокий, поширений зубець Q, зміщення вище ізолінії інтервалу ST, симптом прапорця, глибокий негативний зубець T. Ваш ймовірний діагноз:

- A. Інфаркт міокарда
- B. Стенокардія
- C. Блокада лівої ніжки пучка Гіса
- D. Гіпертонічна хвороба II ст.
- E. Повна атріовентрикулярна блокада

9. При дослідженні мокротиння виявлені: еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- A.** Бронхіальна астма
- B.** Гострий бронхіт
- C.** Негоспітальна пневмонія
- D.** Сухий плеврит
- E.** Туберкульоз легень

10. У хворого 47-ми років з інфарктом міокарда при транспортуванні в стаціонар раптово виник приступ інспіраторної ядухи, сухий кашель, відчуття стискання у грудях, холодний піт. Яке ускладнення інфаркту міокарда у хворого?

- A.** Серцева астма
- B.** Кардіогенний шок
- C.** Аневризма аорти
- D.** Бронхіальна астма
- E.** ТЕЛА

11. Фельдшер ФАПУ виставив діагноз інфаркт міокарда. Які препарати він використовує для профілактики тромбоемболічних ускладнень при інфаркті міокарда?

- A.** Гепарин
- B.** Строфантин
- C.** Новокаїнамід
- D.** Дофамін
- E.** Лідокаїн

12. Хворий 40-ка років, звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на сильні болі в правій половині живота, поперековій ділянці справа, які віддають в пах, стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об'єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла - $36,9^{\circ}\text{C}$. Пульс - 92/хв. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Ваш ймовірний діагноз:

- A.** Правобічна ниркова колька
- B.** Гострий пієлонефрит
- C.** Гострий гломерулонефрит
- D.** Хронічний гломерулонефрит
- E.** Хронічний пієлонефрит

13. У пацієнта скарги на ниючий біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праву лопатку і виник після психоемоційного стресу. Склери субектеричні, язик обкладений жовтуватим нальотом, при пальпації живота позитивний симптоми Кера, Ортнера. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- A.** Хронічний холецистит
- B.** Виразкова хвороба шлунка
- C.** Цироз печінки
- D.** Хронічний гепатит
- E.** Хронічний коліт

14. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий зі скаргами на застуду, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, болі в правій половині грудної клітки, пов'язані з актом дихання, сухий кашель, головний біль. Захворів

гостро. Об'єктивно: рум'янець на щоках. Частота дихання - 28/хв. Під час пальпації - посилене голосове тремтіння справа, перкуторно - притуплення перкуторного звука справа. Аускультативно - крепітація справа. Пульс - 96/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Який попередній діагноз у хворого?

- A.** Негоспітальна пневмонія
- B.** Гострий бронхіт
- C.** Сухий плеврит
- D.** Рак легенів
- E.** Туберкульоз легенів

15. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 22-х років. Два дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: обличчя одутле, набряки повік, незначні набряки на кінцівках і тулубі. Над легенями в нижніх відділах вологі хрипи. Пульс - 82/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент II тону над аортою. АТ- 160/100 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка біля краю реберної дуги. Симптом Пастернацького - позитивний з обох боків. Добовий діурез - 300 мл. Який попередній діагноз у хворого?

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Гострий пієлонефрит
- C.** Гіпертонічна хвороба
- D.** Хронічний гломерулонефрит
- E.** Нирковокам'яна хвороба

16. Швидка допомога приїхала на виклик до хворого 35-ти років. Об'єктивно: положення вимушене - сидить у ліжку, впираючись руками в край, на віддалі від хворого, особливо під час видиху, чути свистячі хрипи. Спостерігаються ціаноз губ, кашель з утрудненим виділенням в'язкого харкотиння. Грудна клітка діжкоподібна. Перкуторно визначають коробковий звук. Аускультативно - ослаблене дихання, розсіяні, сухі хрипи. Пульс - 92/хв. АТ- 120/70 мм рт.ст. Який препарат треба призначити?

- A.** Еуфілін
- B.** Цефазолін
- C.** Анальгін
- D.** Баралгін
- E.** Строфантин

17. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хворої 60-ти років, у якої після стресової ситуації раптово виникли головний біль, запаморочення і серцебиття. Об'єктивно: пульс - 120/хв., АТ- 210/120 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- A.** Гіпертонічний криз
- B.** Приступ стенокардії
- C.** Напад бронхіальної астми
- D.** Кардіогенний шок
- E.** Інфаркт міокарда

18. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- A.** Баралгін
- B.** Вікасол
- C.** Дицинон
- D.** Алохол
- E.** Нітроглицерин

19. Фельдшер ФАПу спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

- A.** Сидеропенічний
- B.** Анемічний
- C.** Геморагічний
- D.** Астеновегетативний
- E.** Диспептичний

20. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки 35-ти років. При огляді: свідомість відсутня, шкіра суха, дихання шумне, запах ацетону з рота. Частота дихання - 28/хв., пульс - 98/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Зі слів родичів жінка тривалий час хворіє на цукровий діабет. Після перенесеної застуди стан її погіршився: посилилась спрага, з'явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Про яке ускладнення можна подумати?

- A.** Гіперглікемічна кома
- B.** Гіпоглікемічна кома
- C.** Печінкова кома
- D.** Церебральна кома
- E.** Гіперосмолярна кома

21. На ФАП звернувся хворий із скаргами на постійний ниючий біль в правому підребер'ї, пов'язаний з прийомом їжі, загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра жовтушного кольору. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї, печінка виступає з-під правого краю реберної дуги на 2 см, при пальпації болюча. Про яке захворювання можна подумати?

- A.** Хронічний гепатит
- B.** Хронічний панкреатит
- C.** Хронічний холецистит
- D.** Гострий холецистит
- E.** Жовчнокам'яна хвороба

22. Ви - фельдшер ФАПу. До Вас звернувся пацієнт 20-ти років, який скаржиться на загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів. У загально-

му аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A.** Гострий лейкоз
- B.** Гемолітична анемія
- C.** Тромбоцитопенічна пурпура
- D.** Постгеморагічна анемія
- E.** B₁₂-дефіцитна анемія

23. Хворий 40-ка років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудинною з іррадіацією в ліву руку. Після прийому нітроглицерину приступ припинився. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- A.** Стенокардія
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Вада серця
- D.** Гіпертонічна хвороба
- E.** Ревматизм

24. Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри, кровоточивість, жовтяницю, збільшення живота. При обстеженні виявлено: судинні зірочки на шкірі, еритему долонь, ксантоми, асцит. У крові: білірубінемія, збільшення ліпідів. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Цироз печінки
- B.** Хронічний панкреатит
- C.** Хронічний холецистит
- D.** Виразкова хвороба шлунка
- E.** Жовчнокам'яна хвороба

25. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R – R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

- A.** Миготлива аритмія
- B.** Синусова тахікардія
- C.** Екстрасистолічна аритмія
- D.** Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- E.** Синусова аритмія

26. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років, зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сідла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Хвороба Іценко-Кушинга
- B.** Акромегалія
- C.** Нецукровий діабет
- D.** Хвороба Аддісона
- E.** Гіпофізарний нанізм

27. Фельдшера вночі викликали до пацієнта, який скаржиться на ядуху з утрудненим

вдихом. Кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання - шумне, "клекотливе". Пульс - 100/хв., ритмічний. Над легеньми - вологі середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший діагноз:

- A.** набряк легень
- B.** міокардит
- C.** бронхіальна астма
- D.** ендокардит
- E.** ексудативний перикардит

28. Фельдшера ФАПу викликали до хворого зі скаргами на переймоподібний біль у животі, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, водянисті випорожнення, зеленуватого кольору з домішками слизу. Такі симптоми свідчать про:

- A.** сальмонельоз
- B.** холера
- C.** черевний тиф
- D.** дизентерія
- E.** неспецифічний виразковий коліт

29. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого, який кілька тижнів тому повернувся з відвідження до Африки. Хвороба розпочалася з підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$ і сильного ознобу, який переріс у жар: температура тіла різко підвищилась до 40°C . Турбував сильний головний біль, болі в підребер'ях, спрага. Через деякий час температура різко знизилась до нормальної. Хворий сильно спітнів і заснув. При огляді: пальпуються збільшені та болючі печінка та селезінка. Яку хворобу слід запідозрити?

- A.** малярія
- B.** грип
- C.** лептоспіроз
- D.** бруцельоз
- E.** черевний тиф

30. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на появу виразки на статевому члені та неволючого утворення в паху. Хворий мав незахищений статевий акт близько 6-7 тижнів тому. При огляді на слизовій оболонці головки статевого члена виявлено виразку округлої форми, 0,5-0,7 см в діаметрі, безболісну, яка має гладеньке, червоне, блискуче дно. В пахвинній ділянці виявлено збільшений, безболісний лімфовузол близько 2-х см в діаметрі. Вкажіть який період сифілісу відповідає такій клінічній картині?

- A.** первинний
- B.** вторинний
- C.** третинний
- D.** інкубаційний
- E.** хронічний

31. Пацієнт 35-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на зниження зору,

"туман" перед очима, двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гугнявий. При об'єктивному обстеженні виявлено: мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запідозрювати фельдшер?

- A.** ботулізм
- B.** отруєння молоком
- C.** отруєння метиловим спиртом
- D.** стовбуровий енцефаліт
- E.** розлади мозкового кровообігу

32. Хворий 43-х років, працівник м'ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, високу температуру, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо литкових, попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшені печінка та селезінка. Олігурія. Температура тіла - $37,8^{\circ}\text{C}$, пульс - 100/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми?

- A.** лептоспіроз
- B.** черевний тиф
- C.** вірусний гепатит
- D.** висипний тиф
- E.** бруцельоз

33. Вас, фельдшера ШМД, викликали до хворого, який знаходиться у вкрай важкому стані. Риси обличчя загострені, очі запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки. Скарги на пронос, блювання протягом 2-х днів. Випорожнення по типу "рисового відвару". Температура - $37,5^{\circ}\text{C}$. Пульс ниткоподібний. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** холера
- B.** дизентерія
- C.** харчова токсикоінфекція
- D.** сальмонельоз
- E.** колі-ентерит

34. Хворий 58-ми років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово під час психоемоційного збудження втратив свідомість. Об'єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя, пульс - 100/хв., напружений, АТ- 230/110 мм рт.ст. Опущений правий кут рота, дихання шумне, щока "вітрилить". Підняті праві кінцівки падають "як батоги". М'язовий тонус в них та рефлексні низькі, на лівих кінцівках збережені, симптом Бабінського справа. Який попередній діагноз?

- A.** геморагічний інсульт
- B.** гіпертонічний криз
- C.** менінгіт
- D.** ішемічний інсульт
- E.** субарахноїдальний крововилив

35. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на свербіж шкіри, який

з'явився одночасно з висипанням і значно посилюється увечері та вночі. З анамнезу з'ясовано, що 10 днів тому він прибув з відрядження, де проживав у гуртожитку. Об'єктивно: на шкірі живота, сідниць, променево-зап'ясткових суглобів та бокових поверхонь пальців рук - парні папуло-везикулярні розчухи з кров'яними кірочками. Встановіть попередній діагноз:

- A.** Короста
- B.** Екзема
- C.** Кропив'янка
- D.** Токсикодермія
- E.** Пруриго

36. Хворого 28-ми років привезли в лікар-

ню зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C , загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: лейкоцити - $30 \cdot 10^9/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

- A.** Абсцес головного мозку
- B.** Мозковий інсульт
- C.** Менінгіт
- D.** Радикуліт
- E.** Неврит

1. Жінка 24-х років звернулася на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4-5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4-5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:

- А. Перелом 4-5 ребер
- В. Стиснення грудної клітки
- С. Перелом груднини
- Д. Перелом ключиці
- Е. Струс грудної клітки

2. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

- А. Фолікулярна ангіна
- В. Катаральна ангіна
- С. Лакунарна ангіна
- Д. Дифтерія глотки
- Е. Виразково-плівчаста ангіна

3. Через 6 діб після ін'єкції у пацієнтки утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла - $37,8^{\circ}\text{C}$. Що у пацієнтки?

- А. Постін'єкційний абсцес
- В. Карбункул
- С. Флегмона
- Д. Панарицій
- Е. Бешихове запалення

4. Жінка 30 хвилин тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирі, заповнені світло-жовтою рідиною. Яка площа опіку та його ступінь?

- А. 9%, II ступінь
- В. 2%, I ступінь
- С. 5%, IIIA ступінь
- Д. 15%, IIIB ступінь
- Е. 25%, IV ступінь

5. Транспортування потерпілого з переломом хребта за відсутності щита проводиться в положенні:

- А. На животі
- В. На лівому боці
- С. На правому боці
- Д. На спині
- Е. Сидячи

6. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася

температура тіла до 38°C , пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- А. Лімфаденіт
- В. Флегмона
- С. Бешиха
- Д. Лімфангоїт
- Е. Правець

7. Перелом якої з перерахованих нижче кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

- А. Плечової
- В. Великогомількової
- С. Променевої
- Д. Надколінки
- Е. П'яркової

8. До фельдшера ФАПу звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації болючість. Який попередній діагноз?

- А. Гострий мастит
- В. Фурункул правої молочної залози
- С. Мастопатія
- Д. Фіброаденома правої молочної залози
- Е. Гіпермастія

9. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 34-х років, який отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром $7 \times 0,3$ см. Краї рани зяють, кровоточать. Кров витікає пульсуючим струменем, яскраво-червоного кольору. Визначте обсяг першої допомоги:

- А. Накладення джгута
- В. Накладання оклюзійної пов'язки
- С. Накладення стискаючої пов'язки
- Д. Застосування гемостатичної губки
- Е. Іммобілізація шиною Дітеріхса

10. Потерпілий 32-х років після падіння скаржить на біль в лівому плечі в ділянці ключиці. При обстеженні: стан задовільний, шкіра в ділянці травми не ушкоджена, деформація відсутня. При пальпації: визначається локальна болісність та кісткова крепітація у середній третині лівої ключиці. Вкажіть оптимальну транспортну іммобілізацію при даній травмі:

- А. Пов'язкою Дезо
- В. Шиною Дітеріхса
- С. Хрестоподібною пов'язкою
- Д. Колосоподібною пов'язкою на плечовий суглоб
- Е. Комірцем Шанца

11. Ви фельдшер ФАПу, надаєте невідкладну допомогу хворому в стані клінічної смерті. Вкажіть, яке співвідношення дихання та закритого масажу серця слід прово-

дити хворому?

- A. 30:2
- B. 15:2
- C. 5:1
- D. 15:3
- E. 10:2

12. Хворий 45-ти років скаржиться на біль, почервоніння в ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,5°C. В ділянці правої ступні та гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

- A. Бешиха
- B. Гострий артрит
- C. Флегмона
- D. Гострий тромбофлебіт
- E. Лімфангоїт

13. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на біль в промежині. Впродовж останніх 6 місяців у хворого порушення акту дефекації, проноси чергують з закрепамми, незначна кровотеча, помітно втратив вагу. Під час пальцевого ректального дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Який попередній діагноз?

- A. Рак прямої кишки
- B. Анальна тріщина
- C. Гемороїд
- D. Поліп прямої кишки
- E. Парапроктит

14. У складі бригади швидкої допомоги Ви прибули на місце події. Лікар виявив у потерпілого закритий перелом стегна. Ви набрали у шприц 20 мл 0,25% розчину новокаїну, який лікар ввів у ділянку перелому. Який метод знеболювання застосовано?

- A. Блокада місця перелому
- B. Стовбурова блокада
- C. Хімічне знеболювання
- D. Провідникова анестезія
- E. Інфільтраційна анестезія

15. Хворому, з приводу кровотечі, розпочато переливання крові. Через 5 хвилин стан хворого погіршився, з'явився біль у попереку, потемніння в очах, мерехтіння "мушок", вкрився холодним потом. Виникло відчуття страху. Пульс - 110/хв., ниткоподібний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Гемотрансфузійний шок
- B. Пірогенна реакція на переливання крові
- C. Повторна шлункова кровотеча
- D. Анафілактичний шок
- E. Гостре порушення мозкового кровообігу

16. ШМД приїхала на виклик до хворого

63-х років. Об'єктивно: стан важкий, шкіра бліда, пульс - 124/хв. АТ- 85/60 мм рт.ст. Язик сухий, живіт напружений, болісний. Виявлено позитивний синдром Валя, шум плеску. Яку патологію можна запідозрити у даного хворого?

- A. Кишкова непрохідність
- B. Асцит
- C. Гострий апендицит
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий перитоніт

17. ШМД приїхала на місце ДТП - потерпілого збив автомобіль. При огляді: свідомість відсутня, зіниці реагують на світло. Шкіра бліда, дихання сповільнене, поверхневе, пульс частий, слабкий, АТ- 80/60 мм рт.ст., зовнішніх пошкоджень нема. З носа, вух та рота витікає кров. Яке пошкодження слід запідозрити?

- A. Перелом основи черепа
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Забій головного мозку
- D. Струс головного мозку
- E. Здавнення головного мозку

18. ШМД приїхала на виклик до хворого 32-х років у якого раптово виникло блювання "кавовою гущею"; слабкість, втрата свідомості. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка. При обстеженні шкірні покриви бліді, холодні, липкий піт, АТ- 90/70 мм рт.ст., пульс - 104/хв. Який препарат слід застосувати?

- A. Етамзилат
- B. Анальгін
- C. Платифілін
- D. Атропін
- E. Баралгін

19. ШМД приїхала на місце ДТП. Потерпілого збив автомобіль. Він скаржиться на біль, відсутність рухів в правій верхній кінцівці. Об'єктивно: в середній третині правого передпліччя при пальпації відмічається біль, крепітація, патологічна рухомість. Яке ушкодження отримав потерпілий?

- A. Перелом
- B. Вивих
- C. Забій
- D. Розтягнення
- E. Розрив

20. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у лобовій ділянці, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньовнутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- A.** Гострий фронтит
- B.** Гострий етмоїдит
- C.** Гострий риніт
- D.** Гострий гайморит
- E.** Гострий сфеноїдит

21. Фельдшер ШМД виїхав на місце ДТП, хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностовано: правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

- A.** 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії
- B.** Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії
- C.** 6-те міжребер'я по задньопахвовій лінії
- D.** 7-ме міжребер'я по лопатковій лінії
- E.** Проекція плеврального синуса

22. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Під час огляду: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації шкіри нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

- A.** Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки
- B.** Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- C.** Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- D.** Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- E.** Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

23. Потерпілий внаслідок ДТП збуджений, голосно кричить, реально не оцінює свій стан. При огляді виявлено: рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно уламки кісток. Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при наданні першої допомоги

потерпілому?

- A.** Тимчасова зупинка кровотечі
- B.** Асептична пов'язка
- C.** Боротьба з шоком
- D.** Транспортна іммобілізація
- E.** Рентгенологічне обстеження

24. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргою на різку болючість в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - $37,2^{\circ}\text{C}$, худота, блювання. Позитивні симптоми: Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Виразкова хвороба

25. Фельдшер ФАПу виявив у пацієнта блювання "кавовою гущею", дьогтеподібні випорожнення, слабкість. Який попередній діагноз?

- A.** Шлунково-кишкова кровотеча
- B.** Перфоративна виразка
- C.** Гастрит
- D.** Апендицит
- E.** Геморой

26. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена ШМД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ-80/60 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A.** Перитоніт
- B.** Механічна кишкова непрохідність
- C.** Інфаркт міокарда
- D.** Перелом основи черепа
- E.** Тромбоз мезентеріальних судин

1. При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?

- A. Кефалогематома
- B. Септикопемія
- C. Пологова пухлина
- D. Пухирчатка новонародженого
- E. Внутрішньочерепна травма

2. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультативної тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- A. Міокардит
- B. Вогнищева пневмонія
- C. Гломерулонефрит
- D. Сироваткова хвороба
- E. Набута вада серця

3. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПУ на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Алергічний діатез
- B. Анемія
- C. Гіпотрофія
- D. Рахіт
- E. Пітниця

4. У дитини 5-ти років температура тіла - $38,2^{\circ}\text{C}$, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

- A. Дизентерія
- B. Сальмонельоз
- C. Колі-ентерит
- D. Ешерихіоз
- E. Стафілококовий ентероколіт

5. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

- A. Зіскоб з періанальних складок
- B. Копрологічне дослідження випорожнень
- C. Дуоденальне зондування
- D. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- E. Фіброгастроуденоскопія

6. У новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають зви-

чайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Зазначте, для якого стану характерні дані симптоми:

- A. Фізіологічної жовтяниці новонароджених
- B. Гемолітичної хвороби новонароджених
- C. Обтураційної жовтяниці
- D. Вірусного гепатиту
- E. Аномалій розвитку гепатобіліарної системи

7. В поліклініку на прийом звернулася мати з дитиною 3-х років. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C , надсадний кашель, який посилюється з кожним днем, має приступоподібний характер і супроводжується блюванням, наявна в'ялість і втрата апетиту. З анамнезу відомо, що таких приступів у дитини 15-20 на добу, хворіє протягом 5 днів. Що з дитиною?

- A. Кашлюк
- B. ГРВІ
- C. Бронхіт
- D. Пневмонія
- E. Ангіна

8. У дитини 5-ти років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання може бути енцефаліт?

- A. Вітряна віспа
- B. Краснуха
- C. Скарлатина
- D. Кіп
- E. Ентеровірусна інфекція

9. Ви працюєте на ФАПі. Для профілактичного огляду звернулася мати з дитиною, якій виповнився один рік. Останні три місяці не хворіла. Профілактичний щеплення на першому році життя проводились згідно з календарним планом. Вкажіть, що необхідно призначити дитині:

- A. Вакцинацію проти кору, краснухи, паротиту
- B. Вакцинацію проти дифтерії
- C. Ревакцинацію проти туберкульозу
- D. Вакцинацію проти поліомієліту
- E. Ревакцинацію проти епідемічного паротиту

10. При відвідуванні хворої дитини 4-х років фельдшер виявив: температура тіла до $39,0^{\circ}\text{C}$, біль у горлі при ковтанні, головний біль, нудота. На гіперемійованому фоні шкіри дрібноточковий, яскраво-червоний висип, при натисканні шкіра блідне. Висип почався з обличчя та шиї. Носогубний трикутник блідий. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A.** Скарлатина
- B.** Вітряна віспа
- C.** Краснуха
- D.** Кір
- E.** Сироваткова хвороба

11. У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з товстими губами збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного захворювання?

- A.** Зниження продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози
- B.** Підвищення продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози
- C.** Підвищена функція кори наднирників
- D.** Дефіцит інсуліну
- E.** Знижена функція кори наднирників

12. При ознайомленні з лабораторними дослідженнями загального аналізу сечі виявлено наступні показники: лейкоцити - 5-6 в полі зору, епітелій - 1-2 в полі зору, еритроцити - 40-50 в полі зору, циліндри - 1-2 в полі зору. Як слід трактувати такі зміни в сечі?

- A.** Гематурія
- B.** Піурія
- C.** Лейкоцитурія
- D.** Глюкозурія
- E.** Протеїнурія

13. До фельдшера ФАПУ звернулася мати 5-річної дитини. Скарги: у дитини раптово підвищилася температура тіла до 40°C, дитина млява, малорухлива, на шкірі з'явилася висипка геморагічного характеру, зірчастої форми, підвищується над поверхнею шкіри, не зникає після натискання. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Менінгококцемія
- B.** Кір
- C.** Скарлатина
- D.** Вітряна віспа
- E.** Краснуха

14. Учень 5-го класу після уроку фізкультури звернувся до фельдшера медпункту із скаргами на інтенсивний переймоподібний біль у ділянці правого підребер'я, який іррадіює в праве плече, праву лопатку. При пальпації живота відмічається болючість у точці проекції жовчного міхура. Про яке захворювання можна подумати?

- A.** Дискінезія жовчних шляхів по гіпертонічному типу
- B.** Дискінезія жовчних шляхів по гіпотонічному типу
- C.** Дуоденіт
- D.** Виразкова хвороба шлунка
- E.** Виразкова хвороба 12-палої кишки

15. Фельдшер після проведення проби Ман-

ту дітям 7-ми років перед ревакцинацією БЦЖ повинен знати, що інтервал між проведенням проби Манту і ревакцинацією має становити:

- A.** Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 2 тижні
- B.** Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 3 тижні
- C.** Не менше ніж 2 дні і не більше ніж 2 тижні
- D.** Не менше ніж 2 дні і не більше ніж 3 тижні
- E.** Не менше ніж 1 день і не більше ніж 3 тижні

16. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A.** Гострий розлад травлення функціонального походження
- B.** Дизентерія
- C.** Сальмонельоз
- D.** Колі-інфекція
- E.** Ротавірусна інфекція

17. До фельдшера ФАПУ звернулись батьки з дитиною 2-х років, що хворіла на ГРВІ. Вночі раптово дихання стало гучним, його чути на відстані, з'явився приступоподібний, гавкаючий кашель. Про яке ускладнення можна думати?

- A.** Гострий стенозуючий ларингіт
- B.** Обструктивний бронхіт
- C.** Гострий бронхіт
- D.** Назофарингіт
- E.** Гострий трахеїт

18. У дитини 1,5 року, яка лікується з приводу рахіту на фоні задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. Який препарат застосовують для надання невідкладної допомоги?

- A.** Сибазон 0,5%
- B.** Аміназин
- C.** Сульфат магнію 25%
- D.** Лазикс
- E.** Діазепам 0,5%

19. Дитину, яка народилася на 38-му тижні вагітності з довжиною тіла - 45 см і масою - 2500 г, обвід голови - 34 см треба рахувати як:

- A.** Доношену
- B.** Переношену
- C.** Недоношену I ступеню
- D.** Недоношену II ступеню
- E.** Недоношену III ступеню

20. Після вживання великої кількості недозрілих ягід у дитини 5-ти років з'явилася

нудота, біль у животі, блювання. З'явився головний біль, слабкість. При огляді: язик сухий, апетит знижений, випорожнення не стійкі. На шкірі тулуба виявлені елементи алергійного висипання. Що першочергово повинен зробити фельдшер при наявності у дитини даних симптомів:

- A.** Промивання шлунка
- B.** Шлункове зондування
- C.** Ввести анальгін
- D.** Покласти грілку на живіт
- E.** Надати хворому кисневу подушку

21. У дитини 9-ти років, яка часто хворіє на респіраторні вірусні інфекції, раптово у ночі погіршився стан: з'явився сухий кашель, під час якого мокротиння майже не виділяється, задишка експіраторного характеру з довгим свистячим видихом, який чути на відстані, блідість шкіри з ціанотичним відтінком. Визначте для якого стану характерні дані симптоми?

- A.** Бронхіальна астма
- B.** Гострий трахеїт
- C.** Кашлюк
- D.** Гострий стенозуючий ларингіт
- E.** Обструктивний бронхіт

22. Вам необхідно доставити кал до паразитологічної лабораторії у теплому вигляді. Якого збудника можна визначити **ЛИШЕ** за умови теплих випорожнень?

- A.** Лямблії
- B.** Гострики
- C.** Аскариди
- D.** Трихінели
- E.** Ехінококи

23. Ви фельдшер ФАПу. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в баклабораторію:

- A.** 2 години
- B.** 1 година
- C.** 3 години
- D.** 30 хвилин
- E.** 6 годин

24. Після народження дитини на 1-й хвилині життя ЧСС становить менше 100/хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлексії слабкі, тонус м'язів знижений. Синюшність шкіри обличчя, стоп і кистей. Якому патологічному стану відповідає симптоматика?

- A.** Асфіксія новонародженого
- B.** Внутрішньочерепна пологова травма
- C.** Гостра судинна недостатність
- D.** Вроджена вада серця
- E.** Сепсис новонародженого

25. Ви фельдшер ФАПу, оглядаєте дитину 6-ти років з скарлатиною. Перевіряєте симптом "щипка". Про що свідчить позитивний симптом?

- A.** Про підвищену ламкість судин шкіри
- B.** Про гіпертонус периферичних судин
- C.** Про гіпотонус периферичних судин
- D.** Про знижений тургор шкіри
- E.** Це фізіологічний стан шкіри

26. В дитячому садочку виявлена дитина, що захворіла на скарлатину. Які профілактичні заходи необхідно провести в вогнищі інфекції?

- A.** Карантин на 7 днів, огляд контактних
- B.** Карантин на 21 день
- C.** Поточна дезінфекція, обстеження контактних на менінгокок
- D.** Поточна дезінфекція, обстеження на стафілокок
- E.** Проведення щеплення контактним

27. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною віком 5-ти років з такими скаргами: останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

- A.** Пробіотики
- B.** Вітаміни
- C.** Сорбенти
- D.** Антибіотики
- E.** Антигістамінні

1. У вагітної жінки з вузьким тазом другого ступеня виникла ситуація загрози розриву матки. Назвіть першочергові дії фельдшера:

- A.** Зняти пологову діяльність
- B.** Епізіотомія
- C.** Стимуляція пологової діяльності
- D.** Акушерські щипці
- E.** Кесарів розтин

2. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий, раптовий біль внизу живота справа, нудота, блювання, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Апоплексія яєчника
- B.** Перекрут ніжки кісти яєчника
- C.** Позаматкова вагітність
- D.** Гострий апендицит
- E.** Фіброміома

3. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

- A.** Кольпоскопія
- B.** Зондування порожнини матки
- C.** Пункція червоної порожнини через задне склепіння
- D.** Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- E.** Ультразвукове дослідження (УЗД)

4. Після народження дитини у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

- A.** Ознака Шредера
- B.** Ознака Кюстнера-Чукалова
- C.** Ознака Альфельда
- D.** Ознака Клейна
- E.** Ознака Штрассмана

5. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ- 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плоду повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду приглушене - 160/хв. Перейми, які почалися 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

- A.** Загроза розриву матки
- B.** Емболія навколоплідними водами
- C.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D.** Повний розрив матки
- E.** Кінець I періоду пологів

6. До фельдшера ФАПу звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

- A.** Альгодисменорея
- B.** Передменструальний синдром
- C.** Мастопатія
- D.** Посткастраційний синдром
- E.** Вірильний синдром

7. Роділля 20-ти років з терміном вагітності 41 тиждень транспортована фельдшером ШМД до пологового стаціонару. У другому періоді пологів серцебиття плода стало аритмічним з частотою 68-84/хв., не відновлюється між потугами; на тазовому дні знаходяться сіднички плода. Вкажіть втручання, яке повинно бути здійснене:

- A.** Екстракція плода за тазовий кінець
- B.** Накладання акушерських щипців
- C.** Кесарів розтин
- D.** Проведення комбінованого повороту плода
- E.** Проведення плодоруйнівної операції

8. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білої лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Вагітність маткова
- B.** Вагітність позаматкова
- C.** Пухлина матки
- D.** Ендометріоз матки
- E.** Ендометрит

9. При обстеженні породіллі виявлено: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

- A.** Лактостаз
- B.** Гіпогалактія
- C.** Мастит
- D.** Лактогенез
- E.** Лактопоез

10. В гінекологічне відділення доставлена хвора зі скаргами на переймоподібні болі в лівій здухвинній ділянці, незначні кров'янисті виділення із статевих шляхів, що з'явилися після 8-тижневої затримки менструації, запаморочення. АТ- 85/55 мм рт.ст. Симптом Щоткіна-Блюмберга слабо позитивний. Матка збільшена до 5 тижнів вагі-

тності, ліва труба збільшена, болюча. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

- A.** Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- B.** Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки
- C.** Метросальпінгографія
- D.** Гістероскопія органів малого таза
- E.** Кульдоскопія органів малого таза

11. Хвора 50-ти років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на рясні контактні кровотечі, біль внизу живота. При огляді в дзеркала: шийка матки має вигляд "цвітної капусти". Після огляду кровотеча посилилась. Які першочергові дії фельдшера?

- A.** Провести тугу тампонаду матки
- B.** Викликати бригаду ШМД
- C.** Госпіталізувати у супроводі фельдшера
- D.** Покласти холод на низ живота
- E.** Ввести кровоспинні препарати

12. Під час піхвового дослідження у роділлі встановлено: шийка матки згладжена, відкриття 7 см. Плодовий міхур відсутній, голівка притиснута до входу в малий таз. Визначається передній кут великого тім'ячка, надперенісся, надбрівні дуги, очні западини. Визначте передлежання плода:

- A.** Лобне передлежання
- B.** Передньоголовне передлежання
- C.** Потиличне, передній вид
- D.** Лицьове, задній вид
- E.** Потиличне, задній вид

13. Ви фельдшер ШМД. З'явилися на виклик до вагітної, у якої раптово з'явилась кровотеча з піхви. При обстеженні з'ясувалось: вагітність 35 тижнів. Скарж жінка не пред'являє, матка в нормотонусі, безболісна при пальпації, положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Серцебиття плода - 120/хв. Виділення з піхви кров'яні, помірні. Пульс - 110/хв. АТ- 110/70 мм рт.ст. Попередній діагноз, тактика фельдшера:

- A.** Передлежання плаценти. Негайна госпіталізація
- B.** Передчасне відшарування плаценти. Кровоспинні
- C.** Передчасні пологи. Госпіталізація
- D.** Мимовільний аборт. Госпіталізація
- E.** Загроза розриву матки. Госпіталізація

14. Ви фельдшер ФАПу. При обстеженні вагітної, яку треба взяти на облік, встановили: термін вагітності 30 тижнів, положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Розміри тазу: 24-26-28-18. При піхвовому дослідженні мис досягається, діагональна кон'югата 11 см. Про який таз йдеться?

- A.** Загальнорівномірнорозвужений таз
- B.** Нормальний таз
- C.** Плоскорохитичний таз
- D.** Простий плоский таз
- E.** Загальнозвужений плоский таз

15. Через 10 хвилин після народження дитини з'явилися незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Ознаки відокремлення посліду позитивні. Крововтрата 280 мл. Яка подальша тактика ведення пологів?

- A.** Запропонувати роділлі потужитись
- B.** Ввести окситоцин
- C.** Провести ручне відокремлення плаценти
- D.** Провести зовнішній масаж матки
- E.** Виділити плаценту зовнішніми прийомами

16. При обстеженні вагітної, фельдшер визначив, що поздовжня вісь плода і матки перетинається під прямим кутом. Серцебиття плода вислуховується зліва на рівні пупка до 140/хв., ясне, ритмічне. Яке положення та позиція плода?

- A.** Поперечне, I позиція
- B.** Поздовжнє, I позиція
- C.** Поперечне, II позиція
- D.** Поздовжнє, II позиція
- E.** Косе, I позиція

17. У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

- A.** Перший період
- B.** Другий період
- C.** Третій період
- D.** Передвісники пологів
- E.** -

18. Акушерка оглядає вагітну жінку. Дно матки знаходиться на рівні пупка. Який термін вагітності?

- A.** 24 тижні
- B.** 16 тижнів
- C.** 20 тижнів
- D.** 28 тижнів
- E.** 32 тижні

19. Вагітна знаходиться в палаті патології вагітності. Вагітність перша, 38 тижнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція. Де найкраще вислухати серцебиття плода?

- A.** Справа нижче пупка
- B.** Зліва нижче пупка
- C.** Зліва вище пупка
- D.** Справа вище пупка
- E.** В ділянці пупка

20. На ФАП прийшла вагітна. При огляді над входом в малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина м'якої консистенції, яка не балотує. У дні матки визначається голівка. Визначте передлежання плоду:

- A.** Тазове
- B.** Головне
- C.** Нижнє
- D.** Поперечне
- E.** Косе

21. На ФАП з'явилася вагітна жінка зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота та кров'янисті виділення зі статевих шляхів. При вагінальному дослідженні шийка матки відкрита. В ділянці зовнішнього вічка визначається нижній полюс плодового яйця. Попередній діагноз:

- A.** Аборт в ході
- B.** Аборт що почався
- C.** Неповний аборт
- D.** Повний аборт
- E.** Кримінальний аборт

1. У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

- A. Папаверин 2% внутрішньом'язово
- B. Оцтові обгортання
- C. Анальгін 50% внутрішньом'язово
- D. Холод на проекцію великих судин
- E. Парацетамол перорально

2. Ви фельдшер ШМД. Хворий після ДТП має відкритий перелом стегна. Першочергові догоспітальні дії фельдшера полягають в:

- A. Зупинці кровотечі, знеболюванні, транспортній іммобілізації
- B. Виклику швидкої допомоги
- C. Знеболенні, введенні антибіотиків
- D. Накладанні джгута, транспортуванні в лікарню
- E. Зупинці кровотечі, проведенні іммобілізації

3. Вагітна звернулась на ФАП до фельдшера зі скаргами на головний біль, нудоту, мерехтіння мушок перед очима. 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ- 200/120 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 190/115 мм рт.ст. Рс- 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

- A. Преeklampсія тяжкий ступінь
- B. Преeklampсія легкий ступінь
- C. Набряки під час вагітності
- D. Гіпертонічний криз
- E. Ранній гестоз вагітних

4. У хворого на бронхіальну астму напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу, в/в ведення еуфіліну ефекту не дали. Вимушене положення тіла, частота дихання - 36/хв., кашель з незначним виділенням харкотиння. Рс- 84/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Дистанційні сухі хрипи. Який препарат найбільш доцільно приготувати?

- A. Преднізолон
- B. Адреналін
- C. Ефедрин
- D. Астмопент
- E. Морфін

5. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога: нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?

- A. Морфіну гідрохлорид
- B. Но-шпа
- C. Баралгін
- D. Папаверину гідрохлорид
- E. Спазмалгон

6. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до 7-ми річної дитини, у якої під час гри з дрібними іграшками раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід фельдшеру виконати в першу чергу?

- A. Прийом Геймліха
- B. Прекардіальний удар
- C. Непрямий масаж серця
- D. Штучну вентиляцію легенів
- E. Прямий масаж серця

7. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- A. Гіповолемічний шок
- B. Кардіогенний шок
- C. Анафілактичний шок
- D. Перфорація виразки шлунка
- E. Гостре отруєння

8. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржить на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіяння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

- A. Відкритий перелом
- B. Закритий перелом
- C. Вивих
- D. Розтягнення зв'язок
- E. Розрив зв'язок

9. Дитині 7 місяців, на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко, манна каша). Поступила в стаціонар з підвищеною температурою до 37,8°C, короткочасними приступами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту II ступеня. Позитивні симптоми Ерба, Труссо, Маслово. Зазначте патологічний стан, що став причиною судом:

- A. Спазмофілія
- B. Епілепсія
- C. Ниркова eklampсія
- D. Менінгоенцефаліт
- E. -

10. Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернувся хворий із пораненням грудної клітки. При огляді рани фельдшер відмітив, що під час видуху із рани виділяється піниста кров,

під час вдиху у рану засмоктуються повітря. Турбує виражений біль та задишка. Вкажіть, яку пов'язку слід накласти хворому:

- A.** Оклюзійна
- B.** Пов'язка Дезо
- C.** Циркулярна пов'язка на грудну клітку
- D.** Клейова пов'язка
- E.** Асептична пов'язка

11. Ви фельдшер ШМД, прибули на виклик до пацієнта 40-ка років, який скаржиться на гострий біль в животі, що з'явився раптово після фізичного навантаження. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Живіт дошкоподібний, болючий при пальпації. Симптом Щоткіна-Блюмберга різко позитивний. Визначте, яке ускладнення розвинулось у хворого:

- A.** Перфорація
- B.** Кровотеча
- C.** Пенетрація
- D.** Пілоростеноз
- E.** Малігнізація

12. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

- A.** Лідокаїн
- B.** Верапаміл
- C.** Еуфілін
- D.** Атропін
- E.** Анальгін

13. Фельдшер ФАПУ проводить вагінальне дослідження жінці 38-ми років, яка звернулася з приводу появи гнійних виділень з неприємним запахом з піхви. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу кісти яєчника. Під час бімануального дослідження з'явився гострий різкий біль внизу живота. Виникнення цього стану пов'язане з:

- A.** Розрив кісти яєчника
- B.** Збільшення кісти
- C.** Малігнізація кісти
- D.** Гідросальпінкс
- E.** Піосальпінкс

14. Фельдшера ФАПУ викликали до роділлі додому. По приїзду фельдшера у роділлі триває III період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл крові, кровотеча триває. Під час огляду материнської поверхні плаценти встановлено відсутність однієї дольки. Яка допомога повинна бути надана в такій ситуації?

- A.** Ручне обстеження порожнини матки
- B.** В/в введення утеротонічних засобів
- C.** Зовнішній масаж матки
- D.** Огляд пологових шляхів в дзеркалах
- E.** Притиснення черевної аорти кулаком

15. На 43-му тижні вагітності народилася дитина в стані апное, в'яла, шкіра бліда, слизові оболонки різко ціанотичні, тонус м'язів знижений, рефлексів немає, серцева діяльність майже цілком пригнічена. Які дії по оживленню дитини треба провести в першу чергу:

- A.** Відсмоктати слиз із верхніх дихальних шляхів
- B.** Провести ШВЛ через маску
- C.** Провести ШВЛ через інтубаційну трубку
- D.** Ввести розчин адреналіну 1:10000
- E.** Ввести 5% розчин альбуміну

16. Бригаду ШМД викликали до дівчинки 8-ми років, яка після введення самостійно ін'єкцій інсуліну швидко знепритомніла. При огляді: шкіра, слизові оболонки, язик вологі, тризм жувальних м'язів. Для надання невідкладної медичної допомоги фельдшеру необхідно ввести 20% розчин глюкози. Вкажіть найдоцільніший шлях і метод введення даного препарату:

- A.** Внутрішньовенно струминно
- B.** Внутрішньовенно краплинно
- C.** У ротову порожнину поступово
- D.** Внутрішньом'язово дробно
- E.** Підшкірно повільно

17. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

- A.** Седуксен, димедрол, аміназин
- B.** Кордіамін, супрастин, анальгін
- C.** Строфантин, адреналін, тавегіл
- D.** Цефазолін, манітол, еуфілін
- E.** Ефедрин, алуцент, атропін

18. Повторнонароджуюча, в терміні пологів, з регулярною пологовою діяльністю. В анамнезі: кесарів розтин. Під час перейм відчула розлитий біль в ділянці післяопераційного рубця. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки 5 см. Які подальші дії?

- A.** Кесарів розтин
- B.** Стимуляція пологової діяльності
- C.** Накладання акушерських щипців
- D.** Очікувальна тактика ведення пологів
- E.** Пологи через природні статеві шляхи

19. До пацієнтки 38-ми років приїхала на

виклик ШМД. Жінка поскаржилася, що прокинулася вночі від раптового, різкого, швидко наростаючого болю у правому під-ребер'ї, який іррадіював у праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою і повторним блюванням. Позитивні симптоми Ор-тнера, Кера, Мерфі. Який препарат підго-тує фельдшер в цій ситуації?

- A.** Атропін
- B.** Димедрол
- C.** Алохол
- D.** Анестезин
- E.** Церукал

20. У хворого після поранення шиї раптово виникла різка блідість шкіри, сильний біль і свистячий звук в рані. На ваших очах зупинились серце та дихання. Що трапилось з хворим?

- A.** Повітряна емболія
- B.** Жирова емболія
- C.** Асфіксія
- D.** Гостра анемія
- E.** Шок

21. Мати з 6-ти річною дитиною звернулася до фельдшера ФАПУ, що її дитину в області обличчя вкусила комаха. При огляді фельдшер виявив еластичну припухлість на щоках, повіках, охриплість голосу. Ди-тина неспокійна, температура - 38°C . Такий стан відповідає:

- A.** набряку Квінке
- B.** Кропив'янці
- C.** Сінній лихоманці
- D.** Екламсії
- E.** Гнейсу

22. Фельдшер швидкої медичної допомоги прибув на виклик до пацієнтки 18-ти років, яка раптово втратила свідомість. Зі слів родичів відомо, що страждає на цукровий діабет, отримує інсулін короткої дії. Паці-

єнтка без свідомості. Шкіра волога, судоми м'язів верхніх та нижніх кінцівок. Пульс - 110/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст. Із введення яких препаратів необхідно розпочати на-дання невідкладної допомоги?

- A.** 40% розчин глюкози
- B.** 10% розчин глюкози
- C.** 5% розчин глюкози
- D.** Інсулін короткої дії
- E.** Інсулін пролонгованої дії

23. Жінка 20-ти років скаржиться на за-тримку місячних впродовж 8-ми тижнів, інтенсивний біль унизу живота. При вагі-нальному дослідженні справа пальпується пухлиноподібне утворення, збільшення ма-тки. Визначається позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Які першочергові дії фельдшера на догоспітальному етапі?

- A.** Покласти холод на низ живота і госпіта-лізувати в гінекологічний стаціонар
- B.** Ввести знеболюючі засоби
- C.** Ввести заспокійливі засоби
- D.** Порекомендувати звернутись до лікаря гінеколога
- E.** Провести тест на вагітність

24. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доноше-ного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скар-житься на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість шкір-них покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 96/хв., із статевих шля-хів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у поро-діллі?

- A.** Гіпотонія матки
- B.** Гіпоплазія матки
- C.** Атонія матки
- D.** Розрив пологових шляхів
- E.** Геморагічний шок