

# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою  
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”


ID студента										Прізвище									

Варіант \_\_\_\_\_

## Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

### Крок М

### СЕСТРИНСЬКА СПРАВА



# ІНСТРУКЦІЯ

**Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.**

ББК 54.1я73  
УДК 61

**Автори тестових завдань:** Алексеенко О.І., Амеліна Л.О., Атаманюк Г.В., Бабіна С.М., Бібік А.І., Білий О.П., Бондаренко А.Д., Борейко Л.Д., Бутенко С.А., Василюк В.М., Веклич В.В., Вибіцька О.В., Волчок О.М., Гайдуков В.А., Гайдученко І.В., Голубченко Н.К., Гошовська А.В., Григор'єва І.М., Григоров С.І., Грищенко Я.А., Давидова В.Ф., Дацко Л.П., Демченко О.К., Дідовська С.О., Доценко В.М., Дробот Н.П., Дутік В.І., Дятлова Н.О., Єрмолаєва В.Л., Жолобайлюк О.І., Жудіна Л.А., Зайцева В.П., Зайцева Н.С., Захарова Т.М., Здиховська Л.Г., Зеленюк О.С., Іванов Г.О., Іванов І.В., Каменева Н.В., Камінська Є.І., Капко М.М., Капралова Л.К., Кияшко Г.П., Кіясова О.Л., Кожухар І.С., Коломієць Н.Г., Коняєва Г.І., Корнісік Н.М., Коротєєва І.В., Коршенко Г.П., Кудрявцева Т.О., Кучер І.А., Левіна Ф.І., Лесик-Лісна О.А., Лисененко О.М., Лихачова М.В., Лубінецька А.В., Лубова Т.Ф., Луговська Т.П., Лук'яненко О.В., Лукач І.Ю., Магас Н.М., Макарова О.В., Марциненко В.О., Мельник П.О., Мішук І.М., Могила В.І., Моїсеєнко О.Г., Наумова С.А., Небуной В.В., Недорез С.В., Новицька Л.А., Оголюк Н.В., Ольховська Л.П., Онопрієнко О.Д., Опoшнйя С.І., Пашкова І.О., Піддубна П.І., Піц Л.О., Пономаренко М.М., Попадинець І.П., Прачкевич Л.М., Романенкова С.В., Рябий С.І., Рябіченко С.І., Савонік Л.В., Сарана В.І., Сарапук О.Р., Семеняк А.В., Серєда М.П., Сикирицька Т.Б., Синенко О.А., Синкевич Л.Р., Соколовська М.І., Солодка В.О., Степанківська О.В., Струбіцька Н.Ю., Ткаченко О.В., Томчук Т.В., Троц В.М., Троян А.М., Тюріна О.М., Федорова Л.В., Харчук П.Ф., Холявицька Л.В., Хомко О.Й., Черченко В.О., Чорна О.Г., Шаповал Н.Л., Шарій В.М., Шерстюк Л.А., Шихальова З.М., Шокалюк Л.І., Шоломицька Т.М., Шуляр І.А., Юзько Т.А., Юрцева А.П. та Комітети фахової експертизи.

**Рецензенти.** Експерти: Баб'як В.І., Бачинська І.І., Білецька А.Г., Білий О.П., Борейко Л.Д., Бразалій Л.П., Липова О.О., Луценко Н.М., Макаренко Н.Г., Макарова О.В., Максимова В.В., Новицька Л.А., Опoшнйя С.І., Пасічник О.В., Писанець В.В., Піддубна П.І., Попова А.Г., Рябека Т.І., Стасишин О.С., Харланчук Г.М., Хилько В.О., Шегедин М.Б.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М. Сестринська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.

Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку медичних сестер.

**Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів.**

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. У хворого 30-ти років після фізичного навантаження з'явилася кровотеча з носа. Шкірні покриви бліді, пульс частий, артеріальний тиск знижений. Які першочергові дії медичної сестри в даній ситуації?

- A. Ввести в носовий хід турунду
- B. Зробити передню тампонаду носа
- C. Ввести кровоспинні засоби
- D. Покласти хворого на кушетку
- E. Зробити задню тампонаду носа

2. До гінекологічного відділення надійшла жінка 25-ти років з ознаками гострого живота. Остання менструація - два тижні тому. Що можна припустити?

- A. Апоплексія яєчника
- B. Позаматкова вагітність
- C. Некроз фіброматозного вузла
- D. Сальпінгофорит
- E. Ерозія шийки матки

3. Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 2-х місяців. Який прийом можна використати для попередження аспірації шлункового вмісту під час виймання зонда?

- A. Перетиснути зонд
- B. Повернути голову на бік
- C. Закинути голову назад
- D. Швидко вийняти зонд
- E. Повільно виймати зонд

4. Частота випорожнень у здорової дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, може становити:

- A. 5-7 разів на добу
- B. 10-12 разів на добу
- C. 12-15 разів на добу
- D. 15-17 разів на добу
- E. 17-20 разів на добу

5. Мати проводила підготовку дитини до грудного вигодовування і виявила утруднене носове дихання, пов'язане з великою кількістю слизу. Яким розчином потрібно промити носові ходи?

- A. Фізіологічним розчином
- B. Нафтізином
- C. Галазоліном
- D. Ефедрином
- E. Алое

6. При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними сироватками 0 (I) та A (II) груп. Яка група крові, що досліджується?

- A. B (III)
- B. A (II)
- C. 0 (I)
- D. AB (IV)
- E. Висновок зробити неможливо

7. Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A. Припинити зондування
- B. Продовжити зондування
- C. Зробити перерву
- D. Поставити грілку на живіт
- E. -

8. У хворого раптово виникли загальна слабкість, блювота у вигляді кавової гущі, чорні випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна підготувати даного хворого?

- A. Езофагогастроуденофіброскопія
- B. Рентгенографія шлунку
- C. Зондування шлунку
- D. Промивання шлунку
- E. Ректороманоскопія

9. У потерпілого під час їжі раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід медсестрі виконати негайно у потерпілого?

- A. Прийом Геймліха
- B. Прекардіальний удар
- C. Непрямий масаж серця
- D. Штучну вентиляцію легенів
- E. Прямий масаж серця

10. Хворому з варикозною хворобою нижніх кінцівок призначена планова операція. Коли медсестрі необхідно виконати безпосередню премедикацію даному хворому?

- A. За 30 хв. до операції
- B. За 2 год. до операції
- C. Безпосередньо на операційному столі
- D. Увечері напередодні операції
- E. Увечері та вранці

11. При огляді постраждалого з колотою раною грудної клітки виявлено, що під час дихання повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину і не виходить з неї. Яке ускладнення може припустити медсестра у хворого?

- A.** Клапанний пневмоторакс
- B.** Відкритий пневмоторакс
- C.** Закритий пневмоторакс
- D.** Поранення легень
- E.** Перелом ребер

**12.** Медична сестра доглядає хворого на постгеморагічну анемію. Яка проблема притаманна цьому стану?

- A.** Запаморочення
- B.** Підвищена температура
- C.** Кашель
- D.** Шкірні висипання
- E.** Болісне сечовипускання

**13.** На I етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?

- A.** Перенесена дизентерія
- B.** Нерегулярне харчування
- C.** Гіподинамія
- D.** Психоемоційний стрес
- E.** Вживання великої кількості рідини

**14.** Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів - 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?

- A.** Немає ризику
- B.** Мінімальний
- C.** Помірний
- D.** Високий
- E.** Особливо високий

**15.** Пацієнта 62-х років після операції видалення пухлини передміхурової залози доставили до палати з постійним катетером у сечовому міхурі. Які незалежні маніпуляції проведе медична сестра при догляді за катетером?

- A.** Промивання антисептиком
- B.** Перекриття затискачем тричі на добу
- C.** Зміна положення пацієнта у ліжку
- D.** Промивання теплою водою
- E.** Заміна катетера двічі на добу

**16.** Палатна медична сестра при догляді за пацієнтом 24-х років на третю добу після операції на травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш вірогідну потенційну проблему пацієнта:

- A.** Парез кишківника
- B.** Заворот кишок
- C.** Копростаз
- D.** Кишкова непрохідність
- E.** Перитоніт

**17.** Жінка звернулася до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження онкопрофогляду. Частота відвідування складає:

- A.** 2 рази на рік
- B.** 1 раз на 2 роки
- C.** Щомісяця
- D.** Щороку
- E.** Щотижня

**18.** При огляді новонародженої дитини на 3-ю добу життя виявлено зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов'язана дана проблема?

- A.** Фізіологічна втрата маси тіла
- B.** Статева криза
- C.** Сечокислий інфаркт нирок
- D.** Транзиторний дисбактеріоз
- E.** Токсична еритема

**19.** Дівчинка 7-ми років скаржиться на часте болісне сечовипускання, біль у животі та у поперековій ділянці, підвищення  $t^{\circ}$  до  $37,7^{\circ}C$ . Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки бліді. Сеча каламутна. При мікроскопії осаду сечі: лейкоцити 40-50 в п/з, протеїнурія. На етапі реалізації медсестринських втручань забезпечення якого дієтичного харчування потребує дитина?

- A.** Стіл № 5
- B.** Стіл № 7
- C.** Стіл № 1
- D.** Стіл № 9
- E.** Стіл № 10

**20.** Дитина 12-ти місяців хвора на рахіт. Під час гри раптово з'явилися: витрішкуватість, переляк на обличчі, ціаноз навколо рота і носа, зупинилося дихання. Через декілька секунд з'явився гучний вдих - "півнячий крик". Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати дитині?

- A.** негайно надавити на корінь язика і покрити обличчя холодною водою
- B.** Госпіталізувати пацієнта
- C.** Призначити вітамін  $D_3$
- D.** Ввести протисудомні препарати
- E.** Застосувати гормональні препарати

**21.** У трирічної дитини після укусу бджоли з'явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття жару, нестача повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, кінцівки холодні, холодний липкий піт на тулубі. З чого необхідно розпочати надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі?

**A.** Видалити жало, прикласти міхур з льодом, негайно підшкірно ввести 0,1% розчин адреналіну (0,3-0,5 мл)  
**B.** Госпіталізувати до стаціонару  
**C.** Зробити примочку на місце укусу  
**D.** Місце укусу обколоти 0,3мл 0,1% розчину адреналіну в 3 мл 0,9% розчину натрію хлориду  
**E.** Ввести в/венно струминно преднізолон

**22.** При обстеженні у хворого виявили "склоподібне" харкотиння, а також наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні дані зміни?

**A.** Бронхіальна астма  
**B.** Гострий бронхіт  
**C.** Абсцес легенів  
**D.** Пневмонія  
**E.** Гангрена легенів

**23.** Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви бліді, АТ- 110/75 мм рт.ст., Рс-72/хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської допомоги:

**A.** Вдихання парів нашатирного спирту  
**B.** Гірчичник на ділянку серця  
**C.** Положення напівсидячи  
**D.** Інгаляції зволоженого кисню  
**E.** Інгаляції кисню, пропущеного через спирт

**24.** У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклими є губи і ніс. Потім з'явилися ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, захриплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

**A.** набряк Квінке  
**B.** Напад бронхіальної астми  
**C.** Анафілактичний шок  
**D.** Алергічний ларингіт  
**E.** Кропив'янка

**25.** Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

**A.** Фенолфталеїнової проби  
**B.** Азопірамової проби  
**C.** Амідопіринової проби  
**D.** Бензидинової проби  
**E.** Проби з суданом-3

**26.** Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

**A.** 120  
**B.** 408  
**C.** 450  
**D.** 223  
**E.** 38

**27.** За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію. Яку максимальну кількість розчину можна ввести одноразово?

**A.** 10 мл  
**B.** 5 мл  
**C.** 2 мл  
**D.** 15 мл  
**E.** 20 мл

**28.** Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика, і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

**A.** 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину  
**B.** 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину  
**C.** 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину  
**D.** 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину  
**E.** 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину

**29.** Медична сестра з лікарем перев'язує пацієнта, у якого різана рана кисті з гнійним ексудатом, отримана 3 дні тому. Медсестра подала лікарю 1% розчин йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні для цієї перев'язки?

**A.** 3% водню пероксиду та 10% натрію хлориду  
**B.** 1% хлораміну та 10% натрію хлориду  
**C.** 0,02% фурациліну та 0,9% натрію хлориду  
**D.** 6% водню пероксиду та 0,02% фурациліну  
**E.** 3% водню пероксиду та 0,9% натрію хлориду

**30.** На автобусний зупинці непритомна людина. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, непритомний, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівки нерухомі, падають, як батіг. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати хворому?

- A.** На спині, піднявши головний кінець
- B.** На спині, піднявши ножний кінець
- C.** На животі, голову вліво
- D.** На лівому боці
- E.** На правому боці

**31.** У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам'ятав, шкодував за скоєним. Для якого психопатологічного стану характерна така симптоматика?

- A.** Патологічний афект
- B.** Сомнамбулізм
- C.** Транс
- D.** Сутінковий стан
- E.** Фугіформний стан

**32.** Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча стосовно своєї особи орієнтується. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?

- A.** Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря
- B.** Випустити хворого з відділення
- C.** Викликати рідних хворого
- D.** Ввести розчин аміназину
- E.** Заспокоїти хворого

**33.** Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ . Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ- 120/70 мм рт.ст., Рс- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить обрати ефективну терапію?

- A.** Бактеріологічне дослідження сечі
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Аналіз сечі за Зимницьким
- E.** Урографія

**34.** Сімейну медсестру викликали до хворого 48-ми років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після того, як пацієнт піднявся сходами. Який засіб слід використати в першу чергу?

- A.** Нітрогліцерин
- B.** Ніфедипін
- C.** Аспірин
- D.** Атенолол
- E.** Папаверин

**35.** У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. Болісне сечовипускання. Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. Яку допомогу медична сестра повинна надати пацієнту в першу чергу?

- A.** Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку
- B.** Зробити гарячу ніжну ванну
- C.** Покласти міхур з льодом на живіт
- D.** Ввести розчин промедолу
- E.** Ввести розчин папаверину

**36.** Пацієнтка В. 52-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Після порушення дієти виник інтенсивний біль у правому підребер'ї. Які засоби долікарської допомоги допоможуть зменшити біль?

- A.** Грілка на ділянку правого підребер'я
- B.** Міхур з льодом на праве підребер'я
- C.** Гірчичник на грудну клітку
- D.** Банки на грудну клітку
- E.** Ножні ванни

**37.** При відвідуванні на дому медичною сестрою дитини 4-х місяців, мати поскаржилася на блювання дитини неперевареною їжею, випорожнення рідкі зеленуваті, з білими грудочками до 6-8 разів на добу. При огляді:  $t^{\circ}$  тіла  $36,6^{\circ}\text{C}$ , язик сухий з білим нальотом. Два дні тому мати самостійно ввела I прикорм. Що з дитиною?

- A.** Проста диспепсія
- B.** Кишковий токсикоз
- C.** Гіпокальціємічний синдром
- D.** Кишкова інфекція
- E.** Токсична диспепсія

**38.** Під час огляду зіву у дитини 12-ти років медсестра звернула увагу, що мигдалики гіперемовані, навколо лакун білуватий наліт, який легко знімається ватними тампоном. З яким захворюванням треба провести дифдіагностику?

- A.** Дифтерія
- B.** ГРВІ
- C.** Бронхіт
- D.** Краснуха
- E.** Хронічний тонзиліт

**39.** До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею.

Три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі". Суб'єктивно: відчуває себе задовільно, може рухатися самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення стаціонару?

- A. На каталці, лежачи
- B. Самостійно у супроводі медичної сестри
- C. Самостійно без супроводу
- D. На кріслі-каталці
- E. На ношах двома санітарами

40. Пацієнту 45 років кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчину еуфіліну. Після ін'єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. Флебіт
- B. Повітряна емболія
- C. Медикаментозна емболія
- D. Пірогенна реакція
- E. Інфільтрат

41. Пацієнтка Р. 52 років лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, скаржить на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

- A. Експіраторна задишка
- B. Інспіраторна задишка
- C. Змішана задишка
- D. Стридорозне дихання
- E. Дихання Біота

42. У хлопчика 6-ти років з природженою вадою серця (тетрада Фалло) розвинувся задушливо-ціанотичний напад. Яке положення слід надати дитині для покращення її стану?

- A. Колінно-грудне (навпочіпки)
- B. Лежачи, з підвищеним головним кінцем
- C. Напівсидячи
- D. Сидячи
- E. Горизонтальне

43. На прийомі дитина 7-ми років зі скаргами на сухий кашель, нежить, задишку, лихоманку. Лікар припускає гостру пневмонію. Який метод медсестринського обстеження дитини буде найбільш інформативним у даному випадку?

- A. Підрахунок частоти дихальних рухів
- B. Підрахунок частоти пульсу
- C. Вимірювання артеріального тиску
- D. Вимірювання температури тіла
- E. Пальпація периферичних лімфатичних вузлів

44. У дитини 6-ти років після порушення дієти гостро погіршився стан: спостерігається нудота, біль у епігастральній ділянці, дворазове блювання. Яку рідину потрібно використати медичній сестрі для промивання шлунку дитини?

- A. Переварена вода
- B. Розчин фурациліну
- C. Розчин бікарбонату натрію
- D. Дистильована вода
- E. Відвар квітів ромашки лікарської

45. Після операції з приводу гострого холециститу у пацієнтки похилого віку спостерігається затримка сечовиділення протягом 12 годин. Лікар призначив хворій катетеризацію сечового міхура. Чим необхідно змастити кінець катетера перед введенням?

- A. Стерильним гліцерином
- B. 2% розчином борної кислоти
- C. Розчином фурациліну 1:5000
- D. Вазеліном
- E. Вазеліновою олією

46. Чоловік 35 років скаржить на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії, у більшій мірі зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

- A. Аналіз сечі та крові на діастазу
- B. Загальний аналіз сечі
- C. Аналіз крові на цукор
- D. Копрологічне дослідження
- E. Аналіз калу на приховану кров

47. Дитині 1 рік, хворіє на ГРВІ. На другу добу на фоні  $t^{\circ} - 38,5^{\circ}C$ , катаральних явищ дитина стала неспокійною, не знаходить зручного положення у ліжку, періодично спостерігається інспіраторна задишка, гавкаючий кашель, голос захриплий. Що слід зробити медичній сестрі для надання невідкладної допомоги?

- A. Лужні інгаляції по чергово з лазолваном
- B. Проведення прийому Геймліха
- C. Виключити з раціону харчові алергени
- D. Гірчичні обгортання
- E. Інгаляція з беродуалом

48. До медичної сестри звернувся пацієнт із забоем м'яких тканин. Який препарат з групи місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення шляхом охолодження ділянки цієї травми?

- A.** Хлоретил
- B.** Дикаїн
- C.** Ефір
- D.** Лідокаїн
- E.** Новокаїн

**49.** Жінка 28-ми років перебуває на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит типу А. Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй порекомендували лікувальну мінеральну воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку?

- A.** Миргородська
- B.** Свалява
- C.** Лужанська
- D.** Поляна Квасова
- E.** Боржомі

**50.** Лікарем поставлено діагноз: "Кровотеча з вен стравоходу". Який інструмент має підготувати медсестра для зупинки кровотечі з вен стравоходу?

- A.** Зонд Блекмора
- B.** Назогастральний зонд
- C.** Катетер Фолея
- D.** Затискач Кохера
- E.** Затискач Мікуліча

**51.** У пацієнта з ішемічною хворобою серця раптово виник біль за грудиною стискаючого характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад годину. Як необхідно транспортувати хворого з імовірним інфарктом міокарда?

- A.** Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах
- B.** Міським транспортом
- C.** Попутнім транспортом
- D.** У плановому порядку
- E.** -

**52.** Під час забору крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки виконання маніпуляції відбулося потрапляння крові в очі медсестри. Як повинна діяти медсестра, відповідно до наказу МОЗ №120?

- A.** Промити очі водою і закапати в них 30% розчин альбуциду
- B.** Промити очі 0,02% розчином фурациліну
- C.** Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу
- D.** Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію
- E.** Промити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти

**53.** Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні пінисті виділення з неприєм-

ним запахом. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Трихомоніаз
- B.** Кандидоз
- C.** Хламідіоз
- D.** Гонорея
- E.** Мікоплазмоз

**54.** Медсестринська діагностика перфоративної виразки шлунку базується на таких головних ознаках (тріада Мондора):

- A.** "Кинджальний" біль, "дошкоподібний" живіт, виразковий анамнез
- B.** Нудота, блювання, затримка випорожнення
- C.** Глобний біль, запаморочення, загальна слабкість
- D.** Кровотеча, зяяння країв рани, порушення функції
- E.** Зниження АТ, тахікардія, втрата свідомості

**55.** Пацієнтка 18-ти років надійшла до гінекологічного відділення з імовірним діагнозом порушеної позаматкової вагітності. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу необхідно застосувати?

- A.** Пункція черевної порожнини через задне склепіння піхви
- B.** Біопсія
- C.** Взяття мазка на кольпоцитологію
- D.** Гістеросальпінгографія
- E.** Кольпоскопія

**56.** Пацієнт 45-ти років звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: різкий головний біль, запаморочення, миготіння "мушок" перед очима. АТ-180/100 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Для якого стану характерні такі ознаки?

- A.** Гіпертонічний криз
- B.** набряк легенів
- C.** Інфаркт міокарду
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Напад стенокардії

**57.** Пацієнт 42-х років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

- A.** Дицинон
- B.** Диклофенак
- C.** Дипіридамол
- D.** Димедрол
- E.** Дилтіазем

**58.** Хворий 32-х років зловживає алкоголем. Після чергового запою вночі він



розбудив дружину і зі страхом заявив, що в кімнаті багато мишей і пацюків. Один з них чоловічим голосом запросив його випити. Який це розлад психіки?

- A. Алкогольний делірій
- B. Алкогольний галюциноз
- C. Алкогольний параноїд
- D. Корсаківський психоз
- E. -

59. До медичної сестри звернувся хворий 35-ти років зі скаргами на болі в литкових м'язах під час ходіння, які зникають після відпочинку, мерзлякуватість стоп. Тривалий час працював на півночі, палить. Об'єктивно: шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація тильних артерій стоп різко ослаблена. Що можна припустити у хворого?

- A. Облітеруючий ендартеріїт
- B. Гострий тромбоз підколінної артерії
- C. Тромбофлебіт глибоких вен гомілки
- D. Варикозна хвороба
- E. Міозит литкових м'язів

60. Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних розчинів. Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігаються:

- A. Не більше 10 діб
- B. Не більше 3 діб
- C. Не більше 2 діб
- D. Не більше 7 діб
- E. Не більше місяця

61. У дворічної дитини гостро розвився набряк по всьому тулубу. АТ- 120/80 мм рт.ст. Діурез знижений. Вміст білку в сечі 4,5%, мікрогематурія. Для якого захворювання характерні такі проблеми?

- A. Гострий гломерулонефрит, нефротична форма
- B. Гострий панкреатит
- C. Ізольований сечовий синдром
- D. Пієлонефрит
- E. Хронічна ниркова недостатність

62. Швидкою допомогою до лікарні доставлено пацієнта П. 50-ти років зі скаргами на біль у животі, блювання після вживання алкоголю. При обстеженні виявлено високий показник діастази в аналізі сечі. Про яке захворювання свідчать ці дані?

- A. Гострий панкреатит
- B. Жовчнокам'яна хвороба
- C. Гострий холецистит
- D. Гострий апендицит
- E. Проривна виразка шлунку

63. У пацієнтки 54-х років, яка хворіє на цукровий діабет, раптово виникли загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який з препаратів медсестра повинна підготувати?

- A. 40% розчин глюкози
- B. 0,9% розчин хлориду натрію
- C. Інсулін
- D. Кордіамін
- E. Строфантин

64. На першому етапі диспансеризації проводиться групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії компенсації?

- A. III
- B. I
- C. II
- D. IV
- E. V

65. Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски. Вкажіть термін захисної дії маски:

- A. 3 години
- B. 2 години
- C. 1 година
- D. 4 години
- E. 5 годин

66. Ви проводите медсестринське обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він у стані непритомності, з носа та вух витікають ліквор і кров. Про що свідчать перераховані вище симптоми?

- A. Перелом основи черепа
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Перелом носу
- D. Перелом щелепи
- E. Носова кровотеча

67. Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі?

- A. Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку
- B. Після сніданку та ввечері
- C. Один раз після обіду
- D. Після ранкового туалету
- E. Три рази на день

68. Медична сестра під час нічного чергування доглядала за дитиною, яка хворіє на ГРВІ. Вночі стан дитини різко погіршився. З'явилися симптоми, які є характерними для стенозу гортані. Вкажіть ці симптоми:

- A.** Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка
- B.** Спастичний кашель, апное
- C.** Блювання та температура до 39, 8°C
- D.** Зниження АТ, брадикардія
- E.** Задишка експіраторного характеру

**69.** Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- A.** Загальнорівномірнорозвужений таз
- B.** Поперечнозвужений таз
- C.** Косозміщений таз
- D.** Плаский таз
- E.** Звужений таз

**70.** Під час проведення огляду жінки в дзеркалах медична сестра встановила, що шийка матки має конічну форму, зовнішнє вічко - круглу форму. Для якого стану шийки матки це характерно?

- A.** Шийка матки жінки, що не народжувала
- B.** Шийка матки вагітної
- C.** Шийка матки породіллі
- D.** Стан шийки матки після електрокоагуляції
- E.** Шийка матки жінки, що народжувала

**71.** Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що перебуває на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила?

- A.** II
- B.** IV
- C.** V
- D.** I
- E.** III

**72.** У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у пацієнта Р. 40 років виявлено педикульоз. Який дезінсекційний засіб варто застосувувати?

- A.** Педилін
- B.** 5% борну мазь
- C.** 0,1% розчин дезоксону
- D.** 10% розчин оцтової кислоти
- E.** 2% розчин натрію гідрокарбонату

**73.** Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з іррадіацією у сечоводи, що виник після падіння з висоти. Які основні скарги хворого дозволяють припустити у пацієнта пошкодження нирок?

- A.** Кров у сечі
- B.** Часте сечовипускання
- C.** Гній у сечі
- D.** Утруднене сечовипускання
- E.** Самовільне виділення сечі

**74.** Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, спотворення смаку, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів і волосся. Протягом останніх 10 років хворіє на хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією. Для якого захворювання найбільш характерна дана клінічна картина?

- A.** Залізодефіцитна анемія
- B.** Постгеморагічна анемія
- C.** Гемолітична анемія
- D.** В<sub>12</sub>-дефіцитна анемія
- E.** Гіпопластична анемія

**75.** У дитини, що перенесла внутрішньочерепну пологову травму, розпочалися судоми. Медична сестра для зняття судом повинна застосувати першочергово:

- A.** Седуксен
- B.** Анальгін
- C.** Димедрол
- D.** Парацетамол
- E.** Спазмалгон

**76.** Під час патронажу дитини, яка народилася 5 днів тому, медична сестра помітила легкий акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини в перші місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба може бути у дитини?

- A.** Природжена вада серця
- B.** Пневмонія
- C.** Спазмофілія
- D.** Рахіт
- E.** Асфіксія

**77.** Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. За словами оточуючих, перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Рс- 90/хв., ЧДР- 16/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A.** Струс головного мозку
- B.** Забій головного мозку
- C.** Здавлення головного мозку
- D.** Перелом основи черепа
- E.** Перелом склепіння черепа

**78.** При відвідуванні хворої дитини 3-х років медсестра виявила наступне: температура тіла 38, 3°C, геморагічний висип з елементами зіркоподібної форми на тілі, блювота, ригідність м'язів потилиці. Яке

захворювання можна припустити?

- A.** Менінгококцемія
- B.** Геморагічний васкуліт
- C.** Тромбоцитопенічна пурпура
- D.** Туберкульозний менінгіт
- E.** Гострий лейкоз

**79.** Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?

- A.** Експіраторна задишка
- B.** Інспіраторна задишка
- C.** Біль в грудній клітці
- D.** Сухий кашель
- E.** Підвищення температури тіла

**80.** Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатися, підняти голову та верхні і нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт?

- A.** Пасивне
- B.** Вимушене
- C.** Вимушене пасивне
- D.** Активне
- E.** Вимушене активне

**81.** Дільнична медсестра прийшла на активний патронаж до новонародженої дитини 10-ти днів. На шкірі з'явилася пітниця. Які симптоми вказують на це?

- A.** Дрібні, червоного кольору висипи на обличчі та грудях
- B.** Блідість шкіри
- C.** Акроціаноз
- D.** Гіперемія в складках
- E.** Затруднене носове дихання

**82.** Пацієнтка 35-ти років, продавець, скаржиться на набряк гомілок, швидку втомлюваність. При огляді і пальпації спостерігається гіперпигментація шкіри гомілок, звивисті, ущільнені варикозно розширені вени з вузлами, які виступають над поверхнею шкіри. Дайте медсестринські рекомендації хворій:

- A.** Носити еластичні панчохи
- B.** Накладати зігріваючий компрес
- C.** Приймати антибіотики
- D.** Проходити фізіотерапевтичні процедури
- E.** Змащувати індометациновою маззю

**83.** Жінці 32-х років після стаціонарного лікування з приводу загострення хронічного пієлонефриту лікар призначив десятиденний курс фітотерапії з метою профілактики рецидивів та закріплення

результатів медикаментозного лікування. Реакція сечі лужна. Збір яких лікарських трав слід порадити вживати пацієнтці?

- A.** Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка
- B.** Трава звіробою, листя кропиви, ромашка
- C.** Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка
- D.** Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка
- E.** Ягоди чорниці, корінь алтеї, шавлія

**84.** Пацієнт 35-ти років внаслідок ДТП отримав травму обличчя та волосистої частини голови. Об'єктивно: кровотеча з правої лицевої артерії. Вкажіть місце пальцевого притиснення для зупинки кровотечі:

- A.** Під кутом нижньої щелепи справа
- B.** Середина переднього краю кивального м'яза
- C.** Над ключицею справа
- D.** Сконева ділянка голови
- E.** Ділянка перенісся

**85.** З метою дотримання правил безпечного лікарняного середовища для запобігання опіків пацієнтів у стаціонарі медсестра повинна здійснювати наступні застережні заходи:

- A.** Перевірити температуру грілок, гарячих компресів, води у ванні, перш ніж проводити відповідні процедури
- B.** Прибирати від пацієнтів токсичні речовини
- C.** Супроводжувати пацієнтів на процедури
- D.** Зберігати препарати в недоступних для пацієнтів місцях
- E.** Не використовувати теплих і гарячих розчинів

**86.** Пацієнт 40-ка років скаржиться на різкі нападopodobні болі стріляючого характеру в ділянці верхньої щелепи зліва. Напади виникають при розмові, жуванні, чищенні зубів. При обстеженні - різка болючість при пальпації в ділянці верхньої щелепи. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A.** Невралгія трійчастого нерва
- B.** Фронтит
- C.** Отит
- D.** Гайморит
- E.** Карієс

**87.** Хворому 70-ти років струминно швидко перелили 750 мл консервованої одної групної крові. Під кінець гемотрансфузії у хворого з'явилися утруднене дихання,

відчуття "важкості в грудях", біль у ділянці серця, ціаноз. Артеріальний тиск став різко знижуватися, пульс - аритмічний. Яке ускладнення виникло в хворого?

- A.** Гостре розширення серця
- B.** Пірогенна реакція
- C.** Гемотрансфузійний шок
- D.** Геморагічний шок
- E.** Анафілактична реакція

**88.** Дитина 6-ти місяців перебуває на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення температури тіла до  $37,5^{\circ}\text{C}$ , блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 разів на добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему:

- A.** Ексикоз
- B.** Блювання
- C.** Гіпертермія
- D.** Судоми
- E.** Діарея

**89.** Пацієнт 52-х років надійшов до палати інтенсивної терапії з імовірним інфарктом міокарда. Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні препарати. Виконуючи призначення лікаря, медична сестра в першу чергу введе такі препарати:

- A.** Фентаніл з дроперидолом
- B.** Дигоксин, піпільфен
- C.** Нітрогліцерин, гепарин
- D.** Ампіцилін, гентаміцин
- E.** Верапаміл, курантил

**90.** За призначенням лікаря медична сестра ввела пацієнту 40-ка років олійний розчин камфори підшкірно. Даний розчин не був попередньо підігрітий. Яке імовірне ускладнення може виникнути?

- A.** Інфільтрат
- B.** Олійна емболія
- C.** Гематома
- D.** Крововилив
- E.** Абсцес

**91.** Пацієнт 63-х років чотири тижні тому потрапив до нейрохірургічного відділення після тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий ліжковий режим. Об'єктивно: в ділянці лопаток, хребта, ліктів та п'яток спостерігається неглибоке порушення цілісності шкіри, стійка гіперемія, відшарування епідермісу, намокання. Який засіб необхідно застосувати для обробки шкіри в уражених місцях?

- A.** 5% розчин калію перманганату
- B.** Змащування 40% розчином етилового спирту
- C.** Змащування 70% розчином етилового спирту
- D.** 1% розчин брильянтового зеленого
- E.** Саліциловий спирт

**92.** Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої реанімації одним реаніматором:

- A.** 2:15
- B.** 2:12
- C.** 1:5
- D.** 1:10
- E.** 2:10

**93.** У хворого внаслідок критичного зниження температури розвинувся колапс. Який з препаратів Ви введете хворому?

- A.** Кордіамін
- B.** Еуфілін
- C.** Папаверин
- D.** Корглікон
- E.** Димедрол

**94.** Дитині 3 місяці, перебуває на грудному вигодовуванні. Мати звернулася до медичної сестри зі скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють припустити:

- A.** Недогодовування
- B.** Перегодовування
- C.** Кишковий токсикоз
- D.** Просту диспепсію
- E.** Парентеральну диспепсію

**95.** У роділлі 30-ти років треті термінові пологи. Пологова діяльність почалася 4 години тому після вилиття навколоплідних вод. Перейми різко болючі, є набряк зовнішніх статевих органів, кров'янисті виділення зі статевої щілини. Матка має форму "пісочного годинника", голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 140 ударів у хвилину, ритмічне. Яку патологію можна припустити у роділлі?

- A.** Загроза розриву матки
- B.** Слабкість пологової діяльності
- C.** Передвісники пологів
- D.** Загроза гіпоксії плода
- E.** Розрив матки

**96.** Жінка 24-х років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності?

- A.** Визначення частин плоду
- B.** Зміна смаку
- C.** Пігментація шкіри обличчя
- D.** Припинення менструації
- E.** Збільшення матки

**97.** Хворого вкусила бджола в праве плече і він звернувся до медсестри зі скаргами на набряк обличчя та свербіння в місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому?

- A.** Прикласти міхур з льодом до місця укусу, ввести супрастин в/м
- B.** Ввести 50% розчин анальгін
- C.** Обробити розчином йодонату
- D.** Накласти пов'язку з фурациліном
- E.** Прикласти грілку до місця укусу

**98.** У хворого скарги на звуження поля зору з внутрішньої сторони. Яким методом можна визначити межі поля зору?

- A.** Периметрії
- B.** Візометрії
- C.** Тонометрії
- D.** Кампіметрії
- E.** Офтальмоскопії

**99.** Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт.ст. Дана картина дозволяє припустити:

- A.** Гострий напад глаукоми
- B.** Гострий іридоцикліт
- C.** Повзучу виразку рогівки
- D.** Метагерпетичний кератит
- E.** Кератокон'юнктивіт

**100.** Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 8-ми днів, мати поскаржилася на те, що у неї мало молока і дитина не витримує 3-х годинні перерви між годуваннями, зцідити молоко після годування не вдається. Ви порекомендуєте матері:

- A.** Провести контрольне годування
- B.** Провести водно-чайну паузу
- C.** Частіше брати дитину на руки
- D.** Зменшити час між годуваннями
- E.** Збільшити кількість годувань

**101.** У хворого 50-ти років раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює у внутрішню поверхню стегна, біль при сечовипусканні. Ці ознаки характерні для:

- A.** Ниркова колька
- B.** Гострий апендицит
- C.** Печінкова колька
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Гострий холецистит

**102.** Пацієнт скаржиться на часті носові кровотечі, болі в правому підребір'ї, втрату апетиту. При огляді - іктеричність шкіри та слизових, судинні "зірочки", на передній черевній стінці - "голова медузи". Яку патологію можна припустити?

- A.** Цироз печінки
- B.** Виразкова хвороба
- C.** Холецистит
- D.** Вірусний гепатит
- E.** Коліт

**103.** Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плеврити. Турбують інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення болю?

- A.** На правому боці
- B.** На лівому боці
- C.** З припіднятим головним кінцем ліжка
- D.** З припіднятими ногами
- E.** На спині з припіднятим головним кінцем ліжка

**104.** Пацієнта 45-ти років прооперовано з приводу раку правої легені. Здійснена операція - пульмонектомія, налагоджено пасивне дренування плевральної порожнини. Який з дренажів плевральної порожнини є пасивним?

- A.** Дренаж за методом Бюлау
- B.** Дренаж за допомогою 3-ох ампульної системи
- C.** Дренаж за допомогою водострумного пристрою
- D.** Дренаж за допомогою електричного пристрою
- E.** Дренаж за допомогою гумового балончика

**105.** Пацієнтка 29-ти років, яка перебуває протягом 3-х останніх років на диспансерному обліку з приводу ревматизму, була викликана медичною сестрою для здійснення комплексу протирецидивних заходів. Вкажіть, який препарат є загальноприйнятим для проведення медикаментозної профілактики ревматизму:

- A.** Біцилін-5
- B.** Пеніцилін
- C.** Ампіцилін
- D.** Гентаміцин
- E.** Еритроміцин

**106.** Медсестру сільської дільниці викликали до дівчинки 7-ми років з температурою 39, 5°C, остудою, пітливістю, болями у животі та при сечовипусканні. Сеча мутна. Що можна припустити у цієї дитини?

- A.** Пієлонефрит
- B.** Ниркова колька
- C.** Цистит
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Гостра ниркова недостатність

**107.** У дівчинки віком 9-ти років після перенесеної ангіни змінився характер письма, ходи. Об'єктивно: блідість шкіри, задишка, тахікардія, розширення меж серця, летючість артрити. Яке захворювання виникло у дівчини?

- A.** Ревматизм
- B.** Пневмонія
- C.** Вегетосудинна дистонія
- D.** Анемія
- E.** Поліартрит

**108.** Дитина 12-ти років захворіла гостро: температура тіла  $38,0^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль у животі та попереку, дизуричні прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну ангіну. З якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини?

- A.** Загальний аналіз сечі
- B.** Аналіз сечі за Нечипоренком
- C.** Аналіз сечі за Зимницьким
- D.** Посів сечі на стерильність
- E.** Аналіз сечі на цукор

**109.** З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза протягом 4-х місяців забезпечує цей процес?

- A.** Жовте тіло вагітності
- B.** Плацента
- C.** Гіпофіз
- D.** Щитоподібна залоза
- E.** Надниркові залози

**110.** Мати дитини 2-х днів, яка народилася від нормальної вагітності та I фізіологічних пологів, звернулася до медсестри зі скаргою на наявність пухлини на голові у дитини. При огляді: пухлина м'якої консистенції, ознак запалення немає. Яку відповідь має дати медсестра?

- A.** Це набряк підшкірної клітковини
- B.** Це підокісний крововилив
- C.** Краще проконсультуватися у лікаря
- D.** Потрібна консультація хірурга
- E.** Необхідна рентгенографія черепа

**111.** Медичній сестрі необхідно провести психологічну підготовку хворої 48-ми років, яка готується до планової холецистектомії. Пацієнтка нервується, відчуває страх перед майбутньою операцією. Коли краще надати пацієнтці необхідну інформацію?

- A.** Раніше, ніж пацієнтка отримає будь-який седативний препарат
- B.** Одразу після приймання седативного препарату
- C.** Через 2 години після приймання седативного препарату
- D.** Одразу після проведення премедикації
- E.** Через 20-30 хвилин після приймання седативного препарату

**112.** Хворий 24-х років надходить на планову операцію з приводу правосторонньої пахвинної кили. Вкажіть час, впродовж якого медична сестра повинна проводити доопераційне навчання:

- A.** Не більше 24 годин
- B.** Впродовж всього доопераційного періоду
- C.** Впродовж останнього вечора перед операцією
- D.** Впродовж двох годин
- E.** Не менше 48 годин

**113.** У травмпункт звернулася санітарка 42-х років, котра 2 хв. тому отримала травму розбитим склом. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:

- A.** Накладання джгута
- B.** Тампонада рани
- C.** Максимальне згинання в суглобі
- D.** Стискальна пов'язка
- E.** Підвищене положення кінцівки

**114.** Хворий 28-ми років скаржиться на біль у горлі під час ковтання,  $t^{\circ}$  -  $40-41^{\circ}\text{C}$ , проливний піт, біль у серці, задишка. Шкіра бліда, виразково-некротична ангіна, збільшення печінки і селезінки. В аналізі крові: бластні елементи, анемія, підвищена ШОЕ. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A.** Гострий лейкоз
- B.** Хронічний лімфолейкоз
- C.** Хронічний мієлолейкоз
- D.** Анемія
- E.** Гемофілія

**115.** Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- А.** Накладання захисної асептичної пов'язки на рану
- В.** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- С.** Холод на місце травми
- Д.** Імобілізація пошкодженої кінцівки
- Е.** Надання хворому зручного положення

**116.** Ви - медсестра відділення переливання крові. За якої температури Ви будете зберігати консервовану кров?

- А.** Від  $+4^{\circ}\text{C}$  до  $+6^{\circ}\text{C}$
- В.** Від  $0^{\circ}\text{C}$  до  $-6^{\circ}\text{C}$
- С.** Від  $+8^{\circ}\text{C}$  до  $0^{\circ}\text{C}$
- Д.** Від  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $-4^{\circ}\text{C}$
- Е.** Від  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+4^{\circ}\text{C}$

**117.** Хвора С. 35 років перебуває в ендокринологічному відділенні з діагнозом: дифузний токсичний зоб. Лікар призначив їй ЕКГ. Електрод якого кольору їй накладе медсестра на праву руку?

- А.** Червоний
- В.** Чорний
- С.** Жовтий
- Д.** Зелений
- Е.** -

**118.** У породіллі В. 32-х років на 2-гу добу після операції кесаревого розтину з'явилися розлитий біль у животі, підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , гикавка, нудота, блювання. Об'єктивно: при пальпації живіт здутий, напружений, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. При аускультатії: знижена перистальтика кишок. Вкажіть, якому захворюванню відповідає дана клінічна картина?

- А.** Розлитий перитоніт
- В.** Пельвіоперитоніт
- С.** Метроендометрит
- Д.** Тромбофлебіт вен таза
- Е.** Непрохідність кишок

**119.** В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками на гомілкях. У який спосіб медсестра повинна транспортувати його до відділення?

- А.** На кріслі-каталці
- В.** Повільно пішки у супроводі медсестри
- С.** На ношах
- Д.** На каталці
- Е.** Повільно пішки у супроводі двох санітарок

**120.** Ви працюєте перев'язувальною сестрою хірургічного відділення. Хворого з якою патологією з перерахованих нижче слід запросити до перев'язувальної першим?

- А.** Ліпома спини
- В.** Абсцес плеча
- С.** Карбункул шиї
- Д.** Остеомієліт
- Е.** Панарицій

**121.** Утопленого чоловіка 48-ми років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перерахованих ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- А.** Звуження зіниць
- В.** Підвищення артеріального тиску
- С.** Прискорення пульсу
- Д.** Сповільнення пульсу, часте дихання
- Е.** Прискорення дихання

**122.** Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість у дрібних суглобах кистей рук, неможливість самообслуговування, загальну слабкість. При огляді: кисті рук у вигляді "ластів моржа". Яка проблема є пріоритетною?

- А.** Нemoжливість самообслуговування
- В.** Ранкова скутість у суглобах
- С.** Деформація суглобів
- Д.** Загальна слабкість
- Е.** -

**123.** До гінекологічного відділення надійшла пацієнтка з імовірним раком ендометрію. Вкажіть найдоцільніший метод дослідження для підтвердження діагнозу:

- А.** Діагностичне вишкрібання слизової оболонки матки
- В.** Мазок на цитологію
- С.** Ультразвукове дослідження
- Д.** Бактеріоскопічне дослідження
- Е.** Рентгенологічне дослідження

**124.** До гінекологічного відділення надійшла дівчина 16-ти років з діагнозом ювенільна маткова кровотеча. Медична сестра за призначенням лікаря ввела окситоцин, вікасол. Які лікарські рослини можна використати для зупинки кровотечі?

- А.** Настоянка кропиви
- В.** Настоянка календули
- С.** Настоянка елеутерокока
- Д.** Настоянка валеріани
- Е.** Настоянка глоду

**125.** При обстеженні пацієнтки діагностовано кольпіт. Яка основна проблема в даному випадку?

- A.** Гнійні виділення
- B.** Підвищення температури тіла
- C.** Лихоманка
- D.** Кровотеча
- E.** Біль внизу живота

**126.** Вагітна М., 31-32 тижні вагітності, надійшла зі скаргами на появу безболісної кровотечі зі статевих шляхів. Об'єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ-100/60 мм рт.ст., Рс- 86/хв. Кровотеча зі статевих шляхів. При УЗД - край плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна картина характерна для:

- A.** Передлежання плаценти
- B.** Самовільний викидень
- C.** Ризик передчасних пологів
- D.** Відшарування плаценти
- E.** Рак шийки матки

**127.** Медсестру викликали в палату до пацієнтки, у якої почалася кровотеча з варикозної виразки у ділянці нижньої третини лівої гомілки. Пацієнтка налякана, скаржиться на слабкість. Вкажіть незалежні втручання медичної сестри:

- A.** Накласти стискальну пов'язку
- B.** Накласти артеріальний джгут
- C.** Накласти венозний джгут
- D.** Викликати лікаря
- E.** Виміряти пульс та артеріальний тиск

**128.** До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювання вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно застосувати для підтвердження вагітності?

- A.** Дворучне піхвове дослідження
- B.** Чотири прийоми Леопольда
- C.** Визначення ВСДМ
- D.** Аналіз крові
- E.** Зважування жінки

**129.** Вкажіть потенційну проблему, яка може виникнути у пацієнта з паралічем:

- A.** Ризик виникнення пролежнів
- B.** Головний біль
- C.** Біль за грудиною
- D.** Нудота
- E.** Біль в ділянці епігастрію

**130.** При відвідуванні хворого, який перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні проблеми: сухість і свербіж шкіри, зниження апетиту, нудоту, біль в епігастрії. Шкіра бліда зі слідами розчухів; запах аміаку з рота. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- A.** Хронічна ниркова недостатність
- B.** Хронічний пієлонефрит
- C.** Гостра ниркова недостатність
- D.** Сечокам'яна хвороба
- E.** Гострий гломерулонефрит

**131.** У гінекологічне відділення доставлено жінку зі скаргами на гострий біль внизу живота, запаморочення; затримка менструації - 2 місяці. Хвора бліда, АТ-90/50 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Симптоми подразнення очеревини позитивні, матка дещо збільшена, додатки зліва збільшені, болючі, заднє склепіння нависає, болісне. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?

- A.** Позаматкова вагітність
- B.** Апоплексія яєчника
- C.** Апендицит
- D.** Хронічний аднексит
- E.** Перекрути ніжки кістоми

**132.** До стаціонарного відділення надійшла пацієнтка з діагнозом: ревматоїдний артрит в стадії загострення. Скаржиться на сильний біль у суглобах, підвищення температури тіла, пітливість. Суглоби припухлі, деформовані, шкіра навколо суглобів почервоніла. Пацієнтка не може поворухнутися без болю. Що повинна зробити медсестра, щоб зменшити біль у суглобах?

- A.** Надати зручного положення в ліжку
- B.** Забезпечити прийом ліків за призначенням лікаря
- C.** Забезпечити проведення електрофорезу
- D.** Зробити масаж суглобів
- E.** -

**133.** Який препарат вводиться першим при гіпотонічній кровотечі в ранньому післяпологовому періоді?

- A.** Окситоцин
- B.** Ензапрост
- C.** Вікасол
- D.** Амінокапронова кислота
- E.** Дицинон

**134.** У дитини 3-х років вночі з'явився гавкаючий кашель, задишка. Спостерігається утруднення вдиху, блідість шкіри з синюшним відтінком, напруження шийних вен та м'язів. Якими будуть першочергові втручання медсестри?



- A.** Паро-кисневі інгаляції
- B.** Мікстура від кашлю
- C.** Внутрішньовенно глюкоза з кокарбоксілазою
- D.** Ввести беротек та сальбутамол
- E.** Ввести літичну суміш

**135.** Наявними проблемами пацієнта з клінічними ознаками атеросклерозу мозкових артерій є:

- A.** Частий біль голови, погіршення пам'яті
- B.** Біль голови, зниження АТ
- C.** Слабкість, підвищення температури
- D.** Біль голови, набряки ніг
- E.** Біль в ділянці серця, запаморочення

**136.** Медсестра здійснює догляд за пацієнткою, яка стоїть на обліку з приводу міоми з субмукозним ростом вузлів. Найбільш поширеним ускладненням є:

- A.** Маткові кровотечі, анемізація
- B.** Больовий синдром
- C.** Безпліддя
- D.** Кахексія
- E.** Збільшення маси тіла

**137.** Ви - сімейна медсестра, здійснюєте догляд за пацієнтом з гострим бронхітом. Лікар призначив відхаркувальний та бронхолітичний препарати. Який найдоцільніший шлях введення даних лікарських засобів?

- A.** Перорально
- B.** Внутрішньом'язево
- C.** Ректально
- D.** Сублингвально
- E.** Ендотрахеально

**138.** Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- A.** План догляду за пацієнтом
- B.** Історію хвороби
- C.** Листок медсестринського обстеження пацієнта
- D.** Листок оцінки якості догляду
- E.** Карту спостереження за хворим

**139.** У дитини 6-ти місяців суха шкіра, волосся ламке, при обстеженні виявлено систолічний шум на верхівці серця і тахікардія. В загальному аналізі крові показники гемоглобіну складають 100 г/л. Для лікування анемії дитині цього віку доцільно призначити:

- A.** Актиферин
- B.** Ферум-лек
- C.** Реосорбілакт
- D.** Метилпреднізолон
- E.** Сорбекс

**140.** Ви - медсестра міської поліклініки, проводите обстеження пацієнта з хронічним бронхітом. Яку медичну документацію слід заповнити на диспансерного хворого?

- A.** Контрольну карту диспансерного спостереження (ф. 030/о)
- B.** Термінове повідомлення про інфекційне захворювання (ф. 058/о)
- C.** Статистичний талон (ф. 025-2/о)
- D.** Статистичну карту вибулого зі стаціонару (ф. 066/о)
- E.** Медичну карту амбулаторного хворого (ф. 025/о)

**141.** Хворому через катетер у підключичну вену переливається однорупна реуз-сумісна донорська кров, консервована цитратом натрію. Наприкінці гемотрансфузії у хворого з'явилися занепокоєння, блідість шкіри, тахікардія, судоми м'язів. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A.** Цитратний шок
- B.** Анафілактичний шок
- C.** Опіковий шок
- D.** Геморагічний шок
- E.** Больовий шок

**142.** В терапевтичному відділенні лікується пацієнт Л. 39 років з хронічним колітом. Від яких чинників буде залежати стан пацієнта при проведенні медсестринського процесу?

- A.** Взаємодії медичної сестри і пацієнта
- B.** Взаємодії медсестри і старшої медсестри
- C.** Професіоналізму медичної сестри
- D.** Взаємодії медсестри і родичів пацієнта
- E.** Взаємодії медсестри і лікаря

**143.** До приймального відділення доставлено хворого з ножовим пораненням грудної клітки, відкритим пневмотораксом. Які незалежні втручання виконає медсестра при наданні невідкладної допомоги хворому?

- A.** Накладе оклюзійну пов'язку
- B.** Накладе асептичну пов'язку
- C.** Накладе пов'язку з перекисом водню
- D.** Накладе стискальну пов'язку
- E.** Накладе пов'язку з фурациліном

**144.** На профілактичному огляді в школі при вимірюванні антропометричних

показників у підлітка виявили масу тіла 86 кг, зріст 161 см. Визначте медсестринський діагноз:

- A.** Порушене харчування: більше за потреби організму
- B.** Порушене харчування: менше за потреби організму
- C.** Надлишок об'єму рідини
- D.** Порушений образ тіла
- E.** Порушена самооцінка

**145.** Медична сестра, пояснюючи пацієнту принципи і режим раціонального харчування, звернула його увагу на те, що останній прийом їжі має бути не пізніше ніж:

- A.** За 2-2,5 години до сну
- B.** За 0,5 годин до сну
- C.** За 1 годину до сну
- D.** За 1,5 години до сну
- E.** За 4 години до сну

**146.** До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носу, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4x3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

- A.** Нейрохірургічне
- B.** Неврологічне
- C.** Хірургічне
- D.** Терапевтичне
- E.** Діагностичне

**147.** Дитина 2-х місяців стала неспокійною, часто здригається, порушився сон, з'явилася підвищена пітливість, особливо волосяної частини голови, облісіння

потилиці. Ознаками якого захворювання є дані проблеми?

- A.** Рахіт
- B.** Туберкульоз
- C.** Спазмофілія
- D.** Вегетосудинна дистонія
- E.** Гіпотрофія

**148.** Дитина 3-х років з ознаками зневоднення перебуває в інфекційному відділенні. Вкажіть препарати для проведення оральної регідратації:

- A.** Регідрон, 5% р-н глюкози
- B.** Альбумін, гепарин
- C.** Дімедрол, анальгін
- D.** Еуфілін, норадреналін
- E.** Гідрокортизон

**149.** Хворому на стенокардію лікар призначив нітрогліцерин. Про який можливий побічний ефект повинна попередити пацієнта медсестра при застосуванні даного препарату?

- A.** Біль голови, легке запаморочення
- B.** Серцебиття
- C.** Сухість у роті
- D.** Металевий присмак у роті
- E.** Зниження слуху

**150.** З чого починають обстеження передміхурової залози для встановлення діагнозу?

- A.** Пальцеве обстеження
- B.** Колоноскопія
- C.** Ректороманоскопія
- D.** УЗД передміхурової залози
- E.** Сканування передміхурової залози

## **НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ**

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК М. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА.**

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.  
(Українською мовою).

Підписано до друку 08.04/№101. Формат 60x84 1/8  
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Суг. Друк офсет.  
Ум.друк.арк. 16. Облік.вид.арк. 20.  
Тираж. (6168 прим. – укр. мова).

<b>Б</b>		кисень	кислород	привушний	околоушный
багатоплідний	многоплодный	клеочучий	клокочущий	променевиий	лучевой
бешиха	рожа	ковтанья	глотание	променезопа'ястковий	лучезапястный
білизна	бельё	крейда	мел	пухирець	пузырёк
блювання	рвота	крижі	крестец	пухлина	опухоль
бловотний	рвотный	кровотеча	кровотечение	<b>Р</b>	
бовтанка	болтушка	кроповий	укропный	раптово	внезапно
<b>В</b>		кукса	культя	ризик	риск
вагітність	беременность	кульгавість	хромота	рідина	жидкость
вада	порок	<b>Л</b>		рідкий	жидкий
вантажівка	грузовик	литковий	икроножний	рогівка	роговица
вапно	известь	лоно	лобок	родзинки	изюм
вигодовування	вскармливание	лусочка	чешуйка	роділля	роженица
викидень	выкидыш	<b>М</b>		розпал	разгар
вимога	требование	марення	бред	розпитування	расспрос
вимушений	вынужденный	мета	цель	розтин	сечение
випинання	выпячивание	метушитись	суетиться	рукавичка	перчатка
випорожнення	испражнения	мигдалик	миндалина	рідина	жидкость
витрішкуватість	пучеглазие	миготливий	мерцательный	рух	движение
вишкрібання	выскабливание	міхур	пузырь	<b>С</b>	
вівчак, вовчак	волчанка	млявий	вялый	свербіж, сверблячка	зуд
відвар	отвар	<b>Н</b>		сеча	моча
відволікаюча	отвлекающая	набряк	отёк	сечовід	мочеточник
відмова	отказ	надмірний	избыточный	сечогінний	мочегонный
відраза	отвращение	напруга	напряжение	сир	творог
відшарування	отслойка	натискування	нажатие	сироподібний	творожистый
вірогідний	достоверный	натще	натощак	сідниця	ягодица
вічко	зев	нашарування	наслоение	склепіння	свод
власний	собственный	негативний	отрицательный	скутість	скованность
вогнище	очаг	нежить	насморг	смак	вкус
вологий	влажный	нездужання	недомогание	смоктання	сосание
воротар	привратник	необґрунтований	необоснованный	соняшниковий	подсолнечный
втома	усталость	непритомність	потера сознания	спадковість	наследственность
втомлюваність	утомляемость	нирка	почка	спрага	жажда
втручання	вмешательство	ноші	носилки	сприяти	способствовать
вузловий	узловой	нудота	тошнота	статевий	половой
вузол	узел	<b>О</b>		статура	телосложение
<b>Г</b>		обробка	обработка	стегно	бедро
гавкаючий	лающий	обличчя	лицо	стиснення	сдавление
годування	кормление	облік	учёт	стрімкий	стремительный
голка	иголка	ознака	признак	струм	ток
гомілка	голень	окістя	надкостница	струминний	струйный
горб	бугор	оперізуочий	опоясывающий	струс	сотрясение
гумовий	резиновый	опік	ожог	судоми	судороги
<b>Д</b>		осередок	очаг	сумісність	совместимость
дільничий	участковый	особистий	личный	суміш	смесь
догляд	уход	оцет	уксус	сутінковий	сумеречный
дозволений	разрешённый	очеревина	брюшина	<b>Т</b>	
дотримання	соблюдение	<b>П</b>		терміновий	экстренный
<b>З</b>		паління	курение	тиждень	неделя
забій	ушиб	пахвинний, паховий	паховый	тиск	давление
загартовування	закаливание	пахвовий	подмышечный	травний	пищеварительный
загосння	заживление	пекучий	жгучий	тривалий	длительный
задишка	одышка	передміхуровий	предстательный	<b>У</b>	
заклякання	окоченение	перейми	схватки	усунення	устранение
закреп	запор	переконати	убедить	ущільнення	уплотнение
залишковий	остаточный	переміжний	перемежающийся	<b>Х</b>	
залізо	железо	перенісся	переносица	харкотиння	мокрота
залоза	железа	північ	север	харчування	питание
занурювати	погружать	півнячий	петушиный	хода	походка
запалення	воспаление	підгузок	подгузник	хребет	позвоночник
запаморочення	головокружение	піднебіння	нёбо	<b>Ц</b>	
засіб	средство	підсумковий	итоговый	цукор	сахар
затерпність	онемение	піногасники	пеногасители	цукровий	сахарный
заходи	мероприятия	піхва	влагалище	<b>Ч</b>	
зважування	взвешивание	плесканий	плоский	чадний	угарный
звивистий	извитой	повідомлення	извещение	черговий	дежурный
зволжениий	увлажнённый	повіко	веко	чергування	дежурство
зворотній	обратный	позаматковий	внематочный	черевний	брюшной
здухвинний	подвздошный	пологовий	родовой	<b>Ш</b>	
зіниця	зрачок	пологовий будинок	роддом	шар	слой
зірочка	звёздочка	полум'я	пламя	шлунок	желудок
знепритомніти	потерять сознание	полуниця	клубника	штучний	искусственный
зомління	обморок	поперек	поясница	<b>Щ</b>	
зсілий	свернувшийся	породілля	родильница	щелепа	челюсть
зупинка	остановка	посіпування	подергивание	щеплення	прививка
<b>К</b>		потилиця	затылок	щур	крыса
кавовий	кофейный	поточний	текущий	<b>Я</b>	
каламутний	мутный	правець	столбняк	ядуха	удушьє
калітка	мошонка	прибирання	уборка	ясна	дёсна