

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

ID студента						Прізвище					

Варіант _____

Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

Крок М

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА



ІНСТРУКЦІЯ

Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.

ББК 54.1я73
УДК 61

Автори тестових завдань: Алексеенко О.І., Аленіч О.І., Амелін П.М., Амеліна Л.О., Андрєєва І.В., Багрій Д.Я., Байдала О.Д., Богданова Н.О., Боднарюк О.І., Бондаренко А.Д., Борейко Л.Д., Вайнагій Т.І., Веклич В.В., Вибіцька О.В., Водяницька О.А., Волощук В.І., Волчок О.М., Гайдуков В.А., Гайдученко І.В., Годованець П.Б., Голубченко Н.К., Гордєєва Є.В., Гошовська А.В., Грабович Ю.В., Грігор'єва І.М., Дацко Л.П., Дем'янова Л.І., Демченко О.К., Дідовська С.О., Діхтяренко А.М., Єфременко Л.М., Зайцева Н.С., Зарянська Н.О., Захарова Т.М., Здиховська Л.Г., Зеленик О.С., Зотова А.В., Іващенко Л.В., Ігнатенко Н.В., Ільїна А.О., Камінська Є.І., Касевич Н.М., Клименко С.М., Коваль Л.А., Коломієць Н.Г., Конькова О.М., Коротєєва І.В., Коротич А.І., Коршенко Г.П., Кривенко В.В., Кудрявцева Т.О., Кузіна А.М., Левіна Ф.І., Лисенко О.М., Лубова Т.Ф., Луговська Т.П., Лук'яненко О.В., Лукач І.Ю., Магас Н.М., Макарова О.В., Малиновська В.С., Марсак І.І., Мельник П.О., Мещерякова Н.Л., Міщук І.М., Могила В.І., Московчук В.І., Назаренко Л.І., Нефедова Г.А., Новицька Л.А., Омеляненко Н.Я., Опаріна Т.М., Пашковська Л.В., Перепічка М.П., Пислар І.А., Піддубна П.І., Піц Л.О., Попадинець І.П., Попова С.М., Попова Т.М., Прачкєвич Л.М., Прищепа О.П., Раїльченко О.І., Рижова Н.О., Родіонова С.М., Романенкова С.В., Романюк Л.Б., Савонік Л.В., Сарапук О.Р., Семеняк А.В., Серєда М.П., Симоненко Л.М., Синкевич Л.Р., Солodka В.О., Сопова Л.О., Суракова С.М., Сходницький І.В., Телефус Н.В., Теплюк Л.Г., Тимошук В.В., Троян А.М., Фармагей Г.В., Фініченко А.К., Хван Н.В., Хомко О.Й., Шапошнікова В.М., Шихальова З.М., Яцишин В.Л. та Комітети фахової експертизи.

Рецензенти. Експерти: Баб'як В.І., Бачинська І.І., Білецька А.Г., Білий О.П., Борейко Л.Д., Бразалій Л.П., Липова О.О., Луценко Н.М., Макаренко Н.Г., Макарова О.В., Максимова В.В., Новицька Л.А., Опошнян С.І., Пасічник О.В., Писанець В.В., Піддубна П.І., Попова А.Г., Рябека Т.І., Сташишин О.С., Харланчук Г.М., Хилько В.О., Шегєдин М.Б.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М. Сестринська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.

Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку медичних сестер.

Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів.

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. У хворого 30-ти років після фізичного навантаження з'явилася кровотеча з носа. Шкірні покриви бліді, пульс частий, артеріальний тиск знижений. Які першочергові дії медичної сестри в даній ситуації?

- A.** Ввести в носовий хід турунду
- B.** Зробити передню тампонаду носа
- C.** Ввести кровоспинні засоби
- D.** Покласти хворого на кушетку
- E.** Зробити задню тампонаду носа

2. В клініку доставлений хворий 25-ти років після ДТП: свідомість і очні рефлекси відсутні. АТ і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних артеріях слабкого наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як слід оцінити стан хворого?

- A.** Агонія
- B.** Преагонія
- C.** Непритомність
- D.** Клінічна смерть
- E.** Колапс

3. На тролейбусній зупинці знайдена людина 40-45 років. Викликана бригада швидкої допомоги. У відповідь на болюче подразнення відкриває очі, при сильному подразненні захисна реакція, при звертанні вимовляє незв'язні слова. Як слід оцінити глибину розладу свідомості у хворого?

- A.** Сопор
- B.** Ясна свідомість
- C.** Приголомшення
- D.** Кома
- E.** Смерть мозку

4. До гінекологічного відділення надійшла жінка 25-ти років з ознаками гострого живота. Остання менструація - два тижні тому. Що можна припустити?

- A.** Апоплексія яєчника
- B.** Позаматкова вагітність
- C.** Некроз фіброматозного вузла
- D.** Сальпінгофорит
- E.** Ерозія шийки матки

5. У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що слід використати при наданні невідкладної допомоги?

- A.** Адреналін
- B.** Анальгін
- C.** Дибазол
- D.** Но-шпа
- E.** Дицинон

6. Для визначення добового діурезу у ді-

тей старше одного року використовують формулу:

- A.** $600+100 \cdot (n-1)$
- B.** $500+100 \cdot (n-1)$
- C.** $600-100 \cdot (n-1)$
- D.** $400+100 \cdot (n-1)$
- E.** $500-100 \cdot (n-1)$

7. Дитина випила 9% розчин оцту. Через кілька хвилин виникло відчуття важкості в епігастрії, нудота, блювання, біль у животі. Який розчин доцільно використати для промивання шлунка у даному випадку?

- A.** 1% розчин гідрокарбонату натрію
- B.** 0,9% розчин хлориду натрію
- C.** Кип'ячену воду
- D.** 10% розчин хлориду натрію
- E.** 5% розчин перманганату калію

8. Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:

- A.** Накладання джгута на кінцівку
- B.** Введення адреналіну підшкірно
- C.** Подачі кисню
- D.** Введення еуфіліну внутрішньовенно
- E.** Введення преднізолону внутрішньовенно

9. Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

- A.** 2 години
- B.** 3 години
- C.** 6 годин
- D.** 24 години
- E.** 48 годин

10. У пацієнтки 43-х років при вагінальному дослідженні виявлено що матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності, щільна, безболісна. Порушень менструального циклу немає. Про який патологічний стан з боку статевих органів можна подумати?

- A.** Фіброміома матки
- B.** Параметрит
- C.** Аднексит
- D.** Гідросальпінкс
- E.** Киста яєчника

11. До медсестри звернулася хвора 40-ка років із проблемами на загальну слабкість, зниження працездатності та бадьорості, погіршення пам'яті, раннє по-

сивіння волосся, зниження еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння:

- А. Передчасне
- В. Сповільнене
- С. Прискорене
- Д. Фізіологічне
- Е. Нормальне

12. Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:

- А. Дихальна гімнастика
- В. Догляд за порожниною рота
- С. Вимірювання тиску
- Д. Профілактику пролежнів
- Е. Зміну білизни

13. На I етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?

- А. Перенесена дизентерія
- В. Нерегулярне харчування
- С. Гіподинамія
- Д. Психоемоційний стрес
- Е. Вживання великої кількості рідини

14. Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використовує:

- А. 0,1% розчин гістаміну
- В. 25% розчин магнію сульфату
- С. 5 ОД пітуїтрину
- Д. 75 ОД інсуліну
- Е. 10% розчин хлориду натрію

15. Медична сестра доглядає хворого з високою температурою. Що вона буде відмічати в третій стадії гарячки?

- А. Пітливість
- В. Підвищений тиск
- С. Рідкий пульс
- Д. Наростання температури
- Е. Блідість шкіри обличчя

16. Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили діету №3. Який із зазначених продуктів **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** включати до харчового раціону?

- А. Бобові
- В. Висівковий хліб
- С. Пісне м'ясо
- Д. Річкова риба
- Е. Копчена ковбаса

17. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- А. Гектична
- В. Неправильна
- С. Ремітуюча
- Д. Хвилеподібна
- Е. Інтермітуюча

18. Палатна медична сестра при догляді за пацієнтом 24-х років на третю добу після операції на травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш імовірну потенційну проблему пацієнта:

- А. Парез кишківника
- В. Заворот кишок
- С. Копростаз
- Д. Кишкова непрохідність
- Е. Перитоніт

19. При перев'язці у похилої жінки почалася кровотеча із виразки гомілки, кров темного кольору, витікає рівномірним струменем. Незалежно втручання медичної сестри до приходу лікаря:

- А. Стискаюча пов'язка
- В. Туга тампонада рани
- С. Накладання затискача на судину
- Д. Накладання судинного шва
- Е. Накладання джгута

20. Дитина 14-ти років хворіє на епідемічний паротит 5-ту добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- А. Орхіт
- В. Гострий цистит
- С. Гострий піелонефрит
- Д. Гостра затримка сечі
- Е. Гідронефроз

21. Здоровій доношеній новонародженій дитині потрібно провести імунопрофілактику туберкульозу. Яку дозу препарату необхідно ввести дитині?

- A.** 0,05 мг вакцини БЦЖ
- B.** 0,1 мг вакцини БЦЖ
- C.** 0,1 мл туберкуліну
- D.** 0,5 мл туберкуліну
- E.** 0,1 мг туберкуліну

22. Дівчинка 7-ми років скаржитись на часте болісне сечовипускання, біль у животі та у поперековій ділянці, підвищення t° до 37,7 $^{\circ}$ C. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки бліді. Сеча каламутна. При мікроскопії осаду сечі: лейкоцити 40-50 в п/з, протеїнурія. На етапі реалізації медсестринських втручань забезпечення якого дієтичного харчування потребує дитина?

- A.** Стіл №5
- B.** Стіл №7
- C.** Стіл №1
- D.** Стіл №9
- E.** Стіл №10

23. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33-х років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?

- A.** Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол
- B.** Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- C.** Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку
- D.** Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру
- E.** Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

24. Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику туберкульозу. Що входить в поняття специфічної профілактики туберкульозу?

- A.** Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопротекторна
- B.** Проведення проби Манту
- C.** Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу
- D.** Подвірні обходи
- E.** Флюорографічне обстеження населення

25. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42-х років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу: 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першочергове медсестринське втручання:

- A.** Промивання шлунка
- B.** Введення спазмолітиків
- C.** Дати випити шлунковий сік
- D.** Заспокоїти пацієнтку, дати теплу грілку
- E.** Дати випити розчин содової води

26. При обстеженні пацієнта 48-ми років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A.** Рак шлунка
- B.** Хронічний гастрит
- C.** Виразкова хвороба шлунка
- D.** Хронічний ентероколіт
- E.** Холецистопанкреатит

27. Пацієнт 42-х років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що приготує медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції?

- A.** Пункційна голка з мандреном
- B.** Катетер
- C.** Розчин камфорного спирту
- D.** Шприць Жане
- E.** Скальпель

28. У пацієнтки 32-х років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити?

- A.** Психомоторне збудження
- B.** Високий ризик суїциду
- C.** Високий ризик травмування
- D.** Статус конвульсивних нападів
- E.** Тривога

29. Пацієнт 42-х років знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20-ти діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта:

- A.** Виникнення пролежнів
- B.** Поява болю у шлунку
- C.** Легенева кровотеча
- D.** Поява сухого кашлю
- E.** Порушення сну

30. Під час обстеження пацієнта 55-ти років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра досліджує пульс. Пульс регулярний, його частота скла-

дає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс?

- А. Тахікардія
- В. Брадикардія
- С. Аритмія
- Д. Напружений
- Е. Повний

31. У потерпілого з рани в нижній третині плеча пульсуючим струменем витікає яскраво-червона кров. Першу допомогу надає медсестра. З чого їй необхідно почати?

- А. Пальцьове притиснення
- В. Введення анальгетиків
- С. Накладання асептичної пов'язки
- Д. Первинна хірургічна обробка рани
- Е. Транспортна іммобілізація

32. Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові реципієнта та донора. Що з переліченого вона готує для їх проведення?

- А. Сироватка реципієнта та кров донора
- В. Кров реципієнта та кров донора
- С. Сироватка реципієнта та сироватку донора
- Д. Кров реципієнта та сироватка донора
- Е. Стандартна сироватка та кров донора

33. Пацієнту 44-х років виконана резекція шлунка. На третю добу після операції турбує відчуття тяжкості в животі, його здуття, гази не відходять. Назвіть незалежне медсестринське втручання в даному випадку:

- А. Введення газовідвідної трубки
- В. Накладання міхура з льодом
- С. Постановка сифонної клізми
- Д. Застосування проносних засобів
- Е. Введення спазмолітиків

34. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на появу свербіжу, особливо вночі, впродовж 3-х днів. Об'єктивно: на шкірі пальців (бічних поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні паховинних ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації, кров'янисті кірочки. Для якого захворювання це характерно?

- А. Короста
- В. Алергічний дерматит
- С. Екзема
- Д. Атопічний дерматит
- Е. Еритразма

35. Жінка 35-ти років, яка проживає у гірському районі, звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на потовщення і тиск в ділянці ший, утруднене ковтання, захриплість голосу, загальну слабкість. Яке захворювання можна запідозрити?

- А. Ендемічний зоб
- В. Дифузний токсичний зоб
- С. Рак щитоподібної залози
- Д. Гіпотиреоз
- Е. -

36. Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 39°C. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ- 120/70 мм рт.ст., Рс- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?

- А. Бактеріологічне дослідження сечі
- В. Загальний аналіз сечі
- С. Загальний аналіз крові
- Д. Аналіз сечі за Зимницьким
- Е. Урографія

37. Пацієнт 46-ти років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах "летючого характеру", який посилюється при рухах, температуру 37,5°C ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- А. Ревматичний артрит
- В. Туберкульозний артрит
- С. Ревматоїдний артрит
- Д. Гонорейний артрит
- Е. Деформуючий остеоартроз

38. Хворий 71-го року поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію можна подумати?

- А. Цироз печінки
- В. Виразкова хвороба
- С. Холецистит
- Д. Вірусний гепатит
- Е. Ентероколіт

39. На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний стискаючий біль за грудниною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хворого, дала під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого

дослідження слід підготувати пацієнта з метою підтвердження діагнозу?

- A.** Електрокардіографія
- B.** Рентгенографія органів грудної клітки
- C.** УЗД серця
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** Біохімічний аналіз крові

40. Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер'ї зліва різана рана 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Накладено оклюзійну пов'язку. Яке її функціональне призначення?

- A.** Герметизація рани
- B.** Захист від інфікування
- C.** Усунення деформації
- D.** Зупинка кровотечі
- E.** Транспортна іммобілізація

41. Пацієнтка 26-ти років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя впродовж останніх трьох років. Статеве життя без контрацепції. З чого потрібно почати обстеження подружньої пари для уточнення причини безпліддя?

- A.** Спермограма чоловіка
- B.** Кольпоскопічне дослідження
- C.** Метросальпінгографія
- D.** Кольпцитологічне дослідження
- E.** Лапароскопічне дослідження

42. Роділля 26-ти років поступила у акушерський стаціонар із нормальною положовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку вагою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A.** Альфельда
- B.** Кюстнера-Чукалова
- C.** Шредера
- D.** Довженка
- E.** Клейна

43. У вагітної 25-ти років, серцебиття плода 130/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:

- A.** І позиція, передній вид, головне передлежання
- B.** ІІ позиція, передній вид, головне передлежання
- C.** І позиція, задній вид, тазове передлежання
- D.** ІІ позиція, задній вид, головне передлежання
- E.** І позиція, передній вид, тазове передлежання

44. Дитина 10-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5°C, порушення загального стану, біль в кістках та суглобах. Під час об'єктивного обстеження виявлено: мигдалики збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, в підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді крапок. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?

- A.** Фолікулярна ангіна
- B.** Кір
- C.** Катаральна ангіна
- D.** Скарлатина
- E.** Дифтерія

45. До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі". Суб'єктивно: почуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення стаціонару?

- A.** На каталці, лежачи
- B.** Самостійно у супроводі медичної сестри
- C.** Самостійно без супроводу
- D.** На кріслі-каталці
- E.** На ношах двома санітарами

46. Хворий 25-ти років з діагнозом: нижньочасткова пневмонія знаходиться на лікуванні в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом'язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?

- A.** Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків
- B.** Попередити пацієнта, що після ін'єкції він повинен поїсти
- C.** Розвести антибіотик дистильованою водою
- D.** Підігріти розчин на водяній бані до 37-38°C
- E.** Розвести антибіотик 2% розчином новокаїну

47. Пацієнту 55-ти років, який лікується в урологічному відділенні, лікар призна-

чив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий метод дослідження?

- A. Цистоскопія
- B. Урографія
- C. Гастродуоденоскопія
- D. Колоноскопія
- E. Іригоскопія

48. Хвора 25-ти років скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A. рН-метрія
- B. Дуоденальне зондування
- C. Копрологічне дослідження
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

49. Хвора 39-ти років скаржиться на гострий, "кинджальний" біль у животі, різку загальну слабкість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Об'єктивно: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A. Перфорація
- B. Шлункова кровотеча
- C. Пенетрація
- D. Малігнізація
- E. Пілоростеноз

50. Пацієнт 63-х років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежне сестринське втручання виконає медсестра?

- A. Тепла грілка на поперекову ділянку
- B. Зігрівальний компрес
- C. Банки
- D. Міхур з льодом
- E. Гірчичники

51. У 67-річного чоловіка під час проведення нейрохірургічної операції з'явилося порушення ритму серця. Фармакологічні засоби якої групи потрібно ввести хворому для нормалізації ритму серця?

- A. Антиаритмічні
- B. Серцеві глікозиди
- C. Гормони
- D. Дихальні аналептики
- E. Антигістаміни

52. До медсестри звернулась жінка, яка отримала 20 хвилин тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра гіперемійована. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?

- A. Промити холодною водою
- B. Накласти мазеву пов'язку
- C. Накласти оцтовий компрес
- D. Покласти грілку
- E. Промити етиловим спиртом

53. Медична сестра з лікарем визначає групу крові за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В. Аглютинація відбулась з цоліклоном анти-В. Яка група крові?

- A. В (III)
- B. 0 (I)
- C. А (II)
- D. АВ (IV)
- E. Помилка при визначенні

54. Медична сестра при огляді півтора-місячної дитини виявила відкрите мале тім'ячко. Дитина від нормально протікаючої доношеної вагітності. Народилася здоровою на грудному вигодовуванні. Вкажіть термін закриття малого тім'ячка у немовлят:

- A. До 3-х місяців
- B. До 1-го місяця
- C. До 2-х місяців
- D. До 6-ти місяців
- E. До 1-го року

55. При антропометричному дослідженні новонародженого хлопчика встановлено такі показники: маса тіла - 3600 г, зріст - 54 см, обвід голови - 42 см, обвід грудної клітини - 34 см. Температура тіла - 36,8°C. Який показник **НЕ ВІДПОВІДАЄ** нормі?

- A. Обвід голови
- B. Зріст
- C. Маса тіла
- D. Обвід грудної клітини
- E. Температура тіла

56. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилася на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схиль-

ність до нестійких випорожнень. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Алергічний діатез
- B.** Анемія
- C.** Гіпотрофія
- D.** Рахіт
- E.** Пітниця

57. Сестринський процес - це продуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?

- A.** Потреба в руховій активності
- B.** Здатність забезпечити свою безпеку
- C.** Кошти, забезпеченість
- D.** Працездатність, задоволення працею
- E.** Знання про здоровий спосіб життя

58. Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, медичній сестрі необхідно провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний засіб для незалежних дій медсестри:

- A.** Шина Крамера
- B.** Шина Дітерікса
- C.** Ватно-марлевий бублик
- D.** Спіральна пов'язка
- E.** Циркулярна пов'язка

59. У хворого гостра масивна крововтрата. Об'єктивно: свідомість збережена, хворий блідий, шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ- 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з частотою 24/хв. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі:

- A.** Колапс
- B.** Непритомність
- C.** Гемотрансфузійний шок
- D.** Кардіогенний шок III ст.
- E.** Анафілактичний шок

60. Під час приймання їжі потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, схопився на ноги, руки судомно охоплюють ший, обличчя синіє і набрякає на очах. Які першочергові дії?

- A.** Застосувати прийом Геймліха
- B.** Здійснити конікотомію
- C.** Проводити штучну вентиляцію легень методом "з рота в рот"
- D.** Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи
- E.** Здійснити трахеотомію

61. Дитина народилася в асфіксії III ступеня важкості, з внутрішньочерепною

пологовою травмою. Раптово розвинувся генералізований судомний синдром. Який препарат, за призначенням лікаря, має ввести медсестра?

- A.** Сибазон
- B.** Парацетамол
- C.** 50% анальгін 0,1 мл
- D.** Дибазол
- E.** Ізотонічний розчин хлориду натрію

62. Ви - медсестра табору відпочинку дітей дошкільного віку, який розташований у лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років укусила оса в ділянці обличчя. Через 30 хвилин дитина почала скаржитись на головний біль, запаморочення, з'явилась задишка. Яку невідкладну допомогу треба надати дитині?

- A.** Застосувати холод на місце укусу та обколоти його 0,1% розчином адреналіну
- B.** Напоїти дитину солодким чаєм
- C.** Ввести в/м 25% розчин магнію сульфату
- D.** Ввести в/м 50% розчин анальгін
- E.** Викликати швидку медичну допомогу і госпіталізувати дитину до лікарні

63. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

- A.** Трахеотомія
- B.** Подання зволоженого кисню
- C.** Відволікальна терапія
- D.** Антигістамінні засоби
- E.** Парові інгаляції

64. До хірургічного відділення доставлено жінку 42-х років з масивною крововтратою. Об'єктивно: Рс- 120/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Який препарат слід застосувати для стабілізації артеріального тиску?

- A.** Розчин поліглюкіну
- B.** Альбумін
- C.** Тромбін
- D.** Розчин натрію хлориду 0,9%
- E.** Розчин 40% глюкози

65. Пацієнт 79-ти років, скаржитись на часте, болюче і утруднене сечовипускання. Лікар провів пальцеве дослідження передміхурової залози та виявив її збільшення. При дослідженні сечового міхура кількість залишкової сечі досягає 500 мл. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A.** Гостра затримка сечі
- B.** Простатит
- C.** Цистит
- D.** Кровотеча
- E.** Уретрит

66. До приймального відділення був доставлений пацієнт після ДТП. Об'єктивно: шкірні покриви з ціанотичним відтінком, задишка, по середньоключичній лінії справа в ділянці V міжребер'я - рана, з якої під час видиху виділяється піниста кров. Який стан може запідозрити медична сестра?

- A.** Відкритий пневмоторакс
- B.** Закритий пневмоторакс
- C.** Клапанний пневмоторакс
- D.** Відкритий перелом ребер
- E.** Закритий перелом ребер

67. У пацієнта 53-х років, який знаходиться на лікуванні в проктологічному відділенні з діагнозом: геморої, після дефекації підсилюються болі в ділянці ануса, на білизні з'явилася свіжа кров. Назвіть першочергові дії медичної сестри:

- A.** Викликати лікаря
- B.** Зробити теплу ванночку з ромашкою
- C.** Зробити холодну ванночку з корою дуба
- D.** Зробити мікроклізму з олією шипшини
- E.** Ввести тампон у пряму кишку

68. У жінки 50-ти років після вживання смаженої їжі та алкоголю з'явився сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, що супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням, яке не приносить полегшення. Про що може подумати медична сестра?

- A.** Гострий панкреатит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Виразкова хвороба шлунка
- D.** Ентероколіт
- E.** Виразковий езофагіт

69. В хірургічному відділенні знаходиться пацієнт 50-ти років, якому буде проведена апендектомія під загальним знеболенням. Які препарати повинна підготувати медична сестра для проведення премедикації?

- A.** Димедрол, атропін, промедол
- B.** Димедрол, кордіамін, баралгін
- C.** Супрастин, новокаїн, аміназин
- D.** Фентаніл, клофелін, аміназин
- E.** Натрію оксидобутират, дроперідол, тавегіл

70. Пацієнт 33-х років поступив в хірур-

гічне відділення зі скаргами на наявність рани та розпираючий біль в лівій гомілці. Об'єктивно: шкіра лівої гомілки бліда, наявні багряно-синюшні плями. З рани виділяється повітря та вибухають м'язи, що мають вигляд вареного м'яза. Пальпаторно визначається крепітація та позитивний симптом лігатури. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Газова гангрена
- B.** Правець
- C.** Бешиха
- D.** Сибірка
- E.** Гнійна рана

71. Бригада швидкої допомоги викликана до жінки 24-х років, що скаржиться на біль в лівій молочній залозі, t° до $40^{\circ}C$. Три тижні тому народила дитину, вигодовує груддю. Об'єктивно: ліва молочна залоза збільшена в об'ємі, гіперемійована. Пальпаторно визначається ущільнення та різка болючість у верхньо-зовнішньому квадранті. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий лактаційний мастит
- B.** Пухлина молочної залози
- C.** Гідраденіт
- D.** Фурункул
- E.** Мастопатія

72. Хворому із пароніхією лівого вказівного пальця призначене оперативне лікування під анестезією за методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якій кількості повинна підготувати медсестра?

- A.** 1% розчин новокаїну 20 мл
- B.** 0,25% розчин новокаїну 200 мл
- C.** 5% розчин новокаїну 2 мл
- D.** 2% розчин дикаїну 3 мл
- E.** 0,5% розчин лідокаїну 500 мл

73. Пацієнт 60-ти років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?

- A.** Експіраторна задишка
- B.** Інспіраторна задишка
- C.** Біль в грудній клітці
- D.** Сухий кашель
- E.** Підвищення температури тіла

74. Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатися, піднімати голову та верхні і нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт?

- A.** Пасивне
- B.** Вимушене
- C.** Вимушене пасивне
- D.** Активне
- E.** Вимушене активне

75. Мати з здоровою дитиною 4-х місяців після огляду дільничним педіатром прийшла в кабінет щеплень на планове щеплення. Проти яких інфекцій медична сестра буде робити профілактичні щеплення дитині?

- A.** Дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція
- B.** Дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха
- C.** Дифтерія, гепатит В, туберкульоз, поліомієліт, гемофільна інфекція
- D.** Правець, поліомієліт, краснуха, паротит, кір
- E.** Паротит, кір, поліомієліт, гемофільна інфекція, туберкульоз

76. Жінці 32-х років після стаціонарного лікування з приводу загострення хронічного пієлонефриту лікар призначив десятиденний курс фітотерапії з метою профілактики рецидивів та закріплення результатів медикаментозного лікування. Реакція сечі лужна. Збір яких лікарських трав слід порадити вживати пацієнтці?

- A.** Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка
- B.** Трава звіробою, листя кропиви, ромашка
- C.** Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка
- D.** Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка
- E.** Ягоди чорниці, корінь алтея, шавлія

77. Хворому 70-ти років струминно швидко перелили 750 мл консервованої одногрупної крові. Під кінець гемотрансфузії у хворого з'явилися утруднене дихання, відчуття "важкості в грудях", біль у ділянці серця, ціаноз. Артеріальний тиск став різко знижуватися, пульс - аритмічний. Яке ускладнення виникло в хворого?

- A.** Гостре розширення серця
- B.** Пірогенна реакція
- C.** Гемотрансфузійний шок
- D.** Геморагічний шок
- E.** Анафілактична реакція

78. Хворому 62-х років з інфарктом міокарду, було призначено ін'єкції гепарину. В яку ділянку найдоцільніше викону-

вати ін'єкції?

- A.** Живіт
- B.** Передньозовнішня поверхня стегна
- C.** Внутрішня поверхня передпліччя
- D.** Підлопаткова ділянка
- E.** Верхньозовнішній квадрант сідниці

79. Дитина 6-ти місяців знаходиться на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$, блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 разів на добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему:

- A.** Ексикоз
- B.** Блювання
- C.** Гіпертермія
- D.** Судоми
- E.** Діарея

80. Пацієнт 52-х років надійшов до палати інтенсивної терапії з імовірним інфарктом міокарда. Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні препарати. Виконуючи призначення лікаря, медична сестра в першу чергу введе такі препарати:

- A.** Фентаніл з дроперидолом
- B.** Дигоксин, піпольфен
- C.** Нітрогліцерин, гепарин
- D.** Ампіцилін, гентаміцин
- E.** Верапаміл, курантил

81. За призначенням лікаря медична сестра ввела пацієнту 40-ка років олійний розчин камфори підшкірно. Даний розчин не був попередньо підігрітий. Яке імовірне ускладнення може виникнути?

- A.** Інфільтрат
- B.** Олійна емболія
- C.** Гематома
- D.** Крововилив
- E.** Абсцес

82. Пацієнт 63-х років чотири тижні тому потрапив до нейрохірургічного відділення після тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий ліжковий режим. Об'єктивно: в ділянці лопаток, хребта, ліктів та п'яток спостерігається неглибоке порушення цілісності шкіри, стійка гіперемія, відшарування епідермісу, намокання. Який засіб необхідно застосувати для обробки шкіри в уражених місцях?

- A.** 5% розчин калію перманганату
- B.** Змащування 40% розчином етилового спирту
- C.** Змащування 70% розчином етилового спирту
- D.** 1% розчин діамантового зеленого
- E.** Саліциловий спирт

83. Пацієнта 22-х років турбує висип на статевому члені, що з'явився через 4 тижні після статевого контакту. Об'єктивно: на шкірі тіла статевого члена - округла ерозія блюдцеподібної форми діаметром 1 см з гладкою блискучою поверхнею, м'ясо-червоного кольору, без запальних явищ навколо. При пальпації - краї і дно ерозії щільні. Пахвинний лімфовузол збільшений, не болючий. Про яке захворювання слід подумати?

- A.** Сифіліс
- B.** Піодермія
- C.** Контактний дерматит
- D.** Короста
- E.** Генітальний герпес

84. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. Із яких ділянок необхідно провести мазок?

- A.** Із зів та носа
- B.** Із задньої стінки горла
- C.** Із зів
- D.** З-під язика
- E.** Із носогорла

85. У пацієнтки 47-ми років, хронічна серцева недостатність. Їй призначено вимірювати водний баланс. Що потрібно враховувати, виконуючи це призначення?

- A.** Співвідношення між введеною рідиною та виділеною сечею за добу
- B.** Різниця між масою тіла вранці та ввечері
- C.** Кількість рідини, введеної за добу
- D.** Кількість сечі, виділеної за добу
- E.** Співвідношення між денним та нічним діурезом

86. Мати двохмісячної дитини звернулася до патронажної медсестри зі скаргами на неспокій дитини, поганий сон, невелику кількість випорожнень, рідкі сечовипускання, уповільнення прибавки маси тіла. Затримки виділення молока в молочній залозі немає. При контрольних зважуваннях встановлено, що дитина

на недоотримує 50% молока при кожному годуванні. Ці ознаки характерні для:

- A.** Гіпогалакції
- B.** Агалакції
- C.** Лактостази
- D.** Галактореї
- E.** Маститу

87. Мати проводить підготовку дитини до грудного вигодовування і виявила утруднене носове дихання, пов'язаного з великою кількістю слизу. Яким розчином потрібно промити носові ходи?

- A.** Фізіологічний розчин
- B.** Нафтізин
- C.** Галазолін
- D.** Ефедрин
- E.** Алое

88. Жінка 24-х років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є вірогідними для встановлення вагітності?

- A.** Визначення частин плоду
- B.** Зміна смаку
- C.** Пігментація шкіри обличчя
- D.** Припинення менструації
- E.** Збільшення матки

89. У пацієнта з виразковою хворобою шлунка 30 хвилин тому з'явилися загальна слабкість, запаморочення, шум у вухах, "мерехтіння мушок" перед очима. Було блювання по типу "кавової гущі". Які першочергові дії медсестри в даному випадку?

- A.** Покласти міхур з льодом на надчеревну ділянку
- B.** Покласти грілку на надчеревну ділянку
- C.** Ввести амінокапронову кислоту внутрішньовенно
- D.** Промити шлунок
- E.** -

90. Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 8-ми днів, мати поскаржилася на те, що у неї мало молока і дитина не витримує 3-х годинні перерви між годуваннями, зцідити молоко після годування не вдається. Ви порекомендуєте матері:

- A.** Провести контрольне годування
- B.** Провести водно-чайну паузу
- C.** Частіше брати дитину на руки
- D.** Зменшити перерви між годуваннями
- E.** Збільшити кількість годувань

91. У приймальне відділення поступив пацієнт 48-ми років з гіпертонічною хворобою II ст. З'ясовано питання про госпіталізацію пацієнта в кардіологічне відділення. Який медичний документ необхідно частково заповнити і передати у відділення?

- A.** Титульний лист медичної карти стаціонарного хворого
- B.** Лист обстеження пацієнта
- C.** Лист лікарських призначень
- D.** Температурний лист
- E.** Статистичний талон

92. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення болю?

- A.** На правому боці
- B.** На лівому боці
- C.** З припіднятим головним кінцем ліжка
- D.** З припіднятими ногами
- E.** На спині з припіднятим головним кінцем ліжка

93. Медсестру сільської дільниці викликали до дівчинки 7-ми років з температурою $39,5^{\circ}\text{C}$, ознобом, пітливістю, болями у животі та при сечовипусканні. Сеча мутна. Що можна запідозрити?

- A.** Пієлонефрит
- B.** Ниркова колька
- C.** Цистит
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Гостра ниркова недостатність

94. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70-ти років зі скаргами на раптовий біль в ділянці пахвинної грижі, нудоту, блювання. При обстеженні грижа болісна, збільшена, напружена, не вправляється. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Защемлення грижі
- B.** Копростаз
- C.** Кишкова непрохідність
- D.** Невправимість грижі
- E.** Малігнізація

95. Пацієнтка 19-ти років госпіталізована в гінекологічне відділення з матковою кровотечею. Трьохмісячна затримка менструації. Ознаки вагітності відсутні. З діагностично-лікувальною метою проведено вишкрібання слизової оболонки матки. Який наступний етап дій медичної сестри у наданні невідкладної допомоги?

- A.** Холод на низ живота
- B.** Введення скорочуючих засобів
- C.** Введення кровоспинних засобів
- D.** Визначення групи крові і резус-фактору
- E.** Введення кровозамінників

96. Пацієнтка 25-ти років надійшла до приймального відділення з діагнозом лікаря жіночої консультації: підозра на прогресуючу трубну вагітність. Під час перебування у приймальному відділенні раптово втратила свідомість. Яке найбільш імовірне ускладнення стану пацієнтки?

- A.** Розрив маткової труби
- B.** Судинна дистонія
- C.** Епілепсія
- D.** Гіпоглікемічна кома
- E.** Гіперглікемічна кома

97. Жінка 45-ти років упала на праву руку. Відразу з'явився біль у правому надпліччі. Звернулася до медсестри. При огляді відмічається деформація ключиці, різка болісність, кістковий хрусткіт. Що з переліченого виконає медична сестра з метою першої допомоги?

- A.** Накладе пов'язку Дезо
- B.** Накладе колосовидну пов'язку
- C.** Застосує грілку
- D.** Накладе шину Крамера
- E.** Накладе кільце Дельбе

98. Хворий 24-х років надходить на планову операцію з приводу правосторонньої пахвинної кили. Вкажіть час, впродовж якого медична сестра повинна проводити доопераційне навчання:

- A.** Не більше 24 годин
- B.** Впродовж всього доопераційного періоду
- C.** Впродовж останнього вечора перед операцією
- D.** Впродовж двох годин
- E.** Не менше 48 годин

99. Під час зіткнення автомобілів пацієнт 31-го року був затиснутий в машині. Скаржиться на сильний біль в ділянці тазу, відсутність виділення сечі. Об'єктивно: в ділянці тазу деформація. В якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?

- A.** В положенні "жаби"
- B.** Напівсидячи
- C.** Сидячи
- D.** Лежачи на спині
- E.** Лежачи на животі

100. До травм пункту доставлено потер-

плого 20-ти років після автомобільної аварії. Після огляду встановлено, що у пацієнта закритий перелом стегнової кістки справа. Що потрібно виконати в першу чергу?

- A.** Введення знеболюючих засобів
- B.** Введення снодійних засобів
- C.** Накладання скелетного витяжіння
- D.** Введення ППС
- E.** Введення антибіотиків

101. У породіллі 32-х років на 2-гу добу після операції кесаревого розтину з'явилися розлитий біль у животі, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, гикавка, нудота, блювання. Об'єктивно: при пальпації живіт здутий, напружений, симптом Щоткіна-Блумберга позитивний. При аускультатії: знижена перистальтика кишок. Вкажіть, якому захворюванню відповідає дана клінічна картина?

- A.** Розлитий перитоніт
- B.** Пельвіоперитоніт
- C.** Метроендометрит
- D.** Тромбофлебіт вен таза
- E.** Непрохідність кишок

102. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками на гомілкях. У який спосіб медсестра повинна транспортувати його до відділення?

- A.** На кріслі-каталці
- B.** Повільно пішки у супроводі медсестри
- C.** На ношах
- D.** На каталці
- E.** Повільно пішки у супроводі двох санітарок

103. Ви працюєте перев'язувальною сестрою хірургічного відділення. Хворого з якою патологією з перерахованих нижче слід запросити до перев'язувальної першим?

- A.** Ліпома спини
- B.** Абсцес плеча
- C.** Карбункул шиї
- D.** Остеомієліт
- E.** Панарицій

104. Утопленого чоловіка 48-ми років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перерахованих ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- A.** Звуження зіниць
- B.** Підвищення артеріального тиску
- C.** Прискорення пульсу
- D.** Сповільнення пульсу, часте дихання
- E.** Прискорення дихання

105. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість у дрібних суглобах кистей рук, неможливість самообслуговування, загальну слабкість. Об'єктивно: кисті рук у вигляді "ластів моржа". Яка проблема є пріоритетною?

- A.** Неможливість самообслуговування
- B.** Ранкова скутість у суглобах
- C.** Деформація суглобів
- D.** Загальна слабкість
- E.** -

106. При обстеженні пацієнтки діагностовано кольпіт. Яка проблема в даному випадку основна?

- A.** Гнійні виділення
- B.** Підвищення температури тіла
- C.** Лихоманка
- D.** Кровотеча
- E.** Біль внизу живота

107. Медсестру викликали в палату до пацієнтки, у якої почалася кровотеча з варикозної виразки у ділянці нижньої третини лівої гомілки. Пацієнтка налякана, скаржиться на слабкість. Вкажіть незалежні втручання медичної сестри:

- A.** Накласти стискаючу пов'язку
- B.** Накласти артеріальний джгут
- C.** Накласти венозний джгут
- D.** Викликати лікаря
- E.** Виміряти пульс та артеріальний тиск

108. У жіночу консультацію звернулася жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювання вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно застосувати для підтвердження вагітності?

- A.** Дворучне піхвове дослідження
- B.** Чотири прийоми Леопольда
- C.** Визначення ВСДМ
- D.** Аналіз крові
- E.** Зважування жінки

109. Дівчинка 14-ти років скаржиться на неспокій, плаксивість, пітливість, підвищений апетит, схуднення. Об'єктивно: температура тіла - $37,5^{\circ}\text{C}$, вологі долоні, тремтіння повік і язика, тахікардія, екзофтальм, блиск очей. Про яке захворювання йдеться?

- A.** Дифузний токсичний зоб
- B.** Вегето-судинна дисфункція
- C.** Гіпофізарний нанізм
- D.** Цукровий діабет
- E.** Гіпотиреоз

110. До стаціонарного відділення надійшла пацієнтка з діагнозом: ревматоїдний артрит в стадії загострення. Скаржиться на сильний біль у суглобах, підвищення температури тіла, пітливість. Суглоби припухлі, деформовані, шкіра навколо суглобів почервоніла. Пацієнтка не може поворухнутися без болю. Що повинна зробити медсестра, щоб зменшити біль у суглобах?

- A.** Надати зручного положення в ліжку
- B.** Забезпечити прийом ліків за призначенням лікаря
- C.** Забезпечити проведення електрофорезу
- D.** Зробити масаж суглобів
- E.** -

111. Який препарат вводиться першим при гіпотонічній кровотечі в ранньому післяпологовому періоді?

- A.** Окситоцин
- B.** Ензапрост
- C.** Вікасол
- D.** Амінокапронова кислота
- E.** Дицинон

112. Хлопчик 9-ти років звернувся до медичної сестри школи зі скаргами на біль у ділянці шиї, що посилюється при жуванні та ковтанні. Об'єктивно: температура тіла - $37,7^{\circ}\text{C}$, спостерігається припухлість ямки між гілками нижньої щелепи та соскоподібним відростком з обох сторін, шкіра незмінена, напружена, блискуча. Яку пріоритетну проблему повинна вирішити медична сестра?

- A.** Ізоляція хворої дитини
- B.** Повідомити лікаря
- C.** Дати дитині жарознижуючі засоби
- D.** Накласти зігрівальний компрес на шию
- E.** Ввести знеболюючі препарати

113. Пацієнт хворіє цукровим діабетом впродовж 15-ти років отримує інсулін. В поліклініці сімейної медицини пацієнтові стало раптово погано: відзначається блідість шкірних покривів, тремтіння, запаморочення, серцебиття, пітливість. Потім втратив свідомість. Який препарат необхідно ввести пацієнтові для надання невідкладної медичної допомоги?

- A.** 40% р-н глюкози
- B.** Мезатон
- C.** Норадреналін
- D.** 5% р-н глюкози
- E.** -

114. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра визначила: артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній черевний стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика?

- A.** Прееклампсія III ступеня
- B.** Прееклампсія II ступеня
- C.** Прееклампсія I ступеня
- D.** Гіпертензія вагітних
- E.** Водянка вагітних

115. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- A.** План догляду за пацієнтом
- B.** Історію хвороби
- C.** Листок медсестринського обстеження пацієнта
- D.** Листок оцінки якості догляду
- E.** Карту спостереження за хворим

116. Медсестра працює у терапевтичному відділенні. Настановами якого наказу МОЗ України, що регламентує збір, знезараження та утилізацію виробів одноразового застосування з пластичних мас, вона буде керуватись у роботі?

- A.** №223
- B.** №120
- C.** №720
- D.** №408
- E.** №38

117. Юнак 16-ти років скаржиться на різкий біль у правому ліктьовому суглобі, що виник 15 хвилин тому після забиття. Хворіє на гемофілію. Яку долікарську допомогу може надати медична сестра пацієнту?

- A.** Міхур з льодом на суглоб
- B.** Грілка на суглоб
- C.** Асептична пов'язка на суглоб
- D.** Сухий зігрівальний компрес на суглоб
- E.** -

118. Хворого на хронічний бронхіт останніми місяцями турбує виділення гнійного харкотиння з неприємним за-

пахом вранці (до 200 мл). Пальці мають вигляд "барабаних паличок", нігті - "годинникових скелець". Для якого захворювання це характерно?

- A.** Бронхоектатична хвороба
- B.** Пневмонія
- C.** Пневмококіоз
- D.** Плеврит
- E.** Туберкульоз

119. При проведенні медсестринського обстеження хворого медична сестра виявила наступні скарги: біль в грудній клітці, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, підвищення температури тіла до 39°C. Яке захворювання може запідозрити медсестра у хворого?

- A.** Пневмонія
- B.** Бронхіт
- C.** Абсцес легень
- D.** Ларингіт
- E.** Фарингіт

120. Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення?

- A.** Стернальна пункція
- B.** Біохімічний аналіз крові
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Коагулограма
- E.** Загальний аналіз сечі

121. Пацієнт доставлений до приймального відділення каретою швидкої допомоги в непритомному стані, з підозрою на медикаментозне отруєння. Медична сестра опустила головний кінець кушетки, повернула голову пацієнта набік та підставила ниркоподібний лоток під кутик рота пацієнта. На профілактику якої потенційної проблеми пацієнта спрямовані сестринські втручання?

- A.** Аспірація блювотними масами
- B.** Розвиток колапсу
- C.** Поява пролежнів
- D.** Профілактика кровотечі із шлунково-кишкового тракту
- E.** Профілактика гіпертермії

122. У пацієнта хронічний пієлонефрит. Що слід порадити вживати з лікувальною метою?

- A.** Морс з журавлини
- B.** Кава
- C.** Лимонний сік
- D.** Чай зелений
- E.** Молоко

123. У пацієнта після переохолоджен-

ня підвищилась температура до 38°C, озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болоче сечовипускання. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Гострий пієлонефрит
- B.** Сечокам'яна хвороба
- C.** Гострий гломерулонефрит
- D.** Хронічний гломерулонефрит
- E.** Хронічна хвороба нирок

124. Під час медичного огляду новонародженої дівчинки 6-ти днів життя медсестра виявила нагрубання грудних залоз. При якому стані зустрічається така проблема?

- A.** Статевий криз
- B.** Мастит
- C.** Фізіологічна еритема
- D.** Фізіологічна лихоманка
- E.** Фізіологічна жовтяниця

125. У дитини 10-ти років після перенесеної ангіни з'явилися наступні симптоми: слабкість, емоційна нестійкість, плаксивість, зміна характеру почерку і ходи, мимовільні рухи м'язів. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A.** Мала хорія
- B.** Вегето-судинна дистонія
- C.** Вроджена вада серця
- D.** Спазмофілія
- E.** Суглобова форма геморагічного діатезу

126. У пацієнта протягом 4-х хвилин були відсутні: дихання, пульс та АТ, зіниці не реагували на світло. Проведенням реанімаційних заходів вдалося відновити серцеву та дихальну діяльність, до пацієнта повернулася свідомість. Як називається стан, в якому знаходився пацієнт?

- A.** Клінічна смерть
- B.** Біологічна смерть
- C.** Передагональний стан
- D.** Агонія
- E.** Кома

127. Пацієнту із загостренням хронічного холециститу унаслідок зневоднення лікар призначив ректальне введення 5% розчину глюкози та розчин Рінгера. Що необхідно зробити медсестрі перед виконанням цієї процедури?

- A.** Зробити очисну клізму
- B.** Дати 50 мл рицинової олії
- C.** Зробити сифонну клізму
- D.** Дати 100 мл відвару ромашки
- E.** Дати таблетки активованого вугілля

128. Дитині 5 років, скаржиться на періодичний біль у животі, почастишання випорожнень, підвищення температури тіла до 38°C . Шкіра, слизові оболонки бліді, сухі на дотик. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт болючий при пальпації. Спостерігається бурчання в животі. Сигмовидна кишка спазмована, болюча. Протягом доби випорожнялася 9 разів, в калі слиз, прожилки крові. Для оцінки результатів медсестринських втручань вкажіть метод лабораторної діагностики для даної дитини:

- A.** Бакдослідження калу, копрограма
- B.** Кал на яйця гельмінтів
- C.** Дуоденальне зондування
- D.** Зішкріб на ентеробіоз
- E.** Загальний аналіз сечі

129. Мати звернулася до дільничої медсестри із скаргами на те, що в її дитини віком 5 років підвищилась температура тіла до 38°C , з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю блювання. Щодня кашель частішає. Під час кашлю обличчя дитини набрякле, ціанотичне, набрякають шийні вени, очі наливаються кров'ю. Напади спостерігаються 10-15 разів на добу. На скільки днів ізолюють хворого при цьому захворюванні?

- A.** 30 днів
- B.** 7 днів
- C.** 12 днів
- D.** 10 днів
- E.** 20 днів

130. При обстеженні пацієнта медсестра визначила існуючі проблеми: біль в суглобах, еритему шкіри обличчя по типу "метелика", біль в попереку та в ділянці серця. Для якого захворювання характерні вище перераховані проблеми?

- A.** Системний червоний вовчак
- B.** Ревматоїдний артрит
- C.** Дерматоміозит
- D.** Склеродермія
- E.** Пієлонефрит

131. Хворий 60-ти років знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні. Раптово стан хворого погіршився у зв'язку з легеневою кровотечею. Якого положення слід надати пацієнту?

- A.** Підвищеного положення і повернути на уражений бік
- B.** Покласти на спину і підняти головний кінець
- C.** Підвищеного положення і повернути його на протилежний бік враження
- D.** Покласти на бік і зігнути ноги в колінних суглобах
- E.** Покласти на живіт і підняти нижній кінець

132. Хворий скаржиться на вологий кашель, підвищення температури до 39°C , нездужання, біль у грудній клітці, задихку під час фізичного навантаження. У крові: лейкоцитоз, прискорена ШОЕ. Під час аускультатії дрібно пухирчасті хрипи, крепітація, жорстке дихання. На Ro-грамі вогнищеві інфільтративні тіні в легенях. Що слід запідозрити у хворого?

- A.** Вогнищева пневмонія
- B.** Бронхіт
- C.** Гострий обструктивний бронхіт
- D.** Бронхіальна астма
- E.** Стенозуючий ларингіт

133. При проведенні непрямого масажу серця і ШВЛ у новонародженого в пологовій залі співвідношення компресій грудної клітки до частоти ШВЛ складає:

- A.** 3:1
- B.** 1:1
- C.** 5:1
- D.** 1:2
- E.** 4:1

134. У пацієнта 50-ти років через годину після вживання в їжу полуниця, виникла слабкість, свербіж шкіри, з'явився однотипний еритематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Кропив'янка
- B.** Набряк Квінке
- C.** Напад бронхіальної астми
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Сироваткова хвороба

135. Медсестра складає план догляду за пацієнтом, якому лікар визначив попередній діагноз: хронічний коліт. До якого лабораторного дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A.** Аналіз калу на копрограму
- B.** Аналіз харкотиння
- C.** Аналіз крові на ревмопроби
- D.** Аналіз сечі на глюкозу
- E.** Аналіз крові на залишковий азот

136. Пацієнтка 36-ти років звернулася до

медичної сестри з приводу появи впродовж останніх декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного серцебиття, дратівливості, пітливості, схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з'явилися після стресу. Об'єктивно: стовщення шиї в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A.** Тиреотоксикоз
- B.** Гіпотиреоз
- C.** Ендемічний зоб
- D.** Акромегалія
- E.** Хвороба Аддісона

137. Пацієнту 32-х років медсестра вводила за призначенням лікаря внутрішньовенно 10% р-н кальцію хлориду, пацієнт відмітив пекучий біль в місці ін'єкції. Яке ускладнення повинна запідозрити медсестра в місці ін'єкції?

- A.** Некроз тканини
- B.** Гематома
- C.** Флебіт
- D.** Емболія
- E.** Тромбофлебіт

138. У першовагітної жінки 24-х років терміном 38-39 тижнів з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 20-25 секунд через 7-8 хвилин. Як оцінити такі симптоми?

- A.** Перший період пологів
- B.** Прелімінарний період
- C.** Другий період пологів
- D.** Третій період пологів
- E.** Післяпологовий період

139. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на біль, свербіння, печіння, серозно-гнійні виділення. Об'єктивно: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви. Як оцінити ці проблеми?

- A.** Вульвіт
- B.** Аднексит
- C.** Кольпіт
- D.** Ендометрит
- E.** Ерозія шийки матки

140. У гінекологічне відділення поступила пацієнтка з підозрою на порушення позаматкової вагітності. До якої діагностичної маніпуляції повинна підготувати жінку медсестра?

- A.** Пункція через задне склепіння
- B.** Лапароскопія
- C.** Оглядова рентгенографія тазу
- D.** Лапароцентез
- E.** Пункція через передне склепіння

141. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що першочергово повинна зробити медсестра при наданні невідкладної допомоги?

- A.** Забезпечити прохідність дихальних шляхів
- B.** Виміряти артеріальний тиск
- C.** Ввести заспокійливі засоби
- D.** Надати інгаляційний наркоз
- E.** Ввести протисудомні засоби

142. На диспансерному обліку знаходиться жінка 53-х років з діагнозом: рак шийки матки IV ступеня. Під час огляду почалася значна кровотеча. Назвіть першу допомогу, яку повинна надати медсестра:

- A.** Провести тугу тампонаду піхви
- B.** Покласти міхур з льодом
- C.** Ввести скорочувальні засоби
- D.** Ввести кровозамінники
- E.** Розпочати інфузійну терапію

143. У дівчинки 5-місячного віку протягом останніх 2-х тижнів після переходу на змішане вигодовування з підгодовуванням коров'ячим молоком з'явилися часті розріджені випорожнення. Стан задовільний, інших скарг немає. Результати посіву випорожнень на патогенну мікрофлору негативні. Що порадите для нормалізації стану?

- A.** Замінити коров'яче молоко на адаптовану молочну суміш
- B.** Призначити водно-чайну паузу на 72 години
- C.** Зменшити кількість коров'ячого молока
- D.** Перейти повністю на штучне вигодовування
- E.** Призначити ферментні препарати

144. З чого починають обстеження передміхурової залози для встановлення діагнозу?

- A.** Пальцеве обстеження
- B.** Колоноскопія
- C.** Ректороманоскопія
- D.** УЗД передміхурової залози
- E.** Сканування передміхурової залози

145. В приймальне відділення районної лікарні поступив хворий зі скаргами на тупий постійний біль оперізувального характеру, нудоту, блювання. Які зале-

жні дії медичної сестри для уточнення діагнозу?

- A.** Взяти сечу на діастазу
- B.** Взяти кал для копрограми
- C.** Підготувати пацієнта до ректороманоскопії
- D.** Підготувати пацієнта до колоноскопії
- E.** Виконати дуоденальне зондування

146. У пацієнтки 43-х років загострення хронічного холецистити, скарги на ниючий біль у правому підребер'ї, відрижку повітрям, гіркоту в роті, температуру тіла - $37,5^{\circ}\text{C}$, слабкість. Яку проблему пацієнтки слід вважати пріоритетною?

- A.** Ниючий біль у правому підребер'ї
- B.** Гіркота в роті
- C.** Відрижка повітрям
- D.** Підвищення температури тіла
- E.** Слабкість

147. У пацієнта з гострим інфарктом міокарда розвивається набряк легень. Яка першочергова дія медсестри?

- A.** Надати напівсидячого положення з опущеними ногами
- B.** Надати положення на боці
- C.** Надати горизонтального положення з піднятими ногами
- D.** Надати сидячого положення
- E.** -

148. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом піднявся АТ до 190/110 мм рт.ст. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A.** Гірчичники на потиличну ділянку
- B.** Грілка на поперекову ділянку
- C.** Міхур з льодом на потиличну ділянку
- D.** Гаряча ванна
- E.** Гірчичники на ділянку серця

149. В урологічному відділенні у пацієнта 64-х років затримка сечовипускання внаслідок аденоми простати. Який катетер використає медична сестра для спорожнення сечового міхура?

- A.** Гумовий катетер
- B.** Металевий чоловічий катетер
- C.** Катетер Елатона
- D.** Катетер Пещера
- E.** Катетер Тіманна

150. Яке імовірне захворювання у дитини, яка має наступні симптоми: підвищення температури тіла, головний біль, нездужання, болюче ковтання, дрібно-точкові висипання на гіперемійованій шкірі?

- A.** Скарлатина
- B.** Дифтерія
- C.** Ангіна
- D.** Пневмонія
- E.** ГРВІ

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК М. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА.

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.
(Українською мовою).

Підписано до друку 11.04/№90. Формат 60x84 1/8
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Суг. Друк офсет.
Ум.друк.арк. 16. Облік.вид.арк. 20.
Тираж. (5802 прим. – укр. мова).

Б		кисень	кислород	привушний	околоушный
багатоплідний	многоплодный	клеочучий	клокочущий	променевиий	лучевой
бешиха	рожа	ковтанья	глотание	променезопа'ястковий	лучезапястный
білизна	бельё	крейда	мел	пухирець	пузырёк
блювання	рвота	крижі	крестец	пухлина	опухоль
бловотний	рвотный	кровотеча	кровотечение	Р	
бовтанка	болтушка	кроповий	укропный	раптово	внезапно
В		кукса	культя	ризик	риск
вагітність	беременность	кульгавість	хромота	рідина	жидкость
вада	порок	Л		рідкий	жидкий
вантажівка	грузовик	литковий	икроножний	рогівка	роговица
вапно	известь	лоно	лобок	родзинки	изюм
вигодовування	вскармливание	лусочка	чешуйка	роділля	роженица
викидень	выкидыш	М		розпал	разгар
вимога	требование	марення	бред	розпитування	расспрос
вимушений	вынужденный	мета	цель	розтин	сечение
випинання	выпячивание	метушитись	суетиться	рукавичка	перчатка
випорожнення	испражнения	мигдалик	миндалина	рідина	жидкость
витрішкуватість	пучеглазие	миготливий	мерцательный	рух	движение
вишкрібання	выскабливание	міхур	пузырь	С	
вівчак, вовчак	волчанка	млявий	вялый	свербіж, сверблячка	зуд
відвар	отвар	Н		сеча	моча
відволікаюча	отвлекающая	набряк	отёк	сечовід	мочеточник
відмова	отказ	надмірний	избыточный	сечогінний	мочегонный
відраза	отвращение	напруга	напряжение	сир	творог
відшарування	отслойка	натискування	нажатие	сироподібний	творожистый
вірогідний	достоверный	натще	натощак	сідниця	ягодица
вічко	зев	нашарування	наслоение	склепіння	свод
власний	собственный	негативний	отрицательный	скутість	скованность
вогнище	очаг	нежить	насморг	смак	вкус
вологий	влажный	нездужання	недомогание	смоктання	сосание
воротар	привратник	необґрунтований	необоснованный	соняшниковий	подсолнечный
втома	усталость	непритомність	потера сознания	спадковість	наследственность
втомлюваність	утомляемость	нирка	почка	спрага	жажда
втручання	вмешательство	ноші	носилки	сприяти	способствовать
вузловий	узловой	нудота	тошнота	статевий	половой
вузол	узел	О		статура	телосложение
Г		обробка	обработка	стегно	бедро
гавкаючий	лающий	обличчя	лицо	стиснення	сдавление
годування	кормление	облік	учёт	стрімкий	стремительный
голка	иголка	ознака	признак	струм	ток
гомілка	голень	окістя	надкостница	струминний	струйный
горб	бугор	оперізуочий	опоясывающий	струс	сотрясение
гумовий	резиновый	опік	ожог	судоми	судороги
Д		осередок	очаг	сумісність	совместимость
дільничий	участковый	особистий	личный	суміш	смесь
догляд	уход	оцет	уксус	сутінковий	сумеречный
дозволений	разрешённый	очеревина	брюшина	Т	
дотримання	соблюдение	П		терміновий	экстренный
З		паління	курение	тиждень	неделя
забій	ушиб	пахвинний, паховий	паховый	тиск	давление
загартовування	закаливание	пахвовий	подмышечный	травний	пищеварительный
загосння	заживление	пекучий	жгучий	тривалий	длительный
задишка	одышка	передміхуровий	предстательный	У	
заклякання	окоченение	перейми	схватки	усунення	устранение
закреп	запор	переконати	убедить	ущільнення	уплотнение
залишковий	остаточный	переміжний	перемежающийся	Х	
залізо	железо	перенісся	переносица	харкотиння	мокрота
залоза	железа	північ	север	харчування	питание
занурювати	погружать	півнячий	петушиный	хода	походка
запалення	воспаление	підгузок	подгузник	хребет	позвоночник
запаморочення	головокружение	піднебіння	нёбо	Ц	
засіб	средство	підсумковий	итоговый	цукор	сахар
затерпність	онемение	піногасники	пеногасители	цукровий	сахарный
заходи	мероприятия	піхва	влагалище	Ч	
зважування	взвешивание	плесканий	плоский	чадний	угарный
звивистий	извитой	повідомлення	извещение	черговий	дежурный
зволжениий	увлажнённый	повіко	веко	чергування	дежурство
зворотній	обратный	позаматковий	внематочный	черевний	брюшной
здухвинний	подвздошный	пологовий	родовой	Ш	
зіниця	зрачок	пологовий будинок	роддом	шар	слой
зірочка	звёздочка	полум'я	пламя	шлунок	желудок
знепритомніти	потерять сознание	полуниця	клубника	штучний	искусственный
зомління	обморок	поперек	поясница	Щ	
зсілий	свернувшийся	породілля	родильница	щелепа	челюсть
зупинка	остановка	посіпування	подергивание	щелення	прививка
К		потилиця	затылок	щур	крыса
кавовий	кофейный	поточний	текущий	Я	
каламутний	мутный	правець	столбняк	ядуха	удушьє
калітка	мошонка	прибирання	уборка	ясна	дёсна