

# Приклади тестових завдань

## Крок М *СЕСТРИНСЬКА СПРАВА*



1. У маніпуляційному кабінеті після внутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад кашлю, ядуху, серцебиття. Артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст. Назвіть ускладнення, що виникло:

- A. Анафілактичний шок
- B. Інфекційно-токсичний шок
- C. Кардіогенний шок
- D. Колапс
- E. Непритомність

2. При організації харчування в санаторії "Роща" дієтичною сестрою було встановлено, що відпочиваючі забезпечені 4-х разовим харчуванням. Яку частину добової енергетичної цінності повинен складати їх сніданок?

- A. 25%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 40%
- E. 45%

3. У пацієнта в ділянці лопаток, хребта, ліктів, п'яток поверхневе (неглибоке) порушення цілісності шкіри з поширенням на підшкірну основу. Стійка гіперемія, відшарування епідермісу. Як характеризувати стан пацієнта?

- A. Пролежні II ступеня
- B. Ризик розвитку пролежнів
- C. Пролежні I ступеня
- D. Пролежні III ступеня
- E. Пролежні IV ступеня

4. Показанням до використання олійної клізми є:

- A. Запальні та виразкові процеси в товстій кишці
- B. Універсальні набряки
- C. Кишкова непрохідність
- D. Підготовка роділлі до пологів
- E. Випадіння прямої кишки

5. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- A. План догляду за пацієнтом
- B. Історію хвороби
- C. Листок медсестринського обстеження пацієнта
- D. Листок оцінки якості догляду
- E. Карту спостереження за хворим

6. Пацієнту 32-х років медсестра вводила за призначенням лікаря внутрішньовенно 10% розчин кальцію хлориду, пацієнт відмітив пекучий біль в місці ін'єкції. Яке ускладнення повинна запідозрити медсестра в місці ін'єкції?

- A. Некроз тканини
- B. Гематома
- C. Флебіт
- D. Емболія
- E. Тромбофлебіт

7. Хворий виконали внутрішньом'язову ін'єкцію, після чого в місці введення виник інфільтрат. Який з фізіотерапевтичних заходів доцільно застосувати?

- A. Зігрівальний компрес
- B. Гірчичники
- C. Грілка
- D. Міхур з льодом
- E. Ніжна ванна

8. Ви працюєте медичною сестрою стерилізаційного відділення. Проводячи передстерилізаційну обробку інструментів, Вам необхідно перевірити їх на наявність залишків миючих засобів. Який реактив Ви для цього застосуєте?

- A. Фенолфталеїновий
- B. Амідопіриновий
- C. Бензидиновий
- D. Гемотест М
- E. Ортотолуїдиновий

9. Пацієнтові призначено збирання сечі з метою визначення функціональної здатності нирок. До якого дослідження сечі підготує медична сестра пацієнта?

- A. За методом Зимницького
- B. За методом Нечипоренка
- C. За методом Аддіса-Каковського
- D. До бактеріологічного дослідження
- E. За методом Амбурже

10. Назвіть дослідження калу, при підготовці до якого за 3-5 днів пацієнтові забороняється вживання препаратів заліза, йоду та призначається безгемоглобінова дієта:

- A. Кал на наявність прихованої крові
- B. Кал на виявлення ентеробіозу
- C. Кал на яйця гельмінтів
- D. Кал для копрологічного дослідження
- E. Кал для бактеріологічного дослідження

11. У ендокринологічне відділення доставлений пацієнт у якого спостерігається повільне (6-8 дихальних рухів за 1 хв.), шумне, утруднене і глибоке дихання, "дихання загнутого звіра". Визначте патологічний тип дихання:

- A. Дихання Куссмауля
- B. Дихання Біота
- C. Дихання Чейна-Стокса
- D. Задишка
- E. Брадіпноє

12. Студентка медичного коледжу під час проходження практики заповнювала систему одноразового використання для введення інфузійного розчину. Маніпуляційна

медсестра зробила зауваження, що необхідно ретельно видалити все повітря, інакше може виникнути таке ускладнення:

- A.** Повітряна емболія
- B.** Медикаментозна емболія
- C.** Пошкодження нервового стовбура
- D.** Некроз тканини
- E.** Інфільтрат

**13.** Пацієнт лікується у гастроентерологічному відділенні з діагнозом спастичний коліт. Впродовж трьох днів не мав випорожнень. Йому призначено очисну клізму. Що має приготувати медсестра для цієї процедури?

- A.** Кухоль Есмарха, вода 1,5 л 39°C
- B.** Шприц Жане, гумова трубка, вода 200 мл 30°C
- C.** Гумовий балончик, гумова трубка, вода 300 мл 35°C
- D.** Гумовий зонд довжиною 1,5 м з лійкою, вода 5 л 24°C
- E.** Кухоль Есмарха, вода 1,5 л 24°C

**14.** Медична сестра виконує внутрішньовенне струминне введення ліків. Коли медична сестра повинна зняти джгут?

- A.** Після потрапляння голки у вену
- B.** Після оброблення спиртом місця ін'єкції
- C.** Під час уведення ліків
- D.** Після введення ліків
- E.** Після видалення голки з вени

**15.** Хворому було введено внутрішньом'язово 5 мл 25% розчину магнію сульфату. Перед повторним введенням препарату наступного дня медична сестра шляхом пальпації виявила ущільнення, набряк, почервоніння в місці попередньої ін'єкції. Яке ускладнення можна запідозрити у хворого?

- A.** Постін'єкційний інфільтрат
- B.** Постін'єкційний тромбофлебіт
- C.** Гематому
- D.** Алергійну реакцію
- E.** Некроз тканин

**16.** Бригадою швидкої допомоги до приймального відділення доставлений пацієнт із гострим отруєнням. За призначенням лікаря медична сестра промиває шлунок пацієнту. Промивання шлунка припиняється тоді, коли:

- A.** З'явилися чисті промивні води
- B.** Використано 3-4 л промивної рідини
- C.** Використано 5-6 л промивної рідини
- D.** Виведено увесь токсин
- E.** Виведено більшу частину токсину

**17.** Старша медична сестра пояснює санітарці, що метод, при якому знищуються патогенні і умовно - патогенні мікроорганізми в середовищі, яке оточує людину, це:

- A.** Дезінфекція
- B.** Дезінсекція
- C.** Дератизація
- D.** Стерилізація
- E.** Антисептика

**18.** У пацієнта з пневмонією, після прийняття жарознижуючих препаратів, спостерігається погіршення стану: з'явилися загальна слабкість, холодний липкий піт, артеріальний тиск (АТ) знизився, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Колапс
- B.** Шок
- C.** Непритомність
- D.** Гіпертонічний криз
- E.** Гіпотонічний криз

**19.** Пацієнт 42-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні. Відмічаючи в температурному листку показники температури тіла, медсестра побачила, що протягом 4-х днів у пацієнта різниця між ранковою та вечірньою температурою складає 4°C. Назвіть вид гарячки:

- A.** Гектична
- B.** Атипова
- C.** Хвилеподібна
- D.** Постійного типу
- E.** Послаблювальна

**20.** Хворому 25-ти років, який лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету лікар призначив введення 40 ОД інсуліну за 30 хвилин до сніданку (1 мл містить 100 ОД). Яку кількість препарату необхідно набрати в шприц ємністю 2 мл?

- A.** 0,4 мл
- B.** 0,5 мл
- C.** 0,6 мл
- D.** 0,7 мл
- E.** 0,8 мл

**21.** Доглядаючи за тяжкохворим, медична сестра двічі на день обробляє шкіру в місцях можливого утворення пролежнів. Який розчин вона має використати в даному випадку?

- A.** 10% розчин камфорного спирту
- B.** 70% розчин етилового спирту
- C.** 3% розчин перекису водню
- D.** 96% розчин етилового спирту
- E.** 0,9% розчин натрію хлориду

**22.** Медична сестра ревматологічного відділення, за призначенням лікаря, накладає водний зігрівальний компрес на ліктьовий суглоб. Термін накладання компресу становить:

- A.** 8-10 годин
- B.** 1-2 години
- C.** 3-4 години
- D.** 0,5-1 година
- E.** 4-5 годин

**23.** Хворий 53-х років звернувся до лікаря зі скаргами на схуднення, рідкі випорожнення (7-8 разів на добу), біль внизу живота. Був запідозрений хронічний коліт. Який ендоскопічний метод діагностики призначає лікар?

- A.** Колоноскопія
- B.** Фіброгастроуденоскопія
- C.** Цистоскопія
- D.** Рентгенографія органів травного каналу
- E.** Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

**24.** Медична сестра за призначенням лікаря проводить аутогемотерапію. Вона здійснила забір крові з вени. Взятую кров необхідно ввести:

- A.** Внутрішньом'язово у верхньозовнішній квадрант сідниці
- B.** Підшкірно в зовнішню поверхню плеча
- C.** Підшкірно в зовнішню поверхню стегна
- D.** Внутрішньом'язово у передньозовнішню поверхню стегна
- E.** Внутрішньом'язово в підлопаткову ділянку

1. До медсестри звернулася хвора 40-ка років із скаргами на загальну слабкість, зниження працездатності та бадьорості, погіршення пам'яті, раннє посивіння волосся, зниження еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння:

- A. Передчасне
- B. Сповільнене
- C. Прискорене
- D. Фізіологічне
- E. Нормальне

2. Пацієнт 46-ти років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах "летючого характеру", який посилюється при рухах, температуру  $37,5^{\circ}\text{C}$  ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A. Ревматичний артрит
- B. Туберкульозний артрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Гонорейний артрит
- E. Деформуючий остеоартроз

3. Хворий скаржиться на наростаючу м'язову слабкість, підвищену втомлюваність, зниження працездатності, безсоння, періодичний біль в животі, нудоту. Об'єктивно: шкірні покриви бронзового відтінку, відмічається пігментація слизової оболонки порожнини рота. Пульс - 80/хв., ритмічний, слабкого наповнення і напруження. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. Про яке захворювання можна подумати?

- A. Хвороба Аддісона
- B. Феохромоцитома
- C. Первинний альдостеронізм
- D. Нецукровий діабет
- E. Акромегалія

4. У пацієнта діагноз: гострий гломеруло-нефрит. Які зміни кольору сечі можна спостерігати при цьому захворюванні?

- A. Сеча кольору "м'ясних помиїв"
- B. Сеча кольору пива
- C. Сеча світло-жовта
- D. Сеча солом'яно-жовта
- E. Сеча біла

5. Пацієнту 32-х років, який лікується з приводу бронхіальної астми, лікар призначив загальний аналіз харкотиння. Яка з перерахованих ознак найбільш характерна для нього?

- A. Склоподібне, в'язке
- B. Гнійне
- C. Слизове
- D. Серозне
- E. Слизово-гнійне

6. Пацієнт госпіталізований в гематологі-

чне відділення з підозрою на гострий лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення?

- A. Стернальна пункція
- B. Біохімічний аналіз крові
- C. Загальний аналіз крові
- D. Коагулограма
- E. Загальний аналіз сечі

7. Пацієнтка 36-ти років звернулася до медичної сестри з приводу появи впродовж останніх декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного серцебиття, дратівливості, пітливості, схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з'явилися після стресу. Об'єктивно: стовщення ший в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A. Тиреотоксикоз
- B. Гіпотиреоз
- C. Ендемічний зоб
- D. Акромегалія
- E. Хвороба Аддісона

8. Медична сестра спостерігає за калом пацієнта 42-х років. Випорожнення рясні, смердючі, швидко стають водянистими, з домішками слизу і зеленуватим відтінком. Такий характер випорожнень вказує на хворобу:

- A. Сальмонельоз
- B. Шигельоз
- C. Холера
- D. Ботулізм
- E. Черевний тиф

9. Пацієнт 50-ти років доставлений у приймальне відділення з такими проблемами: гострий біль у ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку, триває понад 30 хвилин. Зі слів пацієнта: вживав нітроглицерин під язик тричі, але біль не минав. Яке захворювання запідозрить медична сестра?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Серцева астма
- C. Стенокардія
- D. Бронхіальна астма
- E. набряк легень

10. У хворого 30-ти років, що має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився загальний стан. З'явилися різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору "кавової гуці". Яке ускладнення виразкової хвороби найбільш імовірне?

- A. Шлункова кровотеча
- B. Перфорація виразки
- C. Малігнізація виразки
- D. Пенетрація виразки
- E. Стеноз воротаря

11. У хворого на цукровий діабет поступо-

во погіршується стан, з'явилися м'язова гіпотонія, млявість сухожильних рефлексів, шкіра бліда, суха, при диханні чути запах ацетону, артеріальна гіпотензія, тахікардія, нудота, тонус очних яблук знижений. Для якого стану характерні такі проблеми пацієнта?

- A.** Гіперглікемічна кома
- B.** Гіпоглікемічна кома
- C.** Печінкова кома
- D.** Уремічна кома
- E.** Мікседема

**12.** Жінка скаржиться на біль у надчеревній ділянці, що виникає через 3-4 години після їжі, вночі. Полегшення настає після прийняття їжі. Що запідозрить медична сестра?

- A.** Виразкова хвороба 12-палої кишки
- B.** Виразкова хвороба шлунка
- C.** Хронічний панкреатит
- D.** Хронічний гастрит
- E.** Хронічний холецистит

**13.** У приймальне відділення інфекційної лікарні доставлено хворого на 3-й день хвороби. Стан хворого важкий. Скарги на раптове підвищення температури, повторну носову кровотечу, біль у литкових м'язах, попереку. Об'єктивно: шкіра і склери помірно жовтушні, збільшені печінка, селезінка, впродовж 8 годин хворий не виділяє сечу. Яке захворювання у хворого?

- A.** Лептоспіроз
- B.** Інфекційний мононуклеоз
- C.** Герсиніоз
- D.** Вірусний гепатит
- E.** Малярія

**14.** У хворого 25-ти років температура тіла -  $38^{\circ}\text{C}$ , біль у горлі, мигдалики набряки гіперемовані, покриті щільною сірою плівкою, яка поширена на дужки, язичок, плівка не знімається, поверхня кровоточить. Імовірний діагноз:

- A.** Дифтерія ротоглотки
- B.** Скарлатина
- C.** Лакунарна ангіна
- D.** Паратонзиллярний абсцес
- E.** Інфекційний мононуклеоз

**15.** Пацієнт 62-х років звернувся до АЗ-ПСМ зі скаргами на блювання, відчуття нудоти натще і тяжкості у правому підребер'ї, слабкість, нездужання. Погіршення самопочуття пов'язує з прийомом жирної їжі, після якої з'являється гострий біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку. Хворіє протягом 3-х років. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки - з жовтушним відтінком. Печінка - біля краю реберної дуги. Позитивні симптоми: Кера, Ортнера. Яке захворювання може запідозрити сімейна медична сестра?

- A.** Хронічний холецистит
- B.** Гострий гастрит
- C.** Гепатит
- D.** Цироз печінки
- E.** Хронічний панкреатит

**16.** Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, серцебиття, зміни смаку (бажання їсти крейду). Згадані вище скарги виникли під час вагітності, продовжуються 1,5 року. Що запідозрить медична сестра?

- A.** Залізодефіцитна анемія
- B.** Апластична анемія
- C.**  $\text{B}_{12}$ -дефіцитна анемія
- D.** Гемолітична анемія
- E.** Гіпопластична анемія

**17.** Які препарати антитіл використовують для пасивної профілактики інфекційних хвороб?

- A.** Імуноглобуліни
- B.** Анатоксини
- C.** Вакцини
- D.** Антибіотики
- E.** Антикоагулянти

**18.** Який з симптомів буде позитивним у хворого на менінгіт?

- A.** Керніга
- B.** Бабінського
- C.** Моро
- D.** Ласега
- E.** Пастернацького

**19.** У пацієнта скарги на тупі ниючі болі під правим підребер'ям з іррадіацією під праву лопатку, відчуття гіркоти у роті. Лікарем призначене сліпе зондування з холекінетиками. Підготуйте необхідні лікарські засоби:

- A.** Сорбіт
- B.** Гастроцепін
- C.** Неогемодез
- D.** Анальгін
- E.** Супрастин

**20.** Під час внутрішньовенного введення цефтриаксону стан пацієнта раптово погіршився: шкіра бліда, волога. Пульс - 120/хв. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. Назвіть лікарські засоби, які застосує медична сестра для надання невідкладної допомоги під час залежних медсестринських втручань:

- A.** Адреналін, преднізолон
- B.** Клофелін, еуфілін
- C.** Дибазол, папаверин
- D.** Атропін, анаприлін
- E.** Наклофен, вольтарен

**21.** У пацієнта 62-х років - інфаркт міокарда. Який серед запропонованих нижче засобів застосує медична сестра за призна-

ченням лікаря для зняття больового синдрому?

- A.** Промедол
- B.** Еуфілін
- C.** Клофелін
- D.** Анаприлін
- E.** Строфантин

**22.** У пацієнта скарги на інтенсивний розпираючий головний біль без чіткої локалізації, нудоту, блювання, світлобоязнь, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ . При огляді: ригідність м'язів потилиці на 3 пальці, симптом Керніга з обох сторін. Рухи очних яблук обмежені, конвергенція порушена. Сухожилкові рефлексии D=S, високі. Парезів немає. Яку діагностичну процедуру треба провести для установлення діагнозу?

- A.** Люмбальна пункція
- B.** Фіброгастроскопія
- C.** Електроенцефалографія
- D.** Плевральна пункція
- E.** Біохімічний аналіз крові

**23.** У хворої 32-х років при медсестринському обстеженні на шкірі правої гомілки виявлено вогнище еритеми та набряку на тлі яких розташовуються папули, мікроезикали, точкові ерозії; на поверхні яких виступають крапельки серозного ексудату у вигляді роси. Якому захворюванню відповідають наведені дані об'єктивного обстеження?

- A.** Справжня екзема
- B.** Мікробна екзема
- C.** Професійна екзема
- D.** Себорейна екзема
- E.** Паратравматична екзема

**24.** Хвора 36-ти років потрапила у стаціонар, скаржиться на виражену задишку, періодичні болі в ділянці серця, швидку втомлюваність, запаморочення. В анамнезі: ревматична хвороба. У пацієнтки діагностовано: аортальний стеноз. Якого зручного положення надасть медична сестра пацієнтці?

- A.** Напівсидячого Фаулера
- B.** На лівому боці
- C.** Горизонтального
- D.** Положення Сімса
- E.** На правому боці

**25.** Медсестра поліклініки надає допомогу хворому на стенокардію, який скаржиться на біль стискаючого характеру за грудною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати у першу чергу?

- A.** Нітрогліцерин
- B.** Ніфедипін
- C.** Аспірин
- D.** Атенолол
- E.** Папаверин

**26.** Хворий 19-ти років знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні. Відмічається різке погіршення стану: температура тіла -  $39^{\circ}\text{C}$ , блідість шкірних покривів, з'явилася "зірчаста" геморагічна висипка, з некрозом у середині, переважно на сідниці та нижніх кінцівках. АТ- 90/40 мм рт.ст. Про яке захворювання слід думати?

- A.** Менінгококцемія
- B.** Сибірковий сепсис
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Геморагічний діатез
- E.** Висипний тиф

**27.** Пацієнту, хворому на цукровий діабет, ввели 32 ОД інсуліну. Раптово у нього з'явилися різка слабкість, пітливість, відчуття голоду і він втратив свідомість. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Гіпоглікемічна кома
- B.** Кетоацидотична кома
- C.** Уремична кома
- D.** Непритомність
- E.** Печінкова кома

**28.** Хвора 56-ти років вагою 120 кг звернулася зі скаргами на ниючий біль в колінних, гомілкових та кульшових суглобах, який виникає під час рухів і в стані спокою, підсилюється під вечір, при зміні погоди і при фізичному навантаженні, кульгавість при ході. Колінні суглоби деформовані. Рухи супроводжуються хрускотом. Це характерно для:

- A.** Деформуючого остеоартрозу
- B.** Подагричного артриту
- C.** Псоріатичного артриту
- D.** Ревматоїдного артриту
- E.** Реактивного артриту

**29.** Пацієнт скаржиться на схуднення, загальну слабкість, біль в правій підреберній ділянці, здуття живота, нудоту, свербіж шкіри. При огляді: асцит, розширена венозна сітка навколо пупка, жовтяничний відтінок шкіри і склер. В анамнезі: вірусний гепатит. Дієти не дотримувався, зловживав алкоголем. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Цироз печінки
- B.** Хронічний гепатит
- C.** Хронічний панкреатит
- D.** Хронічний холецистит
- E.** Хронічний ентероколіт

**30.** У хворого 29-ти років раптово з'явилася загальна слабкість, головний біль, носова та легенева кровотечі, біль у горлі під час ковтання. Об'єктивно: температура

тіла -  $39,0^{\circ}\text{C}$ , у мигдаликах - виразково-некротичні зміни. Збільшені шийні, пахвові лімфатичні вузли, спленомегалія. В аналізі крові: бласти. Клінічна картина характерна для:

- A.** Гострий лейкоз
- B.** Виразково-некротична ангіна
- C.** Гіпопластична анемія
- D.** Геморагічний діатез
- E.** Постгеморагічна анемія

**31.** У хворої 27-ми років під час профогляду виявлено пухлину в черевній порожнині. Менструальний цикл не порушений. Під час піхвового дослідження: матка й ліві придатки не змінені. Справа в ділянці придатків - тугоеластичне утворення до 8 см у діаметрі, рухоме, неболіuche, з гладенькою поверхнею. Який діагноз можна припустити?

- A.** Кіста правого яєчника
- B.** Субсерозна міома матки
- C.** Ектопічна вагітність
- D.** Правобічний піосальпінкс
- E.** Рак тіла матки

**32.** Пацієнт 48-ми років скаржитись на постійну задишку, періодично біль в грудній клітці, кашель. Хворіє 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Грудна клітка джкоподібної форми. Над легенями коробковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Пневмоконіоз
- B.** Хронічний бронхіт
- C.** Бронхоектатична хвороба
- D.** Туберкульоз легень
- E.** Рак легень

**33.** У тракториста після обприскування сільськогосподарських угідь фосфорорганічними пестицидами з'явилися слинотеча, блювання. Об'єктивно: міоз, блідість шкіри, АТ- 80/50 мм рт.ст. Який препарат слід

застосувати при наданні медичної допомоги?

- A.** Атропін
- B.** Адреналін
- C.** Кофеїн
- D.** Унітіол
- E.** Хлористий кальцій

**34.** Пацієнтка доставлена в приймальне відділення зі скаргами на слинотечу, нудоту, блювання, біль у животі, сльозоточивість, порушення зору. Ці явища виникли після знищування мух і комарів. Яке отруєння запідозрити медична сестра у пацієнта?

- A.** Фосфорорганічними сполуками
- B.** Метилловим спиртом
- C.** Чадним газом
- D.** Хлорорганічними сполуками
- E.** Ртутьорганічними сполуками

**35.** У пацієнта 60-ти років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, виник напад ядухи, кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A.** набряк легень
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Легенева кровотеча
- D.** Тромбоемболія легеневої артерії
- E.** Напад бронхіальної астми

**36.** До приймального відділення звернулась жінка із скаргами на запаморочення, нудоту, сильний головний біль в ділянці потилиці, миготіння мушок перед очима. Об'єктивно: обличчя гіперемійоване, пульс - 92/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Гіпертонічний криз
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Гіпотонічний криз
- D.** Ішемічний інсульт
- E.** Напад мігрені



1. Швидка допомога приїхала на місце ДТП. Чоловік 30-ти років скаржиться на біль, відсутність рухів в правій нозі. При огляді: у середній третині гомілки набряк, деформація, патологічна рухомість. Що потрібно застосувати для транспортної іммобілізації?

- A. Шини Крамера
- B. Шини Дітерікса
- C. Шини Ентіна
- D. Шини Белера
- E. Еластичний бинт

2. При ушкодженні порожнистих органів черевної порожнини відсутня печінкова тупість, а при рентгенологічному дослідженні визначається ознака:

- A. Повітря під куполом діафрагми
- B. Чашки Клойбера
- C. Роздуті петлі кишечника
- D. Горизонтальні рівні рідини
- E. Гаустрація кишечника

3. При огляді хворого 38-ми років, з ножовим пораненням грудної клітки Ви виявили, що рана "дихає" - чути "свист", в момент вдиху повітря виходить із рани, при видиху - заходить в плевральну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A. Відкритий пневмоторакс
- B. Клапанний пневмоторакс
- C. Перелом ребер
- D. Поранення серця
- E. Закритий пневмоторакс

4. Медсестру викликали в палату до пацієнтки, у якої почалася кровотеча з варикозної виразки у ділянці нижньої третини лівої гомілки. Пацієнтка налякана, скаржиться на слабкість. Вкажіть незалежні втручання медичної сестри:

- A. Накласти стискаючу пов'язку
- B. Накласти артеріальний джгут
- C. Накласти венозний джгут
- D. Викликати лікаря
- E. Виміряти пульс та артеріальний тиск

5. Хвора страждає на нирковокам'яну хворобу. Який характерний симптом при загостренні цього захворювання?

- A. Пастернацького
- B. Ровзінга
- C. Сітковського
- D. Роздольського
- E. Образцова

6. Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні серцево-легеневої реанімації?

- A. 2 вдихання - 30 компресій
- B. 2 вдихання - 20 компресій
- C. 2 вдихання - 15 компресій
- D. 1 вдихання - 5 компресій
- E. 5 вдихань - 10 компресій

7. Каретою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлено чоловіка 55-ти років зі скаргами на одноразове блювання "кавовою гущею", виражену загальну слабкість протягом двох діб. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ- 105/75 мм рт.ст., ЧСС- 97/хв. До якого обстеження слід готувати пацієнта?

- A. Фіброгастроскопія
- B. Рентгенографія
- C. Лапароскопія
- D. Цистоскопія
- E. Мамографія

8. Яку терапію в першу чергу потрібно проводити хворим з черепно-мозковою травмою при підвищенні внутрішньочерепного тиску?

- A. Дегідратаційну
- B. Десенсибілізуючу
- C. Антибіотикотерапію
- D. Седативну
- E. Протишокову

9. Ви працюєте на здоров'я великого підприємства де в цеху сталася виробнича травма. Потерпілий поранив склом ліве передпліччя. З рани витікає пульсуючим струменем з поштовхами яскраво-червона кров. Вкажіть Ваші дії:

- A. Накласти артеріальний джгут Есмарха
- B. Накласти міхур з льодом на рану
- C. Лігувати судину в рані
- D. Накласти тугу стискаючу пов'язку на рану
- E. Провести тугу тампонаду рани

10. Жінка 44-х років госпіталізована з приводу численних травм. Визначаються загально мозкові і менінгеальні ознаки, симптом окулярів, спостерігались кровотеча і лікворея з носа. Що Ви запідозрите у потерпілої?

- A. Перелом основи черепа
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Струс головного мозку
- D. Стиснення головного мозку
- E. Забій головного мозку

11. Студент 21-го року, під час перерви обідав у їдальні та жваво розмовляв. Раптово шматок їжі потрапив в дихальні шляхи. Студент почав задихатись. Надайте невідкладну допомогу:

- A. Прийом Геймліха
- B. Потрійний прийом Сафара
- C. ШВЛ "рот до рота"
- D. Прийом Селліка
- E. Прекардіальний удар

12. Медичну сестру викликали до потерпілого 18-ти років, який під час бійки отримав удар ногою в живіт. Об'єктивно: хворий блідий, Рс- 120/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., живіт болючий, напружений, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга в правому підреб'ї. Яка медсестринська тактика в даному випадку?

- A. Холод на живіт, голод, госпіталізація
- B. Холод на живіт введення знеболюючих
- C. Грілка на живіт, госпіталізація
- D. Введення знеболюючих
- E. Введення спазмолітиків, госпіталізація

13. Хворий знаходиться в стані клінічної смерті. З чого потрібно розпочати реанімаційні заходи?

- A. Потрійного прийому Сафара
- B. ШВЛ
- C. Непрямого масажу серця
- D. Прямого масажу серця
- E. Не має суттєвого значення

14. Пацієнтка 26-ти років, після дорожньо-транспортної пригоди скаржитися на біль в ділянці лівої ключиці, неможливість рухати лівою рукою. Об'єктивно: деформація лівої ключиці, гематома та набряк. Яке ушкодження слід запідозрити?

- A. Перелом ключиці
- B. Вивих ключиці
- C. Перелом I ребра
- D. Забій грудної клітки
- E. Пневмоторакс

15. З метою швидкої компенсації крововтрати пацієнту через катетер у підключичну вену перелито 1000 мл одноступінчастої донорської крові. Наприкінці гемотрансфузії у пацієнта з'явилися занепокоєння, блідість шкіри, тахікардія, судоми м'язів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Цитратний шок
- B. Геморагічний шок
- C. Повітряна емболія
- D. Гостре розширення серця
- E. Алергічна реакція

16. У жінки скарги на різкий біль, свербіння, відчуття жару в лівій гомілці. Температура тіла - 38,8°C. Хворіє 2 доби. При огляді: в ділянці гомілки набряк, розлите почервоніння з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, є окремі пухирі, наповнені жовтуватим вмістом. Що з пацієнткою?

- A. Бешиха
- B. Еризипелоїд
- C. Флегмона
- D. Остеомієліт
- E. Актиномікоз

17. В хірургічне відділення поступив пацієнт 56-ти років з масивною крововтратою. Стан важкий. Група крові ще невідома. Назвіть препарат, з якого слід почати поповнювати крововтрату:

- A. Реополіглюкін
- B. Плазма
- C. Полідез
- D. Неогемодез
- E. Сорбілакт

18. Ви працюєте медичною сестрою в шкільному медпункті. До Вас звернувся учень 10-го класу, якого 5 хвилин назад вкусив за гомілку собака. При огляді: загальний стан потерпілого задовільний. В нижній третині гомілки, по задній поверхні відзначаються дві неглибокі рани, з яких повільно витікає невелика кількість темної крові. Яка першочергова дія медичної сестри?

- A. Промити рану мильним розчином
- B. Обробити шкіру кутасептом
- C. Промити рану перекисом водню
- D. Промити рану розчином фурациліну
- E. Накласти стискаючу пов'язку

19. Під час пожежі потерпілий отримав опік правої китиці. Медична сестра обстежуючи місце пошкодження діагностувала опік IV ступеня. Яка характерна ознака говорить про це?

- A. Обвуглення м'яких тканин та кісток
- B. Некроз всієї товщі шкіри
- C. Некроз сосочкового шару
- D. Поява міхурів з жовтуватим вмістом
- E. Поява міхурів з геморагічним вмістом

20. При наданні невідкладної допомоги у разі травматичного шоку пацієнту необхідно ввести наркотичний анальгетик. Який з препаратів **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** для введення внаслідок пригнічення дихання?

- A. Морфін
- B. Промедол
- C. Омнопон
- D. Кодеїн
- E. Фентаніл

21. Хворий 26-ти років звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці і його подальше переміщення в праву клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об'єктивно: хворий блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Яке захворювання спостерігається у хворого?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Пахвинна грижа
- E.** Гепатит В

**22.** У хірургічне відділення доставлено хворого, який скаржиться на тупий, постійний, оперізуючий біль у надчеревній ділянці, нудоту і блювання, яке не полегшує стан хворого. Стан хворого важкий, живіт здутий, болючий при пальпації в усіх відділах, шкіра на животі ціанотична. Позитивний симптом Мейо-Робсона. У сечі підвищений рівень діастази. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A.** Гострий панкреатит
- B.** Гостра кишкова непрохідність
- C.** Гострий холецистит
- D.** Защемлення грижі
- E.** Гострий апендицит

**23.** До Вас звернувся чоловік 47-ми років зі скаргами на погіршення загального стану, температура тіла -  $39^{\circ}\text{C}$ , озноб, біль у потиличній ділянці шиї. Хворіє 5 днів. Об'єктивно: на потиличній ділянці шиї щільний інфільтрат діаметром до 6 см, шкіра над ним яскраво-червона. В центрі інфільтрату шкіра має багряно-синюшний колір, є декілька отворів, з яких виділяється густий зелений гній. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A.** Карбункул
- B.** Фурункул
- C.** Бешиха
- D.** Абсцес
- E.** Гідраденіт

**24.** Пацієнт 25-ти років звернувся до медсестри з забитою раною лівого плечового суглоба. Медсестра провела туалет рани, наклала стерильну серветку. Якою пов'язкою необхідно зафіксувати перев'язувальний матеріал?

- A.** Колосовидною
- B.** Косинковою
- C.** Зворотною
- D.** Черепашачою
- E.** Спиральною

**25.** До сімейної медичної сестри звернулася мати з дитиною віком 1 місяць зі скаргами на постійні закисання правого ока з народження. При натисканні на область слізної мішки із нижньої слізної точки виділяється гній. Яке захворювання запідозрить медична сестра?

- A.** Дакріюцистит новонароджених
- B.** Гострий дакріоденіт
- C.** Гострий кон'юнктивіт
- D.** Гострий іридоцикліт
- E.** Гострий кератит

**26.** Ви медична сестра комбустіологічного відділення, де знаходиться пацієнт з опіками, передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте % площі опіку:

- A.** 28
- B.** 18
- C.** 9
- D.** 36
- E.** 25

**27.** Прибувши на місце аварії, у потерпілого діагностували множинний перелом ребер. Потерпілому надана перша медична допомога та вирішено транспортувати його в лікувальний заклад. В якому положенні слід здійснювати транспортування пацієнта?

- A.** В напівсидячому
- B.** Лежачи на спині
- C.** Лежачи на животі
- D.** На спині на щиті
- E.** Лежачи на здоровому боці

**28.** Ви обстежуєте пацієнта після травми живота. Запідозрили пошкодження порожнистого органу черевної порожнини. Який основний симптом характерний при цьому?

- A.** Щоткіна-Блюмберга
- B.** Бабінського
- C.** Пастернацького
- D.** Грекова-Ортнера
- E.** Василенка

**29.** У міському парку перехожі знайшли чоловіка без ознак життя. При огляді: свідомість відсутня, дихання та пульсу на сонних артеріях немає, зіниці розширені, рогівка блискуча. Ваші дії:

- A.** Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B.** Викликати швидку допомогу
- C.** Викликати поліцію
- D.** Констатувати біологічну смерть
- E.** Не чіпати постраждалого

**30.** При рентгенологічному дослідженні органів черевної порожнини на знімку виявляються чаші Клойбера. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Кишкова непрохідність
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Піддіафрагмальний абсцес
- E.** Міжпетельний абсцес

1. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

- A. При кашлюку
- B. При туберкульозі
- C. При дифтерії
- D. При менінгококовій інфекції
- E. При скарлатині

2. У дівчинки 2-х років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені гострики. Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та медикаментозного лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань вкажіть контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини:

- A. Зіскоб на ентеробіоз
- B. Загальний аналіз крові
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Дослідження калу на яйця гельмінтів
- E. Копрологічне дослідження

3. Дитині 1 місяць. На 2-му тижні життя з'явилось блювання. Останній тиждень блювання виникає після кожного годування у вигляді "фонтану". Об'єм блювотних мас перевищує об'єм висмоктаного молока. Дефіцит маси тіла - 8%. Про яке захворювання можна подумати?

- A. Пілоростеноз
- B. Пілороспазм
- C. Гіпотрофія
- D. Проста диспепсія
- E. Кишковий токсикоз

4. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфозвулів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. Із яких ділянок необхідно провести мазок?

- A. Із зів та носа
- B. Із задньої стінки горла
- C. Із зів
- D. З-під язика
- E. Із носогорла

5. Ви, медсестра дитячої лікарні, спостерігаєте за 10-місячною дитиною з діагнозом ГРВІ. Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилася до  $39,2^{\circ}\text{C}$ , відмовляється від груді, різко збуджена, при натискуванні на козелок плаче. Яке ускладнення можна запідозрити?

- A. Гострий середній отит
- B. Пневмонія
- C. Гострий бронхіт
- D. Несправжній круп
- E. Справжній круп

6. Ви дільнична медична сестра складаєте план введення щеплення проти дифтерії, коклюшу і правцю. Вкажіть, який контингент дітей за віком Ви внесете в свій план:

- A. 3-4 місяці життя
- B. 15-18 місяців життя
- C. 11-12 місяців життя
- D. 5-7 день життя
- E. 8-10 місяців життя

7. Після проведення вакцинації медична сестра кабінету профілактичних щеплень повинна спостерігати за дитиною протягом:

- A. 30 хвилин
- B. 1 години
- C. 2-х годин
- D. 3-х годин
- E. 4-х годин

8. Хлопчику 3 дні. При сповиванні дитини медсестра помітила на пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м'язовий тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе з грудей молоко. Кількість сечовипускань - 10 разів за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Ці симптоми характерні для:

- A. Сечокислого інфаркту
- B. Гострого пієлонефриту
- C. Гострого гломерулонефриту
- D. Гострого циститу
- E. Хронічного пієлонефриту

9. Дівчинка 14-ти років скаржиться на неспокій, плаксивість, пітливість, підвищений апетит, схуднення. Об'єктивно: температура тіла -  $37,5^{\circ}\text{C}$ , вологі долоні, тремтіння повік і язика, тахікардія, екзофтальм, блиск очей. Про яке захворювання йдеться?

- A. Дифузний токсичний зоб
- B. Вегето-судинна дистонія
- C. Гіпофізарний нанізм
- D. Цукровий діабет
- E. Гіпотиреоз

10. Дитині 2 роки. Поступила в інфекційне відділення зі скаргами на підвищення температури до  $39^{\circ}\text{C}$ , часті рідкі випорожнення зеленого кольору. Лікар призначив планове обстеження. Яке першочергове обстеження здійснить медсестра?

- A.** Взяти кал на бактеріологічне обстеження
- B.** Взяти кал на яйця глистів
- C.** Взяти сечу для загального аналізу
- D.** Взяти кров на загальний аналіз
- E.** Взяти кал на копрологічне обстеження

**11.** Під час медичного огляду новонародженої дівчинки 6-ти днів життя медсестра виявила нагрубання молочних залоз. При якому стані зустрічається така проблема?

- A.** Статевий криз
- B.** Мастит
- C.** Фізіологічна еритема
- D.** Фізіологічна лихоманка
- E.** Фізіологічна жовтяниця

**12.** Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. В одній з груп захворіла дитина на епідемічний паротит. Карантин триватиме:

- A.** 21 день
- B.** 7 днів
- C.** 10 днів
- D.** 25 днів
- E.** 9 днів

**13.** Дитині 7 місяців. Поступила в відділення інтенсивної терапії з діагнозом стенозуючий ларинготрахеїт II ст. Яка ознака є характерною?

- A.** Інспіраторна задишка
- B.** Кашель
- C.** Змішана задишка
- D.** Експіраторна задишка
- E.** Брадикардія

**14.** Для обстеження дитини 6-ти років необхідно зібрати сечу для проби за Нечипоренком. Визначте методику збору сечі для дослідження:

- A.** Середня порція
- B.** Вісім порцій
- C.** Протягом доби
- D.** Кожні 3 години
- E.** Нічна порція

**15.** Ви - медична сестра дитячої поліклініки. Дитині 5-ти років проведена проба Манту. Через 72 години на внутрішній поверхні передпліччя медична сестра виявила гіперемію розміром 5 мм, папула відсутня. Як оцінити результат проби?

- A.** Сумнівна реакція
- B.** Негативна реакція
- C.** Позитивна реакція
- D.** Гіперергічна реакція
- E.** Позитивна наростаюча реакція

**16.** У дитини 6-ти років на шкірі дрібнокрапчаста висипка з чистим носогубним трикутником. Для якого захворювання характерна дана висипка?

- A.** Скарлатина
- B.** Кір
- C.** Краснуха
- D.** Менінгококцемія
- E.** Вітряна віспа

**17.** У дитячому садку спалах дизентерії. Медична сестра проводить забір матеріалу для бактеріологічного дослідження. Який збудник викликає дане захворювання?

- A.** Шигела
- B.** Паличка Коха
- C.** Паличка Борде-Жангу
- D.** Паличка Лефлера
- E.** Стрептокок

**18.** У дитини 5-ти років скарги на нежить, кашель, світлобоязнь, температуру тіла - 38°C. На шкірі обличчя і за вухами плямисто-папульозний висип, який місцями зливається. Лікар діагностував кір. На який термін слід ізолювати дитину?

- A.** До 5-го дня від моменту появи висипки
- B.** До 25-го дня від початку хвороби
- C.** До 3-го тижня
- D.** До 9-го дня від початку хвороби
- E.** На 22 день від початку хвороби

**19.** Мама дитини 6-ти місяців яка знаходиться на штучному вигодовуванні цікавиться у патронажної медичної сестри: "З якого віку можна давати дитині яєчний жовток?"

- A.** З 7 місяців
- B.** З 5 місяців
- C.** З 10 місяців
- D.** З 9 місяців
- E.** Не давати до 1 року

**20.** Проти яких інфекційних хвороб, згідно календаря профілактичних щеплень, проводиться вакцинація здоровим доношеним новонародженим дітям в пологовому будинку?

- A.** Гепатиту В, туберкульозу
- B.** Кору, краснухи, епідемічного паротиту
- C.** Дифтерії, кашлюку, правця
- D.** Поліомієліту, менінгокової інфекції
- E.** Гемофільної інфекції

**21.** До медичної сестри звернулася мати з 5-річною дитиною, у якої після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, зміна кольору сечі. Сеча стала кольору "м'ясних помив". При огляді: шкіра бліда, пастозна. Артеріальний тиск підвищений. Для якої хвороби характерні такі симптоми?

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Гострий цистит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Гостра ревматична лихоманка
- E.** Хронічна інфекція сечовивідних шляхів

**22.** Медична сестра у 1,5-річної дитини ви-

явила такі симптоми: підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , млявість, розлади сну, тахікардію, вологий кашель, задишку змішаного типу, блідість шкіри, ціаноз. Вкорочення перкуторного звуку, при аускультатії під нижнім кутом правої лопатки вислуховується крепітація. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Гостра пневмонія
- B.** Хронічний бронхіт
- C.** Ексудативний плеврит
- D.** Бронхіальна астма
- E.** Гострий ларинготрахеїт

**23.** Медична сестра у дівчини 14-ти років виявила наступні симптоми: болі у животі, нудота, блювання. При огляді: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча темна, кольору "пива". Який найбільш імовірний

діагноз?

- A.** Вірусний гепатит
- B.** Холецистит
- C.** Апендицит
- D.** Панкреатит
- E.** Гастродуоденіт

**24.** У дитини віком 5 років спостерігаються серозні виділення з носа, кашель, світлобоязнь, слезотеча. На слизовій щік - рясні дрібні висипання білого кольору з червоним обідком, які виступають над поверхнею шкіри. Яких ознак слід очікувати в наступні дні хвороби?

- A.** Плямисто-папульозні висипання
- B.** Збільшення задньошийних лімфовузлів
- C.** Спазматичний кашель з репризами
- D.** Часті рідкі випорожнення
- E.** Геморагічна висипка зірчастої форми

1. Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронічним двобічним аднекситом. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнтки?

- A. Безпліддя
- B. Маткова кровотеча
- C. Вульвовагініт
- D. Гнійні білі
- E. Відсутність менструацій

2. Медична сестра готує набір інструментів. Вкажіть, за допомогою якого інструмента проводять інструментальну ревізію порожнини матки:

- A. Кюретка
- B. Конхотом
- C. Скальпель
- D. Абортцанг
- E. Ложечка Фолькмана

3. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра визначила: артеріальний тиск - 190/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній черевний стінці, обличчі. В сечі наявність білка. Для якої патології характерна дана симптоматика?

- A. Прееклампсія III ступеня
- B. Прееклампсія II ступеня
- C. Прееклампсія I ступеня
- D. Гіпертензія вагітних
- E. Водянка вагітних

4. У гінекологічне відділення поступила жінка 30-ти років, з підозрою на запальне захворювання жіночих статевих органів. Яке сестринське втручання потрібно провести для уточнення діагнозу?

- A. Взяття мазків з вагіни, уретри та цервікального каналу
- B. Дослідження за допомогою дзеркал
- C. Зондування матки
- D. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- E. Кольпоцитологічне дослідження

5. Ви медична сестра жіночої консультації. Проводите заняття серед вагітних стосовно перебігу пологів, демонструєте біомеханізм пологів. Який перший момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання?

- A. Згинання голівки
- B. Додаткове згинання голівки
- C. Внутрішній поворот голівки
- D. Розгинання голівки
- E. Внутрішній поворот плечей, зовнішній голівки

6. При зовнішньому обстеженні вагітної за допомогою прийомів Леопольда-Левицького виявлено, що спинка плода лі-

воруч, над входом в малий таз пальпується м'яка, небалотуюча частина плода. Визначте позицію та передлежання плода:

- A. I позиція, сідничне передлежання
- B. I позиція, головне передлежання
- C. II позиція, сідничне передлежання
- D. II позиція, головне передлежання
- E. I позиція, поперечне передлежання

7. До жіночої консультації звернулася вагітна у терміні 28 тижнів. Після проведення зовнішнього акушерського обстеження за Леопольдом-Левицьким було визначено, що голівка знаходиться у дні матки, спинка з лівого боку та повернута допереду. Визначте вид позиції плода в цьому випадку:

- A. Передній
- B. Задній
- C. Боковий
- D. Головний
- E. Тазовий

8. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода:

- A. Нижче пупка ліворуч
- B. Вище пупка праворуч
- C. Нижче пупка праворуч
- D. Вище пупка ліворуч
- E. На рівні пупка

9. Пацієнтка 24-х років скаржиться на появу рясних пінистих білей жовтого кольору з неприємним запахом, відчуття свербіння у ділянці зовнішніх статевих органів та піхви, болючість при сечовипусканні. Яке захворювання має таку клінічну картину?

- A. Трихомоніаз
- B. Кандидоз
- C. Уреаплазмоз
- D. Мікоплазмоз
- E. Хламідіоз

10. При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні реберних дуг. При одноплідній вагітності це відповідає:

- A. 36 тижням вагітності
- B. 24 тижням вагітності
- C. 28 тижням вагітності
- D. 32 тижням вагітності
- E. 40 тижням вагітності

11. Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- A.** Загальнорівномірнозвужений таз
- B.** Поперечнозвужений таз
- C.** Косозміщений таз
- D.** Плоский таз
- E.** Звужений таз

**12.** Жінці 30-ти років в жіночій консультації встановлений діагноз: ерозія шийки матки. Який метод обстеження потрібно

використати?

- A.** Кольпоскопія
- B.** Лапароскопія
- C.** Гістероскопія
- D.** Цистоскопія
- E.** Гістеросальпінгографія



1. На початку ін'єкції при внутрішньому-язовому введенні пеніциліну у дитини 8-ми років з'явилися свербіння шкіри і почуття жару в грудях. Медична сестра закінчила ввести пеніцилін, викликала лікаря, поклала дитину на кушетку, приклала міхур з льодом до місця ін'єкції, провела оксигенотерапію. Які дії медсестри були помилковими?

- A. Продовження введення пеніциліну
- B. Розташування дитини в горизонтальному положенні
- C. Прикладання холоду на місце ін'єкції
- D. Проведення оксигенотерапії
- E. Звертання за допомогою лікаря

2. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

- A. Трахеотомія
- B. Подання зволоженого кисню
- C. Відволікаюча терапія
- D. Антигістамінні засоби
- E. Парові інгаляції

3. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

- A. Інсулін короткої дії
- B. Інсулін пролонгованої дії
- C. 40% розчин глюкози
- D. Фізіологічний розчин
- E. 5% розчин глюкози

4. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темно-червоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

- A. Венозної кровотечі
- B. Артеріальної кровотечі
- C. Капілярної кровотечі
- D. Пульсуючої кровотечі
- E. Паренхіматозної кровотечі

5. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підбер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

- A. Жовчної коліки
- B. Шлункової кровотечі
- C. Ниркової коліки
- D. Кишкової кровотечі
- E. Кишкової коліки

6. Яке ускладнення може розвинути в гострий період інфаркту міокарда?

- A. Кардіогенний шок
- B. Непритомність
- C. Анафілактичний шок
- D. Пневмонія
- E. Носова кровотеча

7. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

- A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- B. Загроза переривання вагітності
- C. Передлежання плаценти
- D. Передчасні пологи
- E. Загроза розриву матки

8. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

- A. Знеболювання, введення плазмозамінників
- B. Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- C. Знеболювання, гемотрансфузія
- D. ШВЛ, непрямий масаж серця
- E. ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

9. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

- A. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B. Чекати прибуття швидкої допомоги
- C. Повернути потерпілого набік
- D. Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- E. Виміряти артеріальний тиск

10. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

- A. Твердий щит
- B. Шину Дітерікса
- C. Шину Крамера
- D. Шину Єланського
- E. Лямки

11. До приймального відділення швидка

допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4x3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

- A.** Нейрохірургічне
- B.** Неврологічне
- C.** Хірургічне
- D.** Терапевтичне
- E.** Діагностичне

**12.** У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

- A.** Свинцем
- B.** Ртуттю
- C.** Хлорорганічними сполуками
- D.** Пестицидами
- E.** Фосфорорганічними сполуками

**13.** Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

- A.** Ніж не видаляти
- B.** Ввести спазмолітики
- C.** Ніж видалити
- D.** Ввести кордіамін
- E.** Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

**14.** Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

- A.** Промивання шлунку і кишок
- B.** Дезінтоксикаційна терапія
- C.** Послаблюючі засоби
- D.** Очисна клізма
- E.** Посилене пиття

**15.** 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

- A.** 25-30
- B.** 10-15
- C.** 15-20
- D.** 80-100
- E.** 100-120

**16.** Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкри-

та потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

- A.** Горизонтальне з припіднятими ногами
- B.** Напівсидяче положення
- C.** Вертикальне положення
- D.** Лежачи на лівому боці
- E.** Лежачи на правому боці

**17.** В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекидає внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

- A.** Повне передлежання плаценти
- B.** Бокове передлежання плаценти
- C.** Крайове передлежання плаценти
- D.** Неповне передлежання плаценти
- E.** Прироснення плаценти

**18.** У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короткочасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

- A.** Порушена позаматкова вагітність
- B.** Апоплексія яєчника
- C.** Прогресуюча позаматкова вагітність
- D.** Гострий аднексит
- E.** Гострий ендометрит

**19.** До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ- 170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

- A.** Еклампсія
- B.** Геморагічний інсульт
- C.** Менінгоенцефаліт
- D.** Пухлина головного мозку
- E.** Епілепсія

**20.** До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на ясні кров'яні виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть

клінічну ситуацію:

- A.** Аборт у ходу
- B.** Аборт, що не відбувся
- C.** Неповний аборт
- D.** Загроза аборту
- E.** Повний аборт

**21.** До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3x1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

- A.** Стискаюча пов'язка
- B.** Оклюзійна пов'язка
- C.** Пальцеве притиснення артерії
- D.** Згинання кінцівки в суглобі
- E.** Накладання джгута

**22.** У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- A.** набряк Квінке
- B.** Анафілактичний шок
- C.** Серцева астма
- D.** Бронхіальна астма
- E.** Кропив'янка

**23.** До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

- A.** Магнію сульфат
- B.** Корглікон
- C.** Кордіамін
- D.** Анальгін
- E.** Адреналін

**24.** У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

- A.** Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- B.** Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- C.** Зондування матки
- D.** Пельвіометрія
- E.** Кольпоскопія