

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

ID студента										Прізвище									

Варіант _____

Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

Крок М

АКУШЕРСЬКА СПРАВА



ІНСТРУКЦІЯ

Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та заمالуйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.

ББК 54.1я73
УДК 61

Автори тестових завдань: Амеліна Л.О., Аргудяєва Н.П., Барановська Т.К., Бачинський В.П., Бібікова В.О., Біланчук Т.І., Блошко Т.О., Бобак К.М., Боброва Т.І., Бойко О.В., Бондаренко В.П., Бурмістрова Л.М., Бутенко С.А., Васюк Ю.В., Вибіцька О.В., Воєвода О.Д., Волошина В.В., Габорець В.І., Голопят Л.В., Гриневич Т.П., Грошева О.Ю., Гулянич Т.І., Давиденко Л.В., Демчур Л.В., Диліна Т.І., Диченко М.І., Дідовська С.О., Дідух О.О., Дрегалюк В.С., Дяченко М.Г., Желтуцька І.Ю., Жовнерчук В.Р., Завішева Л.І., Здиховська Л.Г., Зінабадінова Т.Ф., Зотова А.В., Іванків О.Я., Калагіна В.Ю., Кальченко В.П., Кануннікова О.В., Касевич Н.М., Катеринчук О.І., Кекіна Л.О., Кирилова І.Є., Кіденко О.В., Кіясова О.Л., Кобилянська О.М., Кравців В.В., Луценко Н.М., Лушпай Л.В., Макарова В.К., Мартинова С.Г., Медведєва О.Л., Мороз Л.О., Морозюк І.П., Мосійчук Л.Г., Москаленко Л.М., Москалькова Н.М., Муратова-Дзюбан С.М., Мухіна Т.С., Ніжнік Г.І., Ніколаєва Л.М., Новосельська О.І., Омельяненко В.А., Пелепець Ю.О., Первак Т.І., Пестун Т.М., Петренко А.М., Печериця Н.О., Підлісна В.В., Плачинта І.М., Плотникова В.Н., Полстянко Н.М., Пузій В.В., Распопова А.Є., Рачинська І.М., Романюк В.С., Сензюк Н.В., Середа М.П., Сидоренко Т.І., Симонович Л.І., Сінельнікова Р.М., Смірнов Ю.В., Собко С.Ю., Соколовська І.Л., Соломаха К.В., Спірева В.І., Степанківська О.В., Степанова Г.М., Стефанчук О.Р., Сухенко М.М., Тихий В.П., Тофан Г.Д., Федотова Н.К., Фініченко А.К., Харук П.Ф., Хащініна О.С., Цалковська Г.В., Цибаньов О.А., Черник Л.Л., Черняк Т.І., Чуприна О.С., Шведа Ю.І., Шулятицька С.М., Юркул С.В., Яковенко Н.П., Якубович Н.О., Янголенко І.Б., Янова О.В., та комітети фахової експертизи.

Рецензенти. Експерти: Акчуріна О.О., Вовк В.Т., Гарасимчук Є.Б., Держай В.А., Журомський В.С., Козирацька Л.М., Куксенко І.В., Кулакова М.В., Кульчицька О.М., Лавська В.І., Медведєва О.Л., Неділько І.М., Новицька Л.А., Петряшев І.О., Спіжак М.І., Шегедин М.Б., Цибаньов О.А., Яковенко Н.П.,

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М. Акушерська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.

Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку акушерів.

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. У кабінеті профілактичних щеплень у 4-х місячної дитини після введення II АКДП раптово виникли симптоми анафілактичного шоку. З введення якого препарату слід почати надавати невідкладну допомогу?

- А. Розчин адреналіну гідрохлориду 0,1% 0,1 мл
- В. Розчин анальгіну 50% 0,1 мл
- С. Розчин сибазону 0,5% 0,3 мл
- Д. Розчин аміназину 2,5% 0,2 мл
- Е. Розчин кальцію глюконату 10% 1,0 мл

2. Хворому 32-х років з ознаками шлунково-дуоденальної кровотечі почали переливання однокрупної крові. Під час проведення біологічної проби з'явилися скарги на біль у попереку, загальну слабкість, неспокій. Об'єктивно: обличчя червоне, тремтіння, прискорення пульсу і дихання, задишка. Який стан виник?

- А. Гемотрансфузійний шок
- В. Цитратний шок
- С. Післятрансфузійна реакція
- Д. Гемолітичний шок
- Е. Дихальна недостатність

3. В пологове відділення доставлена роділья 30-ти років у терміні 40 тижнів з переймами, які почалися 15 годин тому. Пологи другі. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через кожні 10-15 хвилин. Серцебиття плоду ритмічне, 140/хв. Про яке ускладнення пологів іде мова?

- А. Первинна слабкість пологової діяльності
- В. Провісники пологів
- С. Надмірно сильна пологова діяльність
- Д. Слабкість потуг
- Е. Вторинна слабкість пологової діяльності

4. При взятті вагітної на облік, при вимірюванні тазу встановлено розміри: 23-25-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- А. Загальнорівномірнорозвужений
- В. Плоскоряхітичний
- С. Простий плоский
- Д. Косозміщений
- Е. Нормальний

5. Пацієнтці призначено взяття мазка на "гормональне дзеркало". Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження:

- А. На межі переднього і бокового склепіння
- В. На межі заднього і бокового склепіння
- С. Із заднього склепіння піхви
- Д. Із переднього склепіння піхви
- Е. Із цервікального каналу

6. Послідовий період триває 30 хвилин. Ознаки відокремлення плаценти відсутні, кровотечі немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невідкладної допомоги?

- А. Провести ручне відділення та видалення плаценти
- В. Виміряти артеріальний тиск
- С. Ввести спазмолітики
- Д. Ввести утеротоніки
- Е. Покласти холод на низ живота

7. У вагітної з пізнім гестозом у терміні 36 тижнів розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є першочерговим у наданні долікарської допомоги?

- А. Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик
- В. Ввести еуфілін
- С. Ввести утеротоніки
- Д. Ввести знеболюючі засоби
- Е. Ввести гіпотензивні засоби

8. До ЖК звернулася вагітна в терміні 12 тижнів вагітності. З якою періодичністю вагітна повинна відвідувати жіночу консультацію в 1 половині вагітності?

- А. 1 раз на місяць
- В. 2 рази на місяць
- С. 1 раз на 10 днів
- Д. Щотижня
- Е. 1 раз на тиждень

9. В пологовий будинок поступила вагітна в терміні вагітності 40 тижнів зі скаргами на тягнучий біль у попереку і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання пологів може застосувати акушерка?

- А. Дія на рефлексогенні зони
- В. Спазмолітики
- С. Інгаляція закису азоту
- Д. Анальгетики
- Е. Гіпотензивні засоби

10. До пологового будинку поступає роділья 28-ми років на другі термінові пологи з доношеною вагітністю. При огляді виявлено поперечне положення плоду. Який принцип ведення пологів доцільний у даному випадку?

- А.** Кесарський розтин
- В.** Звичайне ведення пологів
- С.** Накладання акушерських щипців
- Д.** Стимулювання пологів
- Е.** Плороруйнівна операція

11. До пологового будинку доставлено жінку з вагітністю 38 тижнів, у зв'язку з пізнім гестозом. У приймальному відділенні, під час огляду вагітної на кушетці в неї виникли судоми. Які дії акушерки?

- А.** Викликати лікаря, стежити, щоб вагітна не впала з кушетки
- В.** Викликати лікаря, ввести протисудомні препарати
- С.** Дати наркоз, викликати лікаря
- Д.** Ввести гіпотензивні препарати, викликати лікаря
- Е.** Розпочати інфузійну терапію

12. У відділення патології вагітних поступила жінка з терміном вагітності 42-43 тижня. Скарж немає. Строк пологів - 3 тижні тому. Який метод обстеження повинна запланувати акушерка?

- А.** УЗД
- В.** Кардіотокографія
- С.** Кардоцентез
- Д.** Абдоменцентез
- Е.** Амніоскопія

13. У жіночій консультації проводять бесіду з жінками про профілактику раку шийки матки. Головна причина - вірус папіломи людини. Що рекомендують для профілактики раку шийки матки?

- А.** Профогляди
- В.** Мазок на гормональне дзеркало
- С.** Бактеріологічне дослідження
- Д.** Бактеріоскопічне дослідження
- Е.** Вимірювання базальної температури

14. До акушерки ФАПу звернулася хвора зі скаргами на слабкість, підвищення температури тіла, біль у колінному суглобі. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому хворіла на ангіну. Встановлено діагноз - ревматизм. Які заходи належать до первинної профілактики ревматизму?

- А.** Санація хронічних вогнищ інфекції
- В.** Додержання дієти № 10
- С.** Прийом аспірину протягом 1 місяця
- Д.** Обмеження фізичної активності
- Е.** Введення біциліну-5

15. Вагітна жінка скаржиться на зміну смаку, бажання їсти крейду, появу болючих тріщин у куточках рота, ламкість нігтів та випадіння волосся. Встановлено діагноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба порадити збільшити в раціоні вагітної?

- А.** М'ясо
- В.** Гарбуз
- С.** Горіхи
- Д.** Сир
- Е.** Мед

16. В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі?

- А.** Міхур з льодом
- В.** Холодний компрес
- С.** Холодна примочка
- Д.** Грілка
- Е.** Сухе тепло

17. Неповнолітній працівник звернувся із заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?

- А.** Один календарний місяць
- В.** 15 календарних днів
- С.** 20 календарних днів
- Д.** 24 календарні дні
- Е.** 26 календарних днів

18. У пацієнтки, яка лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря?

- А.** Дибазол
- В.** Вікасол
- С.** Аспірин
- Д.** Анальгін
- Е.** Дицинон

19. У хворої 68-ми років, яка страждає на ІХС, раптово виник напад ядухи. Під час огляду: хвора сидить, дихання клекочуче, утруднене, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД- 34/хв., Рс- 100/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану є найбільш імовірним у даному випадку?

- А.** набряк легень
- В.** Гіпертензивна криза
- С.** Легенева кровотеча
- Д.** Напад бронхіальної астми
- Е.** Гіперглікемічна кома

20. Вагітна 32-х років поступила в пологове відділення в зв'язку з загрозою передчасних пологів у терміні 32 тижні. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики респіраторного дистрес-синдрому новонародженого?

- А. Дексаметазон, бетаметазон
- В. Преднізолон
- С. Антибіотики
- Д. Спазмолітики
- Е. Препарати заліза

21. Який об'єм крововтрати в третьому періоді пологів є фізіологічним?

- А. Не більше 0,5% від маси тіла
- В. Не більше 1% від маси тіла
- С. Не більше 3% від маси тіла
- Д. Не більше 2% від маси тіла
- Е. Не більше 5% від маси тіла

22. Через 10 хвилин після народження поспіду почалась значна кровотеча із статевих шляхів зі згустками крові. Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м'яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:

- А. Гіпотонія матки
- В. Розрив матки
- С. ДВЗ-синдром
- Д. Емболія навколоплідними водами
- Е. Коагулопатична кровотеча

23. У вагітної жінки в терміні 40 тижнів при огляді зліва від пупка пальпується голівка плоду, прослуховується серцебиття до 150/хв. Вкажіть положення плоду:

- А. Поперечне положення, I позиція
- В. Косе положення, I позиція
- С. Поперечне положення, II позиція
- Д. Тазове положення
- Е. Колінне положення

24. У роділлі пологи з активною пологовою діяльністю. Положення плоду поздовжнє, I позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 150/хв. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежить голівка, визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позаду - передній кут великого тім'ячка. Вкажіть передлежання плоду:

- А. Лобне передлежання
- В. Лицьове передлежання
- С. Передньоголовне передлежання
- Д. Тазове передлежання
- Е. Колінне передлежання

25. Вагітна жінка у терміні 35 тижнів, стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору, миготіння "мушок" перед очима. Об'єктивно: генералізований набряк, АТ- 180/120 мм рт.ст. Зненацька з'явилися фібрилярні посмикування м'язів обличчя. Тонічні судоми.

Дихання зупинилось. Через хвилину дихання відновилось, з рота - значна кількість піни. Амнезія. У сечі: білок 7 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Еклампсія
- В. Гіпертонічний криз
- С. Епілепсія
- Д. Черепно-мозкова травма
- Е. Прееклампсія тяжкого ступеня

26. Першороділля 28-ми років з прееклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плоду не вислуховується. Напад еклампсії. Вагінально: відкриття шийки матки повне, голівка у вузькій частині малого тазу. Тактика ведення пологів:

- А. Протисудомна терапія, плодорушніва операція
- В. Кесарів розтин
- С. Вакуум-екстракція плоду
- Д. Стимуляція пологової діяльності
- Е. Пологи через природні пологіві шляхи

27. У жінки 46-ти років спостерігаються ациклічні маткові кровотечі, не пов'язані з менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функції:

- А. Метрорагія
- В. Поліменорея
- С. Опсоменорея
- Д. Альгоменорея
- Е. Менорагія

28. В жіночу консультацію звернулася вагітна з доношеною вагітністю, положення плоду поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ- 100 см, ВСДМ- 35 см. Визначте передбачувану масу плоду за формулою Лебедева:

- А. 3500 г
- В. 2800 г
- С. 4500 г
- Д. 2500 г
- Е. 4000 г

29. При огляді шийки матки у дзеркалах акушерка побачила, що шийка конічної форми, рожевого кольору, зовнішнє вічко має круглу форму. Це свідчить про те, що жінка:

- А. Не народжувала
- В. Літнього віку
- С. Народжувала
- Д. Вагітна
- Е. Має захворювання шийки матки

30. На ФАП звернулася жінка для профі-

лактичного огляду. За допомогою якого метода акушерка визначає тип конституції жінки?

- A.** Загальне об'єктивне обстеження
- B.** Анамнез
- C.** Огляд за допомогою дзеркал
- D.** Піхвове обстеження
- E.** УЗД

31. Хвора 31-ти років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на постійний тупий біль унизу живота, що з'явився три дні тому, підвищення температура тіла до 38°C . При піхвовому дослідженні визначаються збільшені, болючі під час пальпації придатки, симптом Щоткіна-Блюмберга відсутній. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий сальпінгоофорит
- B.** Гострий ендометрит
- C.** Пельвіоперитоніт
- D.** Параметрит
- E.** Гострий кольпіт

32. Породілля скаржить на біль у правій грудній залозі. В ділянці болю інфільтрат 3×4 см з розм'якшенням у центрі. Температура тіла $38,5^{\circ}\text{C}$. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гнійний мастит
- B.** Пневмонія
- C.** Плеврит
- D.** Гострий лактостаз
- E.** Мастопатія

33. Хворий скаржить на появу висипки на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів, які покриті сріблястими лусочками з чіткими краями по периферії. Вузлики з'явилися після фізичної травми. Загальний стан не порушений, суб'єктивних симптомів немає. Про яку хворобу слід думати?

- A.** Псоріаз
- B.** Рожевий лишай Жибера
- C.** Червоний вовчак
- D.** Червоний плоский лишай
- E.** Атопічний дерматит

34. Жінка в терміні вагітності 8-9 тижнів скаржить на нудоту, блювання більше 20 разів на добу, слабкість, зниження маси тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, температура субфебрильна, артеріальний тиск знижений. Олігурія, живіт втягнутий. Відмічається затримка випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Блювання важкого ступеня
- B.** Блювання вагітної середнього ступеня
- C.** Блювання вагітної легкого ступеня
- D.** Гострий апендицит
- E.** Харчова токсикоінфекція

35. Хвора скаржить на біль у правому підребер'ї, що віддає у лопатку, гіркоту та сухість у роті. Ці ознаки з'являються протягом двох років після вживання жирної, смаженої, гострої їжі. Об'єктивно: стан задовільний, шкіра звичайного забарвлення, живіт м'який, помірно болючий в ділянці проекції жовчного міхура. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Хронічний холецистит в стадії загострення
- B.** Хронічний панкреатит
- C.** Хронічний коліт
- D.** Хронічний гепатит в стадії загострення
- E.** Цироз печінки

36. Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катетеризацію сечового міхура. Чим повинна акушерка обробити катетер перед введенням його в сечівник?

- A.** Стерильний гліцерин
- B.** Розчин фурациліну
- C.** Розчин натрію хлориду
- D.** Антисептичний розчин
- E.** Рідкий вазелін

37. Пацієнтку 25-ти років турбують біль у ділянці серця, серцебиття, підвищення температури тіла, біль у колінних суглобах. В анамнезі часті ангіни. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці серця, колінні суглоби болісні, припухлі, гарячі на дотик, функція їх порушена. За допомогою яких препаратів здійснюється етіотропна терапія даної пацієнтки?

- A.** Антибіотики
- B.** Препарати, що покращують метаболічні процеси в міокарді
- C.** Глюкокортикостероїдні препарати
- D.** Нестероїдні протизапальні препарати
- E.** Серцеві глікозиди

38. Чоловік отримав удар ножом у живіт. При обстеженні: на передній черевній стінці рана довжиною 5 см, яка помірно кровоточить, в її отвір випала петля кишківника. Турбують біль у животі і спрага. Що необхідно виконати на місці в першу чергу?

- А.** Накласти вологу серветку на петлі, зафіксувати їх, знеболити
- В.** Вправити петлі кишківника в черевну порожнину
- С.** Обробити петлі кишківника дезрозчином, вправити
- Д.** Ввести кровозупинні, знеболюючі, госпіталізувати
- Е.** Запропонувати холодне питво, знеболити

39. 28-ми річна жінка визначає відсутність вагітності протягом 3-х років після самовільного викидня, ускладненого запаленням придатків матки. Який найбільш імовірний чинник безпліддя?

- А.** Яєчниковий
- В.** Матковий
- С.** Цервікальний
- Д.** Коітальний
- Е.** Чоловічий

40. У вагітної, хворої на епілепсію, після самостійного припинення прийому протисудомних препаратів виник великий судомний напад. Які дії найбільш доцільні в цьому випадку?

- А.** Надати допомогу при нападі і викликати лікаря
- В.** Ввести протисудомний препарат
- С.** Викликати лікаря
- Д.** Дати заспокійливі препарати
- Е.** -

41. У роділлі 30-ти років термінові пологи почалися 12 годин тому. Хворіла на скарлатину. Передбачувана маса плоду 2880 г. Останні 2 години перейми болючі, але сильні, регулярні, по 40 секунд, через 3-4 хвилини. Шийка матки згладжена, краї її товсті, щільні, не податливі, відкриття на 2 п/пальці. Голівка плоду великим сегментом у вході в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I періоду пологів?

- А.** Ригідність шийки матки
- В.** Вік 30 років
- С.** Перенесені інфекційні захворювання
- Д.** Маса плоду
- Е.** Стояння голівки плоду

42. У пологовий будинок поступила вагітна 38-ми років, вагітність I, 39 тижнів. Впродовж 1,5 тижнів скаржить на головний біль, порушення зору. Під час обстеження жінки виникли судоми. Які дії акушерки в санпропускнику?

- А.** Покликати лікаря, запобігти падінню з кушетки
- В.** Виміряти артеріальний тиск, покликати лікаря
- С.** Ввести протисудомні засоби
- Д.** Ввести гіпотензивні препарати
- Е.** Підключити крапельницю

43. Жінка скаржить на свербіж, печіння, болючість в ділянці зовнішніх статевих органів, значні сироподібні виділення із піхви. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Кандидозний кольпіт
- В.** Трихомоніаз
- С.** Гонорея
- Д.** Герпес
- Е.** Хламідійна інфекція

44. На прийом до ЖК прийшла пацієнтка зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років регулярного статевого життя без використання засобів контрацепції. З якого методу дослідження найдоцільніше розпочати обстеження?

- А.** Аналіз сперми статевого партнера
- В.** Дослідження функції яєчників
- С.** УЗД
- Д.** Бактеріоскопічний
- Е.** Рентгенологічний

45. Дитина народилася від II вагітності II нормальних пологів з масою 3100 г, зростом 50 см. Яке щеплення необхідно зробити в перший день життя?

- А.** Проти вірусного гепатиту В
- В.** Проти туберкульозу
- С.** Проти дифтерії
- Д.** Проти епідемічного паротиту
- Е.** Проти кору

46. Пацієнтка 19-ти років звернулася зі скаргами на біль у поперековій ділянці справа, часте сечовиділення, підвищення температури тіла до 39,5°C. Захворіла гостро після купання в річці. Яке захворювання можна запідозрити у хворої?

- А.** Гострий пієлонефрит
- В.** Хронічний пієлонефрит
- С.** Гострий цистит
- Д.** Сечокам'яна хвороба
- Е.** Ниркова колька

47. У потерпілого 19-ти років констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- A.** Пульсація на сонній артерії
- B.** Пасивні рухи грудної клітки
- C.** Зниження температури тіла
- D.** Відсутність свідомості
- E.** Розширені зіниці

48. У травмованого чоловіка 35-ти років різка болючість у ділянці кісток тазу внаслідок падіння з висоти. В якому положенні необхідно транспортувати хворого?

- A.** На дерев'яному щиті в положенні "жаби"
- B.** На дерев'яних ношах
- C.** Накласти шини Дітеріхса
- D.** Накласти 3 шини Крамера
- E.** Підкласти під таз валик

49. Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?

- A.** Через кожні 3 дні
- B.** 1 раз на тиждень
- C.** Кожен день
- D.** 2 рази на тиждень
- E.** Через кожні 5 днів

50. Минуло 30 хвилин після народження плоду. Ознаки відділення плаценти позитивні. Плацента не виділяється. Почалася кровотеча. Назвіть причину кровотечі:

- A.** Затримка посліду в матці
- B.** Затримка часточки посліду в матці
- C.** Травми пологових шляхів
- D.** ДВЗ-синдром
- E.** Розрив матки

51. Вагітна 22-х років, термін 24-25 тижнів. Виник біль у попереку, озноб, підвищення температури тіла до 39°C. У крові: лейкоцити - 15, 5·10⁹/л. У сечі: білок - 0,06 г/л, лейкоцити 2-4 в полі зору, бактеріурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий пієлонефрит
- B.** Цистит
- C.** Прееклампсія
- D.** Бактеріурія
- E.** Цукровий діабет

52. Хвора скаржиться на свербіж у піхві, пінисті білі. При огляді: почервоніння і набряк слизової оболонки піхви, пінисті білі. Який метод дослідження необхідно провести?

- A.** Мазок на ступінь чистоти піхви
- B.** Кольпоскопія
- C.** Мазок на атипові клітини
- D.** Гістеросальпінгографія
- E.** Визначення каріопікнотичного індексу

53. Пацієнт 33-х років скаржиться на напади ядухи з утрудненим видихом. Наприкінці нападу тяжко відходить невелика кількість склоподібного мокротиння. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Бронхіальна астма
- B.** Туберкульоз легенів
- C.** Гострий бронхіт
- D.** Серцева астма
- E.** Пневмонія

54. У хворої годину тому раптово виник сильний пекучий біль за грудниною, який віддає в ліву руку та триває 35 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно: тони серця ослаблені, аритмічні, ЧСС-110/хв. Який патологічний стан виник у хворої?

- A.** Гострий інфаркт міокарда
- B.** Міокардит
- C.** Мітральний стеноз
- D.** Ревматична хвороба
- E.** -

55. Після народження дитини стан новонародженого оцінюють за шкалою Апгар. Якою кількістю балів оцінюється задовільний стан новонародженого?

- A.** 8-10
- B.** 6-7
- C.** 4-5
- D.** 2-4
- E.** 1-3

56. На ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль при відкриванні рота, жуванні та ковтанні, загальну слабкість, підвищену пітливість, короткочасні скорочення м'язів спини. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A.** Правець
- B.** Сказ
- C.** Менінгоенцефаліт
- D.** Істерія
- E.** Радикуліт

57. При визначенні групи крові аглютинація еритроцитів відбулась із цоліклонами анти-А та анти-В. Якої групи досліджувана кров?

- A.** АВ (IV)
- B.** 0 (I)
- C.** А (II)
- D.** В (III)
- E.** Групу визначити неможливо

58. Яке ускладнення зустрічається найчастіше у випадку поперечного положення плоду?

- A.** Випадіння дрібних частин плоду
- B.** Слабкість пологової діяльності
- C.** Розрив матки
- D.** Кровотеча з піхви
- E.** Сечостатеві нориці

59. Жінка 40-ка років скаржиться на часте і болюче сечовипускання, часті позиви на сечопуск, біль внизу живота, підвищення температури тіла. Захворіла раптово після переохолодження. Об'єктивно: при пальпації живота біль у надлобковій ділянці. Сеча візуально мутна, містить кров. Ps- 88/хв., температура тіла 38,6°C. Який попередній діагноз?

- A.** Гострий цистит
- B.** Гострий коліт
- C.** Загострення хронічного пієлонефриту
- D.** Напад ниркової кольки
- E.** Гострий уретрит

60. На ФАП до акушерки звернулася вагітна зі скаргами на висипку із свербіжем, яка з'явилася після вживання апельсину. При огляді на шкірі верхніх кінцівок та живота виявлено дисеміновану уртикарну висипку червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Кропив'янка
- B.** Набряк Квінке
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Ревматична лихоманка
- E.** -

61. Вагітній жінці 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?

- A.** 24 години
- B.** 12 годин
- C.** 10 годин
- D.** 8 годин
- E.** 7 годин

62. В хірургічне відділення доставлена хвора, яка скаржиться на біль і випинання в правій пахвинній ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій пахвинній ділянці болісне щільне випинання, яке не піддається вправленню. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

- A.** Защемлена пахвинна кила
- B.** Гострий лімфаденіт
- C.** Туберкульоз лімфатичних вузлів
- D.** Абсцес правої пахвинної ділянки
- E.** Ниркова колька

63. Вагітна 28-ми років звернулася до акушерки зі скаргами на слабкість, головний біль, серцебиття під час фізичного навантаження. В анамнезі: рясні

та тривалі менструації, з дитинства їсть крейду. Об'єктивно: шкіра бліда, нігті ламкі. У крові: гемоглобін - 60 г/л, кольоровий показник - 0,6, мікроцитоз, ШЗЕ- 18 мм/год. Про яке захворювання можна думати?

- A.** Залізодефіцитна анемія
- B.** Гіпопластична анемія
- C.** Гемолітична анемія
- D.** Гостра постгеморагічна анемія
- E.** B₁₂-дефіцитна анемія

64. Дитині необхідно провести першу ревакцинацію АКДП. Назвіть строки її проведення:

- A.** 18 місяців
- B.** 12 місяців
- C.** 10 місяців
- D.** 8 місяців
- E.** 6 місяців

65. Під час ведення пологів при чисто сідничному передлежанні за методом Цов'янова відбулося передчасне випадіння ніжок. Що необхідно вжити для швидкого народження плоду?

- A.** Вилучення плоду за ніжки
- B.** Виконати операцію кесарського розтину
- C.** Застосувати класичну ручну допомогу
- D.** Вилучити плід за пахвинний згин
- E.** Зовнішній поворот за Архангельським

66. Під час проведення активного патронажу на дому вагітної у терміні 34 тижні, виявлено підвищення артеріального тиску до 180/100 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Якою повинна бути тактика акушерки?

- A.** Викликати швидку допомогу та госпіталізувати вагітну
- B.** Рекомендувати відвідати лікаря жіночої консультації у найближчий час
- C.** Призначити гіпотензивні препарати
- D.** Рекомендувати дотримуватися дієти
- E.** Повідомити лікаря жіночої консультації

67. У вагітної жінки у терміні 20 тижнів виникли різкий біль у попереку з іррадіацією у пах, дизуричні явища. Під час сечовипускання ознаки гематурії. Для якого захворювання характерна зазначена симптоматика?

- A.** Сечокам'яна хвороба
- B.** Загроза викидня
- C.** Гострий апендицит
- D.** Апоплексія яєчника
- E.** Позаматкова вагітність

68. Акушерка відкрила бікс з перев'язу-

вальним матеріалом та виявила, що індикатор стерильності не розплавився. Які подальші дії акушерки?

- A.** Надіслати бікс на повторну стерилізацію
- B.** Надіслати матеріали на бактеріологічне дослідження
- C.** Написати доповідну записку на ім'я головного лікаря
- D.** Отримати підтвердження запису в "Журналі обліку стерилізації" в ЦСВ
- E.** Використати перев'язувальний матеріал для роботи

69. На ФАП звернулася мати пацієнтки зі скаргами на те, що на 15-ту добу після пологів у її дочки впав настрій, виникли плаксивість, байдужість до оточуючого, не цікавиться собою та новонародженою дитиною, зник апетит, виникли закрепи. Зі слів матері раніше таких станів не було. Акушерка класифікувала наведений стан, як:

- A.** Післяпологова депресія
- B.** Астенічний синдром
- C.** Ажітована депресія
- D.** Дисфоричний синдром
- E.** Анорексія

70. Після проведення зовнішнього акушерського обстеження встановлено, що передлеглою частиною є велика, м'яка не балотуюча частина плоду, а спина його звернена вправо. Це:

- A.** Тазове передлежання, друга позиція
- B.** Тазове передлежання, перша позиція
- C.** Тазове передлежання, задній вид
- D.** Головне передлежання, друга позиція
- E.** Головне передлежання, передній вид

71. Пацієнтка 63-х років перебуває на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. Під час профілактичного огляду висуває скарги на швидку втомлюваність, виражену загальну слабкість, втрату апетиту, відразу до м'ясної їжі. Об'єктивно: зниженого живлення, шкірні покриви та видимі слизові бліді. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло у хворої?

- A.** Рак шлунка
- B.** Шлункова кровотеча
- C.** Пенетрація
- D.** Перфорація
- E.** Стеноз воротаря

72. Після пологів у жінки впродовж 3-х діб відсутні випорожнення. За призначенням лікаря акушерка повинна поставити пацієнтці очисну клізму. Який об'єм води слід налити у кружку Есмарха?

- A.** 1-1,5 л
- B.** 2-3 л
- C.** 0,5-0,7 л
- D.** 0,1-0,2 л
- E.** 3-4 л

73. Роділля 25-ти років. Вагітність перша, 40 тижнів. Жінка перебуває у пологовому залі. Яким чином акушерка повинна спостерігати за розвитком переймів у роділлі?

- A.** Покласти руку на дно матки
- B.** Проводити аускультацию серцебиття плоду
- C.** Виміряти артеріальний тиск у роділлі
- D.** Виміряти пульс у роділлі
- E.** Підрахувати частоту дихання у роділлі

74. Чоловік 69-ти років готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:

- A.** Спинномозкова анестезія
- B.** Нейролептаналгезія
- C.** Внутрішньовенний наркоз
- D.** Атаралгезія
- E.** Ендотрахеальний наркоз

75. При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?

- A.** Завідувач відділенням
- B.** Інженер з охорони праці
- C.** Головний лікар
- D.** Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
- E.** Головна акушерка

76. Дитині 3 місяці, на грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу медична сестра виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, симптом "облисіння потилиці", підвищену дратівливість, неспокій, податливість країв великого тім'ячка. Про яке захворювання можна подумати?

- A.** Рахіт
- B.** Пневмонія
- C.** Гідроцефалія
- D.** Гіпотрофія
- E.** Паратрофія

77. У відділення раннього дитинства дитячої лікарні поступила 8-ми місячна дитина з діагнозом: гостра пневмонія. Медсестра, виконуючи призначення лікаря, підготувала дитину до наступного обстеження:

- A.** Рентгенографія
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Взяття калу на яйця глистів
- D.** Ректороманоскопія
- E.** Цистоскопія

78. Під час проведення перев'язки множинних інфікованих ран і подряпин, нанесених собакою, які локалізовані на верхніх і нижніх кінцівках, пацієнтка поскаржилася, що три дні їй турбують утруднене відкривання рота, болі в горлі, посіпування м'язів, неспокій, безсоння, почуття страху. Температура тіла 37,5°C. Який попередній діагноз?

- A.** Пращець
- B.** Ангіна
- C.** Сепсис
- D.** Глосит
- E.** Стоматит

79. Після скількох років життя більшість передчасно народжених дітей з масою тіла від 1000 до 2000 г не відрізняються за своїм психомоторним розвитком від доношених немовлят?

- A.** 2 - 3
- B.** 1 - 2,5
- C.** 3,5 - 4
- D.** 4,5 - 5
- E.** 5,5 - 6

80. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде II період пологів. Як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плоду з метою контролю стану плоду?

- A.** В паузах після кожної потуги
- B.** Через кожних 5 хвилин
- C.** Під час прорізування голівки
- D.** Під час кожної потуги
- E.** Через кожних 15 хвилин

81. До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х тижнів зі скаргами на утруднене носове дихання та серозні виділення з носа. В сім'ї старша дитина 3-років хворіє на ГРВІ. Який препарат найбільш доцільно застосувати для профілактики даної хвороби?

- A.** Інтерферон
- B.** Анальгін
- C.** Фарингосепт
- D.** Ампіцилін
- E.** Димедрол

82. Роділля 38-ми років поступила в пологовий будинок в I періоді термінових пологів. Роділля неспокійна, збуджена, скарги на відчуття страху, сильний біль у животі й попереку, що не припиняється, матка у вигляді "піщаного годинника", сечовипускання болюче, частини плоду

не пальпуються. Вкажіть тактику акушерки за відсутності лікаря:

- A.** негайно припинити пологову діяльність
- B.** Ввести окситоцин
- C.** Зробити епізіотомію
- D.** Зробити амніотомію
- E.** Накласти акушерські щипці

83. Вагітна жінка 32-х років знаходиться в гастроентерологічному відділенні зі скаргами на гіркоту в роті, ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота. В анамнезі - хронічний холецистит. Яка дієта необхідна хворій?

- A.** №5
- B.** №7
- C.** №10
- D.** №1a
- E.** №15

84. Дитині 10 днів. Під час огляду виявлено почервоніння шкіри і ерозії поверхневого шару в пахвинних складках. Мати купає дитину через день, температурний режим не витримує. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Попрілості II ступеня
- B.** Попрілості I ступеня
- C.** Везикулопустульоз
- D.** Пухирчатка новонародженого
- E.** Пітниця

85. У роділлі 32-х років пологи ускладнилися нефропатією. За призначенням лікаря акушерка ввела роділлі внутрішньом'язово у верхньо-зовнішній квадрат сідниці 25% розчин магнію сульфату 5 мл. Ін'єкційну голку потрібно ввести під кутом:

- A.** 90°
- B.** 70°
- C.** 60°
- D.** 45°
- E.** 30°

86. В жіночій консультації при огляді вагітної акушерка помітила висип на шкірі. Об'єктивно: на шкірі правого передпліччя дві плями круглої форми з обідком по периферії із вузликів, пухирців, кірочок у вигляді кілець, у центрі - лущення. Розміри вогнищ 1-2 см в діаметрі. Назвіть метод лабораторного дослідження для встановлення діагнозу:

- А. Мікологічне дослідження елементів висипки
- В. Бактеріологічне дослідження крові
- С. Аналіз крові на реакцію Васермана (RW)
- Д. Аналіз калу на яйця гельмінтів
- Е. Аналіз крові на цукор

87. У пологове відділення поступила роділья із регулярною пологовою діяльністю. Пологи II, термін вагітності 39-40 тижнів. При обстеженні виявлено вривання сідничок. До якої маніпуляції слід підготувати роділью?

- А. Ручна допомога при чисто сідничному передлежанні
- В. Ручна допомога при змішаному сідничному передлежанні
- С. Кесарів розтин
- Д. Класична ручна допомога
- Е. Зовнішній поворот плоду на голівку

88. Після лижної прогулянки до акушерки звернулася жінка 25-ти років, яка скаржиться на біль у ділянках носа, щік та чола. При огляді шкіра набрякла, холодна на дотик. Що з переліченого характеризує стан хворої?

- А. Дореактивний період відмороження
- В. Початкова стадія загального відмороження
- С. Загальне переохолодження
- Д. Реактивний період відмороження
- Е. Відмороження II ступеня

89. На ФАП звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на біль пульсуючого характеру в ділянці правої великої статевої губи. Яке захворювання можна запідозрити?

- А. Бартолініт
- В. Аднексит
- С. Кольпіт
- Д. Метрит
- Е. Цервіцит

90. Після виконання ін'єкції акушерці необхідно провести дезінфекцію використаного інструментарію. Який розчин вона повинна застосувати для цього?

- А. 0,2% дезактин
- В. 0,5% дезактин
- С. АХД 2000
- Д. 0,5% розчин хлорного вапна
- Е. Стериліум

91. До акушерки ФАПу звернулися батьки дитини 5-ти місяців із запитанням: які зуби прорізуються першими?

- А. Два нижні центральні різці
- В. Два верхні центральні різці
- С. Два верхні латеральні різці
- Д. Два нижні латеральні різці
- Е. Перші молочні моляри

92. У терапевтичному відділенні знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого відділяється харкотиння у великій кількості. Яке положення йому необхідно надати для поліпшення виділення харкотиння?

- А. Дренажне
- В. Вимушене
- С. Горизонтальне
- Д. Пасивне
- Е. -

93. До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка 33-х років зі скаргами на незначні кров'яні виділення з піхви, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: остання менструація 2 місяці тому. Тест на вагітність позитивний. Рс- 80/хв., АТ- 110/80 мм рт.ст. Живіт болючий над лоном. Якими мають бути дії акушерки?

- А. Направити жінку до стаціонару
- В. Призначити токолітики
- С. Ввести утеротоніки
- Д. Призначити седативні засоби
- Е. Ввести кровоспинні засоби

94. Акушерка гінекологічного відділення обслуговує пацієнтку 32-х років. Під час огляду встановлено: в ділянці великої залози присінку піхви гіперемія, симптом флюктуації, різка болючість. Який метод лікування буде обраний?

- А. Хірургічний розтин та дренивання абсцесу
- В. Спринцювання піхви
- С. Введення порошкоподібних ліків у піхву
- Д. Піхвові ванночки
- Е. Контрацептиви

95. До акушерки ФАПу звернулася мати хлопчика 12-ти років. Хлопчик скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. У крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

- А. Гострий лейкоз
- В. Ревматоїдний артрит
- С. Системний червоний вівчак
- Д. Геморагічний васкуліт
- Е. Туберкульоз

96. До акушерки ФАПу звернулася мати с дівчинкою п'яти років. Дитина висуває скарги на відчуття жару та нестачу повітря, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно: виражена блідість шкіри, холо-

дний липкий піт на тілі. Дівчинку вжалила бджола. Який стан розвинувся у дитини?

- A.** Анафілактичний шок
- B.** Гіперглікемічна кома
- C.** набряк Квінке
- D.** Гіпоглікемічна кома
- E.** Ацетонемічний синдром

97. До ЖК звернулася жінка після оперативного втручання в онкодиспансері з приводу раку тіла матки. Яка подальша тактика акушерки?

- A.** Взяти на диспансерний облік
- B.** Направити до онколога поліклініки
- C.** Направити до завідуючого ЖК
- D.** Направити до завідуючого службою
- E.** Провести огляд

98. Першовагітна 30 років, термін вагітності 34 тижні. Скаржиться на посилення рухів плоду, особливо у другій половині дня. В крові Нв- 64 г/л. Яке ускладнення виникло в даному випадку?

- A.** Анемія вагітних
- B.** Загроза передчасних пологів
- C.** Передлежання плаценти
- D.** Синдром нижньої порожнистої вени
- E.** Передчасне відшарування плаценти

99. Жінка 30-ти років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на значні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Вагітність заперечує. До якого допоміжного методу дослідження акушерка повинна підготувати інструменти?

- A.** Роздільне діагностичне вишкрібання
- B.** Біопсія шийки матки
- C.** Зондування порожнини матки
- D.** Пункція черевної порожнини
- E.** Аспіраційна біопсія

100. В гінекологічне відділення поступила жінка 20-ти років із ознаками гострого живота. Остання менструація 2 тижні тому. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Апоплексія яєчника
- B.** Порушена позаматкова вагітність
- C.** Трубний аборт
- D.** Матковий аборт
- E.** Апендицит

101. На ФАП звернулася жінка із скаргами на постійний біль у правій здухвинній ділянці, підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, одноразове блювання. Під час обстеження пацієнтки акушерка виявила наступні позитивні симптоми: Воскресенського, Ровзінга, Роздольського. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Перфоративна виразка
- C.** Перитоніт
- D.** Гостра кишкова непрохідність
- E.** Ниркова колька

102. У породіллі 23-х років внаслідок лікування антибіотиками, що вводилися акушеркою внутрішньом'язово 4 рази на добу, утворився інфільтрат. Що, найімовірніше, спричинило виникнення цього ускладнення?

- A.** Введення ліків у одне й те саме місце
- B.** Введення невідігрітого розчину
- C.** Занадто повільне введення ліків
- D.** Введення ліків у положенні стоячи
- E.** Введення ліків голкою №0860

103. Жінка скаржиться на відсутність вагітності протягом 2-х років. Засобами контрацепції не користується. Після вимірювання базальної температури отримали однофазну криву. Оцініть результати даного обстеження:

- A.** Відсутність овуляції
- B.** Нормальна температурна крива
- C.** Надлишок прогестерону
- D.** Наявність овуляції
- E.** Передчасна овуляція

104. Пацієнтка прооперована з приводу субсерозної лейоміоми матки. Протягом якого терміну жінка повинна знаходитись під диспансерним наглядом після оперативного лікування?

- A.** 6 місяців
- B.** 10 місяців
- C.** 12 місяців
- D.** 2 роки
- E.** 2 місяці

105. На ФАП звернулася хвора з гнійною раною в фазі дегідратації. Яке місцеве лікування найбільш ефективне?

- A.** Мазева пов'язка
- B.** Дренування рани
- C.** Накладання швів на рану
- D.** ПХО рани
- E.** Накладання гігроскопічної пов'язки

106. У роділлі 30-ти років II період пологів. Термін вагітності 38-39 тижнів, діагностовано чисто сідничне передлежання. Яку допомогу необхідно надати?

- A.** Ручна допомога за методом Цов'янова
- B.** Класична ручна допомога
- C.** Очікувальна тактика
- D.** Ручна допомога за методом Цов'янова
- II**
- E.** Зовнішньо-внутрішній поворот плоду на ніжку

107. Дитині 4 тижні. Акушерка помітила, що через годину після ранкового годування з'явилося блювання "фонтаном". Для якого стану характерні дані ознаки?

- A.** Пілоростеноз
- B.** Кишковий токсикоз
- C.** Парентеральна диспепсія
- D.** Пілороспазм
- E.** Проста диспепсія

108. У пологовий будинок поступила вагітна в терміні 38 тижнів зі скаргами на переймоподібний біль унизу живота. При обстеженні - розкриття шийки матки на 6 см. У якому періоді пологів знаходиться жінка?

- A.** Перший
- B.** Прелімінарий
- C.** Другий
- D.** Третій
- E.** Ранній післяпологовий

109. У дитини віком 5 місяців на тім'яній ділянці голови з'явилися себорейні лусочки, під пахвами і у паху - попрілості. На що вказують ці симптоми?

- A.** Ексудативно-катаральний діатез
- B.** Рахіт
- C.** Лімфатико-гіпопластичний діатез
- D.** Нервово-артритичний діатез
- E.** Гіпокальціємічний синдром

110. Пацієнт 35-ти років звернувся до акушерки ФАПу зі скаргами на зниження зору, "туман" перед очима, двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гугнявий. При об'єктивному обстеженні виявлено мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запідозрити акушерка?

- A.** Ботулізм
- B.** Отруєння молоком
- C.** Отруєння метиловим спиртом
- D.** Стовбуровий енцефаліт
- E.** Розлади мозкового кровообігу

111. Акушерку терміново покликали до сусідського будинку, в якому сусід проводив ремонт електропроводки і отримав електротравму. На місці пригоди акушерка виявила чоловіка без ознак життя і одна приступила до СЛР. Вкажіть

правильне співвідношення вдихів та натискань на грудну клітку:

- A.** 2:30
- B.** 1:5
- C.** 2:10
- D.** 1:15
- E.** 2:15

112. Позначаючи в температурному листку показники температури пацієнтки в післяопераційному періоді, акушерка помітила, що коливання ранкової і вечірньої температури дорівнює в межах 1-2°C. Вкажіть вид гарячки:

- A.** Послаблювальна
- B.** Постійна
- C.** Перемижна
- D.** Хвилеподібна
- E.** Атипова

113. До акушерки ФАПу звернулась вагітна у терміні 37 тижнів з приводу кров'янистих виділень з піхви, постійного сильного болю у верхньому відділі матки, які виникли після тупої травми живота. Загальний стан жінки задовільний: АТ-115/70 мм рт.ст., Рс- 80/хв. Живіт правильної овоїдної форми болючий, напружений у верхньо-правому відділі. Серцебиття плоду приглушене, до 170/хв. Який попередній діагноз?

- A.** Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти
- B.** Передлежання плаценти
- C.** Прирощення плаценти
- D.** Передчасні пологи
- E.** Передчасне відходження навколоплідних вод

114. Акушерка проводить профогляд жінки 30-ти років. Жінка скарж не висловлює. Виявлено, що розміри матки збільшені до 10 тижнів вагітності, вона щільна, безболісна, рухома. Шийка та придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли не змінені. До якого додаткового обстеження треба підготувати жінку?

- A.** Роздільне діагностичне вишкрібання матки
- B.** Біопсія
- C.** Кольпоскопія
- D.** Зондування матки
- E.** Пункція через заднє склепіння піхви

115. Під час огляду вагітної жінки 25-ти років у жіночій консультації увагу лікаря привернули скупчені вогнища міхурців на внутрішній поверхні стегна. Міхурці болючі, різного розміру з каламутним вмістом. Виникають неодноразово на одному і тому ж місці. Якому діагнозу

відповідає зазначена клінічна картина?

- А. Оперізувальний герпес
- В. Сифіліс
- С. Трихомоніаз
- Д. Іюнококова інфекція
- Е. Хламідіоз

116. В стаціонарне відділення доставлено пацієнта 32-х років, у якого після вживання цитрусових розвинувся набряк обличчя, збільшились губи та повіки, з'явився кашель. Об'єктивно: температура тіла 37,3°C, Ps- 82/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Яку допомогу слід надати при загрозі ядухи?

- А. Провести інтубацію трахеї
- В. Припинити контакт з алергеном
- С. Ввести антигістамінні препарати
- Д. Ввести преднізолон
- Е. Провести гемосорбцію

117. У дитини важкий стан, є дефіцит маси тіла 30%, шкіра із сіруватим відтінком, зморшкувата, виникають диспепсичні розлади. Поставте діагноз:

- А. Гіпотрофія III ступеня
- В. Гіпотрофія II ступеня
- С. Кишковий токсікоз із ексикозом
- Д. Анемія
- Е. Вроджена вада серця

118. Акушерка післяпологового відділення виявила у породіллі на 3-тю добу почервоніння в ділянці швів на промежині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в цьому випадку?

- А. Зняти шви
- В. Провести обробку швів
- С. Призначити антибіотики
- Д. Провести туалет породіллі
- Е. Покласти холод на ділянку швів

119. Жінка 23-х років доставлена у клініку із гострим болем унизу живота, що іррадіює у пряму кишку, температура 40°C. Остання менструація 6 днів тому. Р.В.: матка не змінена, дещо болісна при зміщенні, зліва придатки без особливостей, справа визначається ретортоподібне утворення, болісне при зміщенні, розміром 9x4 см, що флюктує. Який діагноз найбільш імовірний?

- А. Піосальпінкс
- В. Апоплексія яєчника
- С. Гострий апендицит
- Д. Трубна вагітність
- Е. Перекрут ніжки пухлини

120. До приймального відділення доставлено пацієнта з блюванням у вигляді "кавової гущі". Хворого необхідно транспортувати до відділення:

- А. Лежачи на каталці-ношах
- В. Сидячи на кріслі-каталці
- С. Сидячи на стільці, ліфтом
- Д. Пішки самостійно
- Е. Пішки у супроводі медсестри

121. Які дезінфікуючі розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?

- А. 6% розчин перекису водню з 0,5% розчином мийного засобу
- В. 0,5% розчин хлорного вапна
- С. 10% розчин хлорного вапна
- Д. 1% розчин хлораміну
- Е. 0,15% розчин хлораміну

122. У роділлі з вузьким тазом виникла загроза розриву матки. Оберіть правильну тактику ведення пологів:

- А. Зняти пологову діяльність
- В. Акушерські щипці
- С. Кесарів розтин
- Д. Стимуляція пологової діяльності
- Е. Епізіотомія

123. Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, балотуюча частина плоду. Третім прийомом над входом в малий таз визначається частина плоду м'якуватої консистенції, не здатна до балотування. Яке положення плоду діагностовано?

- А. Поздовжнє
- В. Тазове
- С. Поперечне
- Д. Головне
- Е. Косе

124. У пологах відбувся розрив промежини з пошкодженням *m. sphincter ani*; стінка прямої кишки ціла. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Розрив промежини III ступеня, неповний
- В. Розрив промежини I ступеня
- С. Розрив промежини II ступеня
- Д. Розрив промежини III ступеня, повний
- Е. Розрив промежини, самовільний

125. Потерпілому 32 роки. Кілька хвилин тому, працюючи в коморі, розбив пляшку з азотною кислотою. Об'єктивно: в ділянці гомілки жовтий струп, болючість. Який нейтралізуючий засіб слід застосувати?

- А. 2% розчин гідрокарбонату натрію
- В. Вапняне молоко
- С. Гліцерин
- Д. 5% розчин міді сульфату
- Е. 5% розчин натрію тіосульфату

126. До гінекологічного відділення надійшла жінка з діагнозом: позаматкова вагітність, розрив труби. При підготовці до операції необхідно **ВИКЛЮЧИТИ**:

- A.** Очисну клізму
- B.** Промивання шлунка
- C.** Туалет статевих органів
- D.** Катетеризацію сечового міхура
- E.** Премедикацію

127. Акушерка госпіталізує вагітну до відділення патології. Яку облікову документацію (форму) вона має оформити?

- A.** №096у
- B.** №097у
- C.** №111у
- D.** №113у
- E.** №025у

128. Акушерка пологового відділення у 3-му періоді пологів визначила позитивні ознаки відокремлення плаценти. Послід не виділився, почалася кровотеча. Яка тактика акушерки?

- A.** Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
- B.** Ввести утеротонічні засоби
- C.** Провести зовнішній масаж матки
- D.** Провести ручне дослідження матки
- E.** Холод на низ живота

129. На прийом звернулася пацієнтка зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: вагітність 10-11 тижнів, загроза самовільного викидня. До якого лікарського втручання слід підготувати пацієнтку?

- A.** Видалення плідного яйця з порожнини матки
- B.** Ушивання цервікального каналу шийки матки
- C.** Зондування порожнини матки
- D.** Лапароскопія
- E.** Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу

130. Дитина 7-ми місяців хвора на рахіт. Раптово відбулася зупинка дихання, посиніла, вкрилася липким потом; пролунав звучний вдих ("півнячий крик"). Яку невідкладну долікарську допомогу необхідно провести?

- A.** Натиснути на корінь язика
- B.** Провести лужну інгаляцію
- C.** Дати тепле лужне пиття
- D.** Ввести між зубами шпатель, обгорнутий марлею
- E.** Ввести антигістамінний препарат

131. До жіночої консультації звернула-

ся жінка зі скаргами на безплідність. В анамнезі гонорейний сальпінгіт. Під час обстеження виявлено непрохідність маткових труб. За допомогою якого методу діагностики можна з'ясувати збереження функції яєчників?

- A.** Тести функціональної діагностики
- B.** Гістеросальпінгографія
- C.** Гідротубація
- D.** Пертубація
- E.** Кольпоскопія

132. Жінка поступила у відділення патології вагітності з приводу кров'янистих виділень зі статевих шляхів. Під час піхвового дослідження: канал шийки матки розкритий, плідне яйце нижнім полюсом виступає у піхву. Якій стадії абортів це відповідає?

- A.** Аборт у розпалі
- B.** Повний аборт
- C.** Загрозливий аборт
- D.** Неповний аборт
- E.** Інфікований аборт

133. На ФАП поступив пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва, часті випорожнення (7-8 разів на добу) з домішками слизу та крові. Об'єктивно: сигмоподібна кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна запідозрити в даному випадку?

- A.** Шигельоз
- B.** Ботулізм
- C.** Сальмонельоз
- D.** Вірусний гепатит
- E.** Холера

134. При перевірці стану охорони праці лікарні інспектором управління охорони здоров'я були виявлені недоліки. Хто несе відповідальність за стан охорони праці в лікарні?

- A.** Головний лікар
- B.** Інженер з охорони праці
- C.** Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської роботи
- D.** Головна медсестра
- E.** Керівник структурного підрозділу

135. Акушерка оглянула доношену дитину 12-ти днів. Її фізичний розвиток вона оцінила як відповідний до віку. Яка маса тіла дитини стала підставою для цього висновку?

- A.** Дорівнює масі при народженні
- B.** Втрата 200 г маси
- C.** Збільшення маси на 150 г
- D.** Збільшення маси на 200 г
- E.** Втрата 150 г маси

136. До гінекологічного відділення ЦРЛ поступила жінка у терміні вагітності 8 тижнів з приводу блювання тяжкого ступеня. При дослідженні крові виявлено багато токсичних продуктів обміну; виник ацидоз. Для усунення ацидозу жінці необхідно ввести:

- A.** 100-150 мл 5% розчину натрію гідрокарбонату
- B.** 200 мл фізіологічного розчину
- C.** 20 мл 40% р-ну глюкози
- D.** 400 мл реополіглюкіну
- E.** Вітаміни групи В

137. 7-річний хлопчик був неухажливий у класі. Вчитель звернув увагу на періодично відсутній погляд дитини і прицмокування губами. Падіння і судом не відмічалось. Під час короткої "відсутності" не відкликався на своє ім'я. Визначте тип нападу:

- A.** Малий епілептичний
- B.** Генералізований тоніко-клонічний
- C.** Парціальний
- D.** Епістатус
- E.** Джексоновський

138. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на зниження пам'яті та працездатності, сонливість, випадіння волосся. Об'єктивно: сповільнена мова, голос низький, хриплий. Температура тіла - 35,1°C. Набряки локалізовані на обличчі, шії. Риси обличчя грубі, набряклі повіки, звужені очні щілини, товсті ніс та губи. Рс- 60/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. Яке захворювання виникло у пацієнтки?

- A.** Гіпотиреоз
- B.** Тиреотоксикоз
- C.** Ендемічний зоб
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Набряк Квінке

139. У хворої 60-ти років два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний, безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який попередній діагноз?

- A.** Злоякісне новоутворення молочної залози
- B.** Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- C.** Первинний сифіліс
- D.** Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- E.** Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

140. У першому періоді пологів роділля скаржиться на сильний біль у животі, попереку, тenezми. Перейми сильні, виникають через короткі проміжки, із частотою 6 за 10 хвилин. Що повинна акушерка запропонувати роділлі до прибуття лікаря?

- A.** Лягти на бік, протилежний позиції плоду
- B.** Лягти на бік, що відповідає позиції плоду
- C.** Лягти на спину
- D.** Прийняти вертикальне положення тіла
- E.** Вільне ходіння

141. Дитина у віці 3 місяці. Матір турбують поганий апетит, мерзлякуватість, сонливість дитини. Об'єктивно: дитина млява, голос грубий, захриплий. Спостерігаються набряк обличчя, великий язик, що не вмщається в роті, дитина не утримує голівки, не усміхається. Шкірні покриви сухі, гіпотонія м'язів. ЧСС- 100/хв., ЧД- 44/хв. Межі серця розширені, тони приглушені. Який препарат призначають при даній патології позитивно?

- A.** L-тироксин
- B.** Мерказоліл
- C.** Дигоксин
- D.** Діакарб
- E.** Пентоксил

142. У першороділлі 20-ти років народився живий доношений хлопчик масою 3200 г, довжиною тіла 50 см. Через 10 хвилин при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака відокремлення плаценти була використана?

- A.** Кюстнера-Чукалова
- B.** Довженка
- C.** Шредера
- D.** Альфельда
- E.** Клейна

143. На плановий огляд в жіночу консультацію звернулася вагітна 29-ти років. Вагітність II, 30 тижнів. Після зважування встановили надмірну прибавку маси тіла. АТ- 150/90 мм рт.ст. Яке дослідження слід обов'язково призначити вагітній?

- A.** Аналіз сечі на білок
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Біохімічний аналіз крові
- E.** УЗД

144. На ФАП звернулася жінка з терміном вагітності 8 тижнів. Скарги на загальну слабкість, втомлюваність, підвищення температури тіла до $39,2^{\circ}\text{C}$, пітливість, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння. Вкажіть імовірний діагноз:

- A.** Крупозна пневмонія
- B.** Вогнищева пневмонія
- C.** Абсцес легень
- D.** Туберкульоз легень
- E.** Рак легень

145. У пацієнта під час їжі раптово виник сильний кашель, ядуха; наростає ціаноз. Був виконаний прийом Геймліха, але через 3 хвилини чоловік знепритомнів, розвинулись судоми. Які наступні заходи потрібно провести?

- A.** Конікотомія
- B.** Трахеостомія
- C.** Інтубація трахеї
- D.** Доступ свіжого повітря
- E.** Масаж грудної клітки

146. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 50-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і виділення крові під час акту дефекації. Який попередній діагноз?

- A.** Геморой
- B.** Тріщина заднього проходу
- C.** Рак прямої кишки
- D.** Гострий парапроктит
- E.** Поліпи прямої кишки

147. Хворий скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту, невинне блювання. Об'єктивно: стан важкий, $\text{Ps}-100/\text{хв.}$, $\text{AT}-90/60$ мм рт.ст. Язик сухий, живіт роздутий. Під час пальпації живіт напружений, болючий у верхніх відділах. На шкірі обличчя жовто-синюшно-багряні плями. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий панкреатит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гостра кишкова непрохідність
- D.** Тромбоз мезентеріальних судин
- E.** Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

148. Хвора 58-ми років прийшла на прийом до акушерки зі скаргами на біль та наявність пухлиноподібного утворення в ділянці заднього проходу, підвищення температури тіла до 38°C . Під час огляду: на 7 годинах за умовним циферблатом біля ануса наявний інфільтрат грушоподібної форми розмірами 3×5 см, верхівкою в бік задньої крипти. Періанальні шкірні складки згладжені, пальпація інфільтрату викликає посилення болю; в центрі інфільтрату пальпується ділянка розмір'якшення. Який попередній діагноз?

- A.** Гострий парапроктит
- B.** Геморой
- C.** Анальна тріщина
- D.** Рак прямої кишки
- E.** Поліп прямої кишки

149. Машиною ШМД доставлено породіллю і новонародженого. Пологи вдома, плід народився масою 3400 г, доношений, роділля в задовільному стані. У яке відділення потрібно госпіталізувати жінку?

- A.** Обсерваційне
- B.** Патології вагітних
- C.** Фізіологічне післяпологове відділення
- D.** Гінекологічне відділення
- E.** Пологове відділення

150. Біль має такі характеристики: періодичність, сезонність, локалізація болю у верхній частині епігастральної ділянки, тісний зв'язок з прийомом їжі (15-60 хвилин після їжі), зменшення болісного відчуття після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Виразкова хвороба шлунка
- B.** Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- C.** Неспецифічний виразковий коліт
- D.** Ентерит
- E.** Рак шлунка

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК М. АКУШЕРСЬКА СПРАВА.

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.
(Українською мовою).

Підписано до друку 10.11./№277/01. Формат 60x84 1/8
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Суг. Друк офсет.
Ум.друк.арк. 16. Облік.вид.арк. 20.
Тираж.(1518 прим. – укр мова).

Б					
багатоплідний	многоплодный	ковтання	глотание	правець	столбняк
бешиха	рожа	комірцевий	воротниковый	привушний	околоушный
блювання	рвота	короста	чесотка	прісінок	преддверие
блювотний	рвотный	крейда	мел	присмерковий	сумеречный
В		крижі	крестец	провісник	предвестник
вада	порок	кроповий	укропный	променеви́й	лучевой
вапно	известь	кукса	культя	пухирець	пузырёк
вигодовування	вскармливание	кульгавість	хромота	лухлина	опухоль
викидень	выкидыш	куприк	копчик	Р	
вилиця	скула	кухоль	кружка	риси	черты
вимушений	вынужденный	Л		рогівка	роговица
випинання	выпячивание	литковий	икроножный	родзинки	изюм
випорожнення	испражнение	ліжковий	постельный	роділля	роженица
виразка	язва	лоно	лобок	розпал	разгар
висип	сыпь	лосочка	чешуйка	розпитування	расспрос
витрішкуватість	пучеглазие	М		розтин	сечение
вишкрібання	выскабливание	марення	бред	рукавичка	перчатка
вівчак, вовчак	волчанка	метелик	бабочка	рясний	обильный
відвар	отвар	метушитись	суетиться	С	
відмова	отказ	мигдалик	миндалина	садна	ссадины
віддраза	отвращение	миготливий	мерцательный	свербіж, сверблячка	зуд
відхідник	анус	міхуровий	пузырный	сеча	моча
відшарування	отслойка	млявий	вялый	сечовід	мочеточник
вічко	зев	Н		сечогінний	мочегонный
вогнепальний	огнестрельный	набряк	отёк	сир	творог
вогнищевий	очаговий	надмірний	избыточный	сироподібний	творожистый
воротар	очаговий	натискування	нажатие	сідниця	ягодица
ворушіння	шевеление	натще	натощак	склепіння	свод
втомлюваність	утомляемость	нашарування	наслоение	скроня	висок
втручання	вмешательство	негативний	отрицательный	скутість	скованность
вузловий	узловой	нежить	насморк	смоктання	сосание
Г		нездужання	недомогание	соняшниковий	подсолнечный
гавкаючий	лающий	немовля	младенец	спадковість	наследственность
гарбуз	тыква	необрнтований	необоснованный	спарга	жажда
годування	кормление	непритомність	потеря сознания,	сприяти	способствовать
голка	иголка		обморок	статевий	половой
гомілка	голень	нирка	почка	статура	телосложение
горб	бугор	нориця	свищ	стежно	бедро
гумовий	резиновый	нудота	тошнота	стиснення	сдавление
Д		О		стрімкий	стремительный
дільничий	участковый	обвід	окружность	струминний	струйный
дозволений	разрешённый	обличчя	лицо	струс	сотрясение
долюня	ладонь	оксамит	бархат	судоми	судороги
допоміжний	вспомогательный	олія	масло	сумісність	совместимость
доправляти	доставлять	оперізуочий	опоясывающий	суміш	смесь
дотримання	соблюдение	опік	ожог	сутінковий	сумеречный
драбина	лестница	осередок	очаг	Т	
Ж		особистий	личный	термін	срок
жовтяниця	желтуха	остуда	озноб	терміновий	экстренный
жувальний	жевательный	отруєння	отравление	терпність	онемение
З		очеревина	брюшина	тиск	давление
забій	ушиб	П		тім'ячко	родничок
загальний	общий	паління	курение	травний	пищеварительный
загартовування	закаливание	пахвинний, паховий	паховый	тривалий	длительный
загоєння	заживление	пахвовий	подмышечный	тулуб	туловище
задишка	одышка	пекучий	жгучий	У	
закреп	запор	передміхуровий	предстательный	усунення	устранение
залишковий	остаточный	передчасний	преждевременный	Х	
занесок	занос	переконати	убедить	харкотиння	мокрота
занурювати	погружать	перейми	схватки	харчування	питание
запалення	воспаление	переймоподібний	приступообразный	хода	походка
запаморочення	головокружение	переміжний	перемежающийся	хребет	позвоночник
затерплість	онемение	перенісся	переносица	Ц	
затискач	зажим	печіння	жжение	цукровий	сахарный
зважування	взвешивание	північ	север	Ч	
звивистий	извитой	півнячий	петушиный	чадний	угарный
зволжений	увлажнённый	підгузок	подгузник	черговий	дежурный
зворотній	обратный	підсумковий	итоговый	чергування	дежурство
здуття	вздутие	піногасники	пеногасители	черевний	брюшной
здухвинний	подвздошный	піхва	влагалище	Ш	
зіниця	зрачок	плескатий	плоский	шар	слой
знебарвлення	обесцвечивание	повіка	веко	шкіра	кожа
знепритомніти	потерять сознание	подружній	супружеский	шлунок	желудок
зомління	обморок	подряпина	царапина	штучний	искусственный
зріст	рост	поздовжній	продольный	Щ	
К		полум'я	пламя	щелепа	челюсть
калитка	мошонка	полуниця	клубника	щеплення	прививка
кашлюк	коклюш	поперек	поясница	щур	крыса
квасоля	фасоль	породілля	родильница	Я	
клеочучий	клокочущий	посіпування	подергивание	ядуха	удушьё
ковдра	одеяло	потилиця	затылок	ясна	дёсны, десна
		поточний	текущий		